
L. VIDAL & M. SARRAILH

**DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES**

1925

**OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE**

5, Rue de Tracy, PARIS (2^e)



VH25-1385

L. VIDAL & M. DAREAU

DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES


1925



83819

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE

5, Rue de Tracy, PARIS (2^e)





1^{re} Partie

TABLE

par Indications Thérapeutiques
des Spécialités
figurant dans cet ouvrage



Table par indications thérapeutiques des Spécialités figurant dans cet ouvrage

- I. Albuminurie.
- II. Alimentation — Régimes.
- III. Analgésiques externes — Anesthésiques.
- IV. Analgésiques internes — Antinévralgiques.
- V. Anémie — Asthénie.
- VI. Antipyrétiques.
- VII. Antiseptiques externes. — Désinfectants.
- VIII. Antiseptiques internes — Antitoxiques.
- IX. Artériosclérose — Hypertension artérielle — Angine de poitrine, etc.
- X. Arthritisme — Goutte — Rhumatismes.
- XI. Blennorrhagie.
- XII. Bronches — Poumons — Appareil respiratoire.
- XIII. Calmants — Antispasmodiques.
- XIV. Cœur et Appareil circulatoire.
- XV. Constipation.
- XVI. Convalescences.
- XVII. Dermatoses — Acné — Eczéma — Furunculose — Crevasses des seins, etc.
- XVIII. Diabète.
- XIX. Empoisonnements et intoxications.
- XX. Estomac.
- XXI. Foie — Pancréas — Rate.
- XXII. Gynécologie et Obstétrique.
- XXIII. Hémostatiques.
- XXIV. Hypnotiques.
- XXV. Intestins.
- XXVI. Lymphatisme — Scrofule — Rachitisme.
- XXVII. Maladies infectieuses et parasitaires — Grippe, Paludisme, etc.
- XXVIII. Nerfs (Hystérie, Epilepsie, Neurasthénie, etc.).
- XXIX. Obésité.
- XXX. Ophtalmologie.
- XXXI. Opothérapie et Vaccinothérapie.
- XXXII. Oto — Rhino — Laryngologie.
- XXXIII. Peau et Cuir chevelu (Gerçures, engelures, etc.).
- XXXIV. Reconstituants, Stimulants, Toniques, Récalcifiants.
- XXXV. Stomatologie.
- XXXVI. Syphilis.
- XXXVII. Système veineux — Varices — Hémorroïdes.
- XXXVIII. Tuberculose.
- XXXIX. Tumeurs — Cancer.
- XL. Vers intestinaux.
- XLI. Voies Génito-Urinaires (Reins, Vessie, Urètre. Testicules, etc.).

I. — ALBUMINURIE

Afatyl.
Antidol interne.
Citratoxine.
Dialyl.
Doloma-Cenophos.
Eau de Saint-Colomban.
Forcival.
Immunizols Grémy.
Néolyse.
Panbiline.

Silicyl.
Théobryl Roche.
Théosalvose.
Uraseptine Rogier.
Urazine.
Uroformine Gobey.
Urométine Lamblotte.
Urotrypsine.
Zimbyl.

II. — ALIMENTATION - RÉGIMES

Aliment Tinardon.
Atrial.
Babutyrose Lactella.
Biologe.
Céréaloze.
Diascs Progil.
Embryonine Barré.
Extrait de malt français
Desjardins.
Farine lactée Salvy.
Farines diverses Heude-
bert.
Farines maltées Jammot.
Gloma.
Kolatinés.
Képhir Salmon.
Kymosine.
Lab-Ferment Petit-Mialhe.
Lait caillé Salmon.
Lebnol.
Malt Barley.
Maltase Fanta.

Maltosan.
Malt pailleté Progil.
Mokavène.
Nutromalt.
Opothérapie Choay.
Ovomaltine.
Pain essentiel Heudebert.
Pains spéciaux Heudebert.
Peptone Vassal.
Phosphatine Falières.
Phosphogène Favrichon.
Produits diététiques Favri-
chon.
Psinase Grémy.
Pulvo-Képhyr Salmon.
Silicyl.
Tridigestine Dalloz.
Vitamyl.
Yaourline.
Yoghourt Lactella.
Zymatine.

III. — ANALGÉSQUES EXTERNES ANESTHÉSQUES

Algolane.
Baume Arôma.
Baume Bengué.
Bétul-Ol Midy.
Chéloïdine.
Chloréthyle Bengué.
Chloroforme Usines du
Rhône.
Chloroforme Lamblotte.
Ether Usines du Rhône.
Goménol.

Isobromyl.
Kélène.
Salas-Embrocation.
Salène Cyba.
Salénal Cyba.
Scurénaline.
Seuroforme.
Stovalne.
Syncaïne.
Synthol.
Urosan.

IV. — ANALGÉSQUES INTERNES ANTINÉVRALGIQUES

Algocratine Lancoine.
 Allonal Roche.
 Ampoules de Pantopon Roche.
 Ampoules de spasmalgine Roche.
 Anapeptone Vassal.
 Antalgot Dalloz.
 Antialgos Christiaens.
 Antigrippine Midy.
 Antipyrine Usines du Rhône
 Antodyne.
 Ascéine.
 Aspirine Usines du Rhône.
 Aspirine granulée Usines du Rhône.
 Atophan Cruet.
 Béntol.
 Bi-bromure Vicario.
 Borocalcyl Thévenot.
 Broméine Montagu.
 Bromiase Couturier.
 Bromogénol Pépin.
 Bromure Robin.
 Bromures Souffron.
 Cefvol.
 Chloral bromuré Dubois.
 Cryogénine Lumière
 Dial Ciba.
 Dialacétine Ciba.
 Didial Ciba.
 Dozéol.
 Energétène Valériane Byla.
 Eusomnine Bélières.
 Gosicrine.
 Hemypnal.
 Hypnéural Cos.
 Képhaldol.

Nalodine.
 Nareyl Grémy.
 Neurène.
 Neurinase.
 Névorol.
 Névralgol Brossard.
 Pantopon Roche.
 Paroxyl.
 Peptalmine
 Phytothérapie Ciba.
 Pilules de Moussette.
 Pyramidon Usines du Rhône.
 Pyréthane.
 Quiétol.
 Sambul.
 Sédatine Christiaens.
 Sédobrol Roche.
 Sirop du Dr Gelineau
 Sirop Teyssédre.
 Soneryl.
 Sorgol Thévenot.
 Spasmalgine Roche (Ampoules, Comprimés).
 Spasmine Jolly.
 Synthol.
 Tribromure Gigon.
 Valbornine Rogier.
 Valérianate liquide Grignon.
 Valérianate Pierlot.
 Valériane Byla.
 Valériane Ginet (sans alcool).
 Valérobromine Legrand.
 Valéromenthol
 Valéronal.
 Véronidia Buisson.

V. — ANÉMIE - ASTHÉNIE

Algatan.
 Aliment Tinardon.
 Ampoules Churchill Indolores.
 Arséniode Buriat.
 Arsylène Roche.

Arrhénuclène.
 Bain de Pennès.
 Beef Lavoix.
 Biocalcase.
 Bi-iodures Souffron.
 Biodynamine.
 Biogénol Demasles.

Biophoral.
 Biosine Le Perdriel.
 Biotoxé Ciba.
 Biozol.
 Borosodine Lumière.
 Capsules Morrhaine Puy.
 Carnine Lefranc.
 Céréulose.
 Cérébrofil Leysin.
 Céréossine.
 Chlorocalcion.
 Citrase.
 Colloïdes Amieros.
 Colloïdogénine.
 Composés Gmet.
 Comprimés Roche de Thio-
 col.
 Créosal Dubois.
 Cyto sérum Corbière.
 Diastogène.
 Dragées Hecquet.
 Elixir Ducro.
 Embryonine Barré.
 Enlode.
 Encalcium.
 Encytol.
 Eudynol.
 Extrait de malt français
 Desjardins.
 Extrait hématique Choay.
 Extrait moelle osseuse
 Choay.
 Farines maltées Jammet.
 Fer Bravais.
 Fer-ovarine Vitalis.
 Féroxal.
 Fer Rabuteau
 Fer Larcade.
 Ferrocodile et Ferricodile.
 Ferrocol.
 Ferromalt.
 Ferrophytine Ciba.
 Ferrygène Carron
 Fluidose.
 Fluodyle.
 Fortosian Ciba
 Fosfoxyll Carron.
 Globugénol Chanal.
 Gloma.
 Glutinettes d'hémoglobine.
 Glycérophosphate Dalloz.
 Glycérophosphates Robin.
 Glykolaine Robin.
 Granulé Caresmel.

Granulé Girard
 Granules Crosnier.
 Hectine.
 Helital.
 Hémocrinol (Lipoides H.I.)
 Hémocyto sérum Corbière
 Hémagénine.
 Hémostixine Branchu.
 Hémoglobine Byla.
 Hémoglobine Dalloz.
 Hémoglobine Deschiens.
 Hémostyl du D^r Roussel.
 Himotonine.
 Héposarcine Roy.
 Holos.
 Huile Riche.
 Hypophosphites Churchill.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodéyl Fournier.
 Iodogénol Pépin.
 Iodone Robin.
 Iodostarine Roche.
 Iodurase Couturieux.
 Iodures Souffron.
 Ionoides.
 Jecolmalt Wander.
 Jugland Gmet.
 Juglandine.
 Kola Astier.
 Kolatinés.
 Kolarsine.
 Lécithosine Robin.
 Lipocérébrine Chevreton.
 Lipocéthine.
 Manganoxyl.
 Marinol.
 Mésothorium Buisson.
 Morrhualgène Gautier.
 Morrhuetine Jungken.
 Morrhual.
 Morucalcium
 Narsenol.
 Néoarsycodile.
 Néo-rhomnol.
 Nergine Heudebert.
 Nervocéthine Tissot.
 Neuroplasmine Fort.
 Neuroplasma Fort.
 Neurotrophol Byla.
 Nucléarsitol Robin.
 Nucléatol Robin.
 Cenophos.
 Opocalcium de D^r Guersant.
 Pangaduline.

Pepto-Fer du D^r Jailliet.
 Peptonate de fer Robin.
 Phos.
 Phoscalgène.
 Phospharsyl.
 Phosphogène Favrichon
 Phostaniol.
 Phytine Ciba.
 Pilules Blancard.
 Pilules Gip.
 Plurion Couturieux.
 Prosthénase Galbrun.
 Quassia-Kina Rabot.
 Quina Baron.
 Quinquina Gmet.
 Reconstituant Mary.
 Santogénol Caubin.
 Séroplase.
 Sérum Ferrugineux
 Fraisse.
 Sérum névrossthénique
 Fraisse.
 Sinrénaline Dehaussy.
 Sirop Auzes.
 Sirop Blancard.
 Sirop Crosnier.
 Sirop aux Hypophosphytes
 de Fellows.

Sirop Roche au Thiocol.
 Solution Bardet.
 Spectrol.
 Splenocerinol (Iipoïdes H.I.)
 Strychnal Longuet.
 Stenergine.
 Synergyl Vadam.
 Synthol.
 Tabural Monal.
 Tonudol.
 Tricalcine.
 Triféryl.
 Urofodine.
 Vanadarsine (Ampoules,
 Gouttes).
 Vanadine Chevrier.
 Vanucléol.
 Vérianne Buriat.
 Vin de Baudon.
 Vin de Bugeaud.
 Vin et Sirop Nourry.
 Vloxyl.
 Vitamina.
 Zimbyl.
 Zohol.
 Zomo musculosine Byla.

VI. — ANTIPYRÉTIQUES

Antigrippine Midy.
 Antipyrine Usines du
 Rhône.
 Aspirine Usines du Rhône.
 Apaludol.
 Cervol.
 Cryogénine Lumière.
 Dialacétine Ciba.
 Elbon Ciba.

Néoquinine Falières.
 Panfébrine.
 Pantopon Roche.
 Pyramidon (Usines du
 Rhône.)
 Pyréthane.
 Quinoïdine Duriez.
 Quinquina Gmet.

VII. — ANTISEPTIQUES EXTERNES (DÉSINFECTANTS)

Aïrol Roche.
 Aloysine.
 Aniodol externe.
 Antiphlogistine.
 Antodol.
 Beaume Delacour.
 Boricine.
 Clonazone Daufresne.

Comprimés Guillaumin à
 l'oxycyanure d'Hg.
 Créosoforme Lamblotte.
 Cryptargol Lumière.
 Ektogan Bocquillon.
 Fixogène.
 Formadermine.
 Goménol.

Keriol.
Lusoforme.
Mésoforme.
Néol.
Orargol.
Ouataplasma.
Salascnyl
Salubrîne Phénix.

Sanoformine.
Savon Mollard.
Savon Roche au thigénol.
Stéramine.
Thigénol Roche.
Tochlorine.
Vioforme Ciba.

VIII. — ANTISEPTIQUES INTERNES (ANTITOXIQUES)

Amibiasine.
Aniodol interne.
Antalgol Dalloz
Apaludol.
Aténos.
Benzolactol.
Biliase Raby.
Bulgarine Thépénier.
Carbosanis.
Cephœmetine.
Chloramine.
Clonazone Daufresne.
Colloïdes Clin.
Curatoxine Vendel.
Diastogène.
Diénoï.
Di-Uroïodine.
Entéroseptyl Clérambourg.
Entérozone.
Eucalyptine Le Brun.
Faemine Longuet.
Félamine.
Formocarbine.
Goménol.
Gosiérine.
Hypodermozone.
Iodaseptine Cortial.
Iodométine.

Immunizols Grémy.
Lactobacilline.
Lebnoï.
Lentol Couturieux.
Levurase.
Mésoforme
Mycolysine du D^r Doyen
Néolides.
Orargol.
Panbiline.
Panfébrine.
Phylactone Byla.
Physiosthénine.
Produits Midy au Collargol
Propidon.
Rectopanbiline.
Rhéantine Lumière.
Sauge Gmet.
Sélénol Couturieux.
Septicémine Cortial.
Silicyl.
Staphylase du D^r Doyen.
Staphylococcine.
Thionhydrol Grémy.
Urométine.
Uroïodine.
Vinaigre de Pennès.

IX. — ARTÉRIOSCLÉROSE HYPERTENSION ARTÉRIELLE ANGINE DE POITRINE

Afatyl (Lipoïdes H. I.)
Algatan.
Aloysine.
Amidal.
Ampoules Boissy.

Antonal.
Arséniode.
Artério-sérum Vincardi.
Benzo-iodhydrine.
Benzylol.

Bi-iodureSouffron.
 Cardibaïne.
 Cardiotanic Grémy.
 Collo-iodé Dubois.
 Cathiote.
 Curiode.
 Dépuratif Kromelinek.
 Diasclérol.
 Dicaliote.
 Dioséine Prunier.
 Diurène.
 Eniote.
 Eranol.
 Euphrénine Bastia.
 Eulensyl Grémy.
 Glycocarpine.
 Goménol.
 Gui Gmet.
 Guipsine.
 Hémoductyl.
 Iodalose Galbrun.
 Iodamélis Logeais
 Iodéyl Fournier.
 Iodogénol Pépin.
 Iodométine.
 Iodostariné Roche.
 Iodurase Couturieux.
 Iodone Robin.
 Iodure Philippe.
 Iodures Souffron.
 Iode organique Boissy.
 Lipoféine Ciba.
 Lipofodine Ciba.
 Mésothorium Buisson.
 Morrhuallène Gantier.
 Nafodine.

Néo-Riodine.
 Oléo-iodé Dubois.
 Opothérapie Choay.
 Opothérapie Moncour.
 Panbiline.
 Phytothérapie Ciba.
 Pilules Doumer.
 Pulmocardine.
 Rectopanbiline.
 Rénotanic Grémy.
 Riodine.
 Rythmos Leysin.
 Scëllarène.
 Serum hypotensif Fraisse.
 Silisode.
 Silicyl.
 Sornaldéhyde.
 Sornyl.
 Spasmine Jolly.
 Synthol.
 Tétranitrol.
 Théobryl Roche (Ampou-
 les, Gouttes).
 Théosalvose.
 Théoxanthine.
 Thyrénine Grémy.
 Thyrol (Lipoides H. I.)
 Tonyol F.
 Trinitrine caféinée Dubois
 Trinitrine Vicario.
 Trinitrine Roussel.
 Uraetose.
 Urotrypsine.
 Velnosine.
 Verticurine.

X. — ARTHRITISME - GOUTTE - RHUMATISME

Afatyl (Lipoides H. I.)
 Algatan.
 Algolane.
 Ampoules Reipar.
 Aniodol interne.
 Antalgot Dallox.
 Antialgos Christiaens.
 Antiphlogistine.
 Antihurique de Contrexéville
 Antonal.
 Arséniote.
 Arthritose.

Ascéine.
 Aspirine Usines du Rhône.
 Aspirine granulée Usines
 du Rhône.
 Atophan Cruet.
 Atoquinol Ciba.
 Azufrol.
 Bain Carré.
 Baume Arôme.
 Baume Pengué.
 Baume du Dr Gigon.
 Baume Rhodia.

Baume Todaw.
 Benzo-iodhydrique.
 Benzophosphine Christiaens.
 Bétul-ol Midy.
 Cachets Todaw.
 Capsules Bardet.
 Capsules de Morrhaine
 Puy.
 Cathiote.
 Cervol.
 Chélofidine.
 Citraspirine.
 Colchic-sal Midy.
 Colloïde Dubois.
 Collothiol.
 Colloïxols du Dr Riquoir.
 Corps thyroïdes Moncour.
 Curatoxine.
 Curliote.
 Diabétifuge.
 Dialyl.
 Diasclérol.
 Diases Progil.
 Dimétol Vicario.
 Doloma-Cénophos.
 Eau de Saint-Colomban.
 Eranol.
 Extrait hépatique Choay.
 Extrait thyroïdien Choay.
 Farines maltées Jammet.
 Fosfoxyl Carron.
 Fucus Gmet.
 Globules Fumouze.
 Goménol.
 Hépatotanie Grémy.
 Immunizols Grémy : Rhu-
 matisme.
 Iodalose Galbrun.
 Iodamelis Logeais.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodométine.
 Iodo-thyroidine Catillon.
 Iodures Gros.
 Iode organique Boissy.
 Képhamine Brunot.
 Lebnol.
 Lipiodine Ciba.
 Liqueur Laville.
 Liscronine Bélières.
 Morrhualène Gautier.
 Mutandine Grémy.
 Naïodine.
 Néolyse.
 Néo-Riodine.

Néphrocricinol (Lipoides
 H. I.)
 Névoral Rafey.
 Névralgol Brossard.
 Nitroyl Leysin.
 Oléo-iodé Dubois.
 Oxydothyridine Pâris.
 Panbiline.
 Panurol Tissot.
 Papier Fayard.
 Phosoforme.
 Phospirine.
 Pilules du Dr Séjournet.
 Pipérazine Midy.
 Pyréthane.
 Rhésal Vicario.
 Riodyne.
 Salas-Embrocation.
 Salène Ciba.
 Saliceral.
 Salsanos.
 Salyserum.
 Sambul.
 Sédatine Christiaens.
 Seotral Leysin.
 Silicyl.
 Sodothiol.
 Solurol.
 Séphrullines Moncour.
 Sulfarsinol Lefèvre.
 Sulfoiodol Robin.
 Sulfurine.
 Synthol.
 Théobryl Roche (Ampou-
 les, Gouttes).
 Thyonhydrol Grémy.
 Thyrénine Grémy.
 Topique Bertrand.
 Ulmarène Gigon.
 Ulmarol Gigon.
 Uracétose.
 Uraséol.
 Uraseptine Rogier.
 Urazine.
 Urisal du Dr Deschamp.
 Urifluine.
 Urilysonne.
 Uroïdine.
 Uroformine Gobey.
 Urémétine Lambiotte.
 Urosan.
 Urotrypsine.
 Vin de Bugeaud.

XI. — BLENNORRAGIE

Aniodol.
 Arhéal.
 Blennosine.
 Capsules Raquin.
 Clonazone Daufresne.
 Dmégon.
 Eumistine
 Felargent.
 Gambéol.
 Glyco-Phytol.
 Goménol.
 Gonacrine.
 Gynéco-Phytol.
 Hexotal.
 Immunizols Grémy : Uré-
 trite.
 Néol.
 Ovules au Phytol.
 Phytol.
 Phytoline Albarran.

Pipérazine Midy.
 Préventyl.
 Salol Usines du Rhône.
 Santal Monal.
 Santalol Montagu.
 Sécacornine Roche.
 Sektal Grémy.
 Sirop Custos.
 Thélsine.
 Théobryl Roche (Ampou-
 les, Gouttes).
 Théosalvosc.
 Thigénol Roche.
 Uraseptine Rogier.
 Urazine.
 Urilysonc.
 Uroformine Gobey.
 Urométine Lambiotte.
 Urosan.
 Vaderol.

XII. — BRONCHES ET POUMONS ASTHME - COQUELUCHE, ETC.

Æthone.
 Algatan.
 Aloysine.
 Ampoules Boissy.
 Anaquintine Lescène.
 Aniodol interne.
 Anti-asthmatique du Dr
 Cléry.
 Antiasthme Bengalais.
 Antiasthmine Dehaussy.
 Antigrippine Midy.
 Aquintol.
 Arséniodé Burlat.
 Asthmolysine.
 Asthmylose.
 Avanazol Couturieux.
 Balsamol Lescène.
 Benzylol.
 Biogénol Demasles.
 Broméine Montagu.
 Cachets Gafacalcine La-
 tour.
 Cachets Kapytan.
 Cachets Roche de Thiocol.
 Capsules Dartois.

Capsules Sals.
 Céréalose.
 Céréossine.
 Chloral bromuré Dubois.
 Cigarettes Escoufflaire.
 Citrosodine Grémy.
 Collo-iode théobromo-ca-
 féiné.
 Collothiol.
 Colloïxols du Dr Riquoir.
 Comprimés Roche de
 Thiocol.
 Créosal Dubois.
 Cariode.
 Cytobiasc.
 Diascs Progil.
 Diastogène.
 Dicaliodé.
 Diénoi.
 Di-Uroiodine.
 Doloma-Génophos.
 Elatine Bouin.
 Elbon Ciba.
 Elixir Duchamp.
 Embryonine Barré.

Émulsion Marchais.
 Entérozone.
 Éranol.
 Eucalyptine Le Brun.
 Euphon.
 Eusomnine Bélières.
 Extrait Surréno-Hypophy-
 saire injectable Choay.
 Papier Fayard.
 Fludiose.
 Freinix.
 Gadéniol Lafarge.
 Gaïscalcine Latour.
 Germose.
 Gloma.
 Glycocarpine.
 Goménol.
 Globugénol Chanal.
 Globules Fumouze.
 Gosiérine Dalloz
 Gouttes Nicot.
 Gouttes livoniennes de
 Trouette-Perret.
 Gouttes Scandinaves.
 Granules Crosnier.
 Hémogénine.
 Histogénol Naline.
 Huile Riche.
 Hypodermozone.
 Immunizols Grémy : As-
 thme; Asthme des foin;
 Bronchites chroniques.
 Iodoarsenic Guiraud.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodéine Montagu.
 Iode organique Boissy.
 Kolatinés.
 Lipoféine Ciba.
 Marinol.
 Mycolysine du D^r Doyen.
 Naïodine.
 Nareyl Grémy.
 Néo-Duetyls.
 Néo-Riodine.
 Orargol.
 Ouataplasme.
 Panbiline.
 Pantopon Roche.
 Paroxyl.
 Pastilles Géraudel.
 Pastilles Méry.
 Pâte Gribell.
 Perles Taphosote.

Perubore.
 Phosote Lambiotte.
 Phospho-Gaïscol Mary.
 Phoslanol.
 Phytothérapie Ciba.
 Pilules Durieux.
 Pneumobiol.
 Pneumocratol.
 Pneumogéine Renard.
 Potion Boissel.
 Poudre Escoufflaire.
 Poudre Espic.
 Pulmocardine.
 Pyratone.
 Résyl.
 Rhodazil.
 Riodine.
 Salyptol Narty.
 Sauge Gmet.
 Sédogène Sallé.
 Sérum anti-asthmatique du
 Dr Heckel.
 Sérum antiphymique Va-
 dam.
 Sinaplasme.
 Sirop Aubergier.
 Sirop Crosnier.
 Sirop Gribell.
 Sirop Lanchat.
 Sirop Préga.
 Sirop Roche au Thiocol.
 Sirop phénique Vial.
 Soderseine.
 Sodothioli.
 Solution Pautauberge.
 Sulfarsinol Lefèvre.
 Sulfoidol Robin.
 Terkal Monal.
 Thiocol Roche.
 Thionhydrol Grémy.
 Thiopeptone.
 Thyrénine Grémy.
 Tonudol.
 Topique Bertrand.
 Uroïodine.
 Vaccin anti-asthmatique
 du prof. Minet.
 Vaccin antipneumonique
 du prof. Minet.
 Vériané Buriat.
 Zaryl.
 Zimbyl.

XIII. — CALMANTS - ANTISPASMODIQUES

Algocratine Lancozme.	Neurinase.
Ampoules de Pantopon Roche.	Névoral.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Pantopon Roche.
Antalgot Daloz.	Paroxyl.
Arséniode Buriat.	Passiflorine.
Azigtol Thévenot.	Pepto valériane Gigon.
Béatol.	Physiocyamine.
Bain Carré.	Pulmocardine.
Bellafoline.	Pyréthane.
Benzylol.	Quiétol.
Bibromure Vicario.	Réctopanbiline.
Borosodine Lumière.	Rhodazil.
Broméine Montagu.	Sédobrol Roche.
Bromiase Couturier.	Sédosine.
Bromogénol Pépin.	Solution Laroyenne.
Bromone Robin.	Sornyl.
Bromure Souffrou.	Spasmalgine Roche.
Capsules Bruel.	Spasmine Jolly.
Chloral bromuré Dubois.	Tetranitrol Roussel.
Didial Cibis.	Trinitrine Roussel.
Dozéol.	Valbornine Rogier.
Energétène de Valériane Byla.	Valéral Puy.
Euronal.	Valérianate liquide Grignon.
Freinix.	Valérianate Pierlot.
Gadeinol Lafarge.	Valériane Byla.
Génésérine.	Valériane Dausse.
Hypneural Cos.	Valériane Ginet (sans alcool).
Nalodine.	Valérianose Gigon.
Nareyl Grémy.	Valérobromine Legrand.
Neurène.	Vériane Buriat.
	Zaryl.

XIV. — CŒUR ET APPAREIL CIRCULATOIRE

Adrémine.	Cratégine.
Algatan.	Crème résolutive du Dr Rap Curiole.
Ampoules de Digalène Roche.	Dépuratif Kromelinck.
Ampoules de Théobryl Roche.	Diastogène.
Angéine.	Digalène Roche.
Antirrolde.	Digibaine.
Antonal.	Digifoline Ciba.
Benzo-Iodhydrine.	Digimialbaine.
Camphémol ciba.	Digitatine cristallisée Nativelle.
Cardibaine.	Digitatine Petit-Mialhe.
Cardiocrinol (Lipoides H.I.)	Diurène.
Cathiodé.	Dragées toni-cardiaques Le Brun.
Cigarettes Escoufflaire.	

Esculéol.
 Extrait myocardique Choay.
 Hamaméline Roy.
 Hamaméliode.
 Hémodrome.
 Hémoductyl.
 Iodalose Galbrun.
 Indhaméline Lejeune (simple et pluriglandulaire).
 Iodamelis Logeais.
 Kola Astier.
 Kola Midy.
 Kolatinés.
 Liposéine Ciba.
 Mialbafue.
 Mokavène.
 Natibafue.
 Néo-Rhodine.
 Ounbafue.
 Panbiline.
 Pantopon Roche.
 Passiflorine.
 Phytothérapie Ciba.

Pneumogéine Renard.
 Poudre Escouffaire.
 Pulmocardine.
 Rectopanbiline.
 Rythinos Leysin.
 Scillarène Sandoz.
 Sécacornine Roche.
 Silicyl.
 Sédobrol Roche.
 Solubafue.
 Spasmine Jolly.
 Sirophantus Catillon.
 Synthol.
 Tetranitrol Roussel.
 Théobromose Dumesnil.
 Théobryl Roche (Ampoules, Gouttes).
 Théosalvose.
 Theoxanthine.
 Tot'Hamelis.
 Trinitrine Caféinée Dubois.
 Trinitrine Roussel.
 Verticurine.

XV. — CONSTIPATION

Amidal.
 Amylodiastase Thépénier.
 Anusol.
 Benzylol.
 Bilifluine.
 Biostose Ciba.
 Capsules Taetz.
 Cascara liquide Alexandre.
 Cascara Midy.
 Cascarine Leprince.
 Choléo-combretol bol-
 dinisé.
 Cristolax.
 Entérocerinol (Lipoïdes R.I.)
 Extrait entéritique Choay.
 Extrait intestinal Moncour.
 Farines maltées Jammet.
 Félamine Sandoz.
 Formocarbinc.
 Frangulose Flach.
 Fucosine.
 Glycobyl.
 Hormolaxine.
 Huilaxine Gillot.
 Huile Crolas.
 Képhir Salmon.
 Lansoyl.
 Laxagrine.

Laxamalt.
 Laxatif orgeat.
 Laxamer.
 Lebnol.
 Lientine Grémy.
 Listose Vicario.
 Magnésie lourde de Durel.
 Mucinum.
 Neo-laxatif Chapotot.
 Nujol.
 Oléo-Mel.
 Opochlorine.
 Paraffnéol Hamel.
 Pastilles Citon.
 Péristaltine.
 Physiocyamine.
 Pilules purgatives du D^r
 Delant.
 Pilules Eparvier.
 Poudre Georges.
 Purganol Daguin.
 Rectopanbiline.
 Santéine.
 Scorogène.
 Sirop de la Maternité.
 Suppositoires Chaumel.
 Suppositoires Pépet.
 Tamar Indien.

Tanacetyl.
Taxol.
Thaolaxine.
Tisane Saint-Luc.
Tridigestine Dalloz.

Varilaxine.
Vasolaxine.
Végétaline Dubois.
Vitase.
Zymatine.

XVI. — CONVALESCENCES

Aliment Tinardon.
Ampoules Churchill Indolores.
Arséniode Burlat.
Arsycodile.
Ascoléine Rivier.
Bain de Pennès.
Beef Lavoix.
Biocalcose Chevreton.
Biogénol Demasles.
Biotose Ciba.
Blozol.
Calcelline.
Carminé Lefrancq.
Céréalose.
Céréossine.
Colloïdogénine.
Composés Gmet.
Crescol.
Créosal Dubois.
Cytobiase.
Cytosérum Corbière.
Diasés Progil.
Diasténine Grémy.
Diastogène.
Doloma-Cénophos.
Dragées Hecquet.
Dragées névrossthéniques Ysc.
Elixir Duchamp.
Elixir Ducro.
Embryonine Barré.
Enterozone.
Eucalcium.
Eucytol.
Exo-Orchitine Byla.
Extrait de Quinquina Nanning's.
Extrait orchitique Choay.
Farines maltées Jammet.
Fer Bravais.
Fer manganèse Amicros.
Feroxal.
Fer Larcade.
Fer Rabuteau.
Ferrocodile et Ferricodile.

Ferromalt.
Ferrophitine Ciba.
Fluodyle.
Fludiose.
Fortossan Ciba.
Fosfoxyl Carron.
Gaurol.
Géodyl.
Globugénol Chanal.
Gloma.
Glutinettes d'hémoglobine.
Glycérophosphate Dalloz.
Glycérophosphate Robin.
Glykolaine Robin.
Hélical.
Hémagénine du Dr Giraud.
Hémocérinol (Lipoides H.1.)
Hémocyto sérum Corbière.
Hémofixine Branchu.
Hémoglobine Byla.
Hémoglobine Dalloz.
Hémoglobine Deschiens.
Hémostyl du Dr Roussel.
Holos.
Hypophosphites Churchill.
Jecolmalt Wander.
Juglandine.
Kola Astier.
Kola Midy.
Kolatinés.
Kolarsine.
Lipochol Byla.
Lipocithine.
Malt calcine.
Malt pailleté Progil.
Manganoxyl.
Marinol.
Mésothorium Bulasson.
Morrhualène Gautier.
Morrhuetine Jungken.
Morrhual.
Moruecalcium.
Musculosine Byla.
Néo-Arsycodile.
Néo-Rhémnoi.
Nergine Heudebert.

Nervocithine Tiasot.	Quinquina Gmet.
Neurotrophol Byla.	Reconstituant Mary.
Neurovoïne Grémy.	Rhomnol.
Névrosthénine Grémy.	Santogénol Caubin.
Névrosthénine Freyssinge.	Serum Neurophile Thévenot.
Nucléarsitol Robin.	Sinrénaline Dehaussy.
Nucléatol Robin.	Sirop d'Hémoglobine Byla.
Oenophos.	Solution Bardet.
Opocalcium du D ^r Guersant	Spectrol.
Opothérapie Choay.	Stenergine.
Orchitine Byla.	Strychnal Longuet.
Ostéo-hépatine.	Strychnarsitol Robin.
Ovo-téclithine Billon.	Strychno-Fluocodyle
Pangaïne.	Synthol.
Pepto-fer Jaillet.	Synergyl Vadam.
Pepto-kola Robin.	Toni lecithine Rogier.
Peptonate de fer Robin.	Tonikéine Chevreton.
Phos.	Tonudol.
Phoscalgène.	Tricalcine.
Phosphate Pinard.	Triféryl.
Phospho-fluor Beynet.	Vanadarsine.
Phosphogène Favrichon.	Vériane Buriat.
Phosphorgane.	Vitamyl.
Phosphopinal Juin.	Vin de Baudon.
Phostaniol.	Vin Bugeaud.
Phytine Ciba.	Vin et Sirop Nourry.
Plurion Couturieux.	Vloxy.
Prosthénase Galbrun.	Vitamina.
Quassia-Kina Rabot.	Zimbyl.
Quina Baron.	Zohol.
Quina Laroche.	Zomo-musculosine Byla.
Quinéine.	

XVII. — DERMATOSES - ACNÉ - ECZÉMA FURONCULOSE, CREVASSES DES SEINS, etc.

Alibouriné.	Clonazone Daufresne.
Aloysine.	Colloïxols du D ^r Riquoir.
Anapeptone Vassal.	Collothiol.
Aniodol externe.	Créosoforme Lambiotte.
Antiphlogistine.	Curatoxine.
Arséniode Buriat.	Curiodé.
Atoquinol Ciba.	Dermoplastos Dumesnil.
Baume Baissade.	Diadermine.
Baume Delacour.	Diasclérol.
Baume Duret.	Dicaliodé.
Bi-iodure Souffron.	Dimetol Vicario.
Boricine Mcisonnier.	Dmesta (Néo).
Borostyrol.	Ebanyl.
Bulgarine Thépénier.	Eczéda.
Carbolactyl.	Ektogan Bocquillon.
Cethocéal.	Emplâtre Cavaillès.

Enteroseptyl Clérambourg.
 Etain Amicros.
 Extrait thyroïdien Choay.
 Eranol.
 Facmine Longuel.
 Farines maltées Jammet.
 Favolysine Thévenot.
 Ferromalt.
 Fixine Grémy.
 Fludiose.
 Formocarbline.
 Furunculase.
 Gastro-Sodine.
 Goménol.
 Granules Crosnier.
 Hémagénine du D^r Giraud.
 Huile Riche.
 Immunizols Grémy : Acné,
 Eczéma, Furunculose.
 Inotyol.
 Iodarsenic Guiraud.
 Iodéyl Fournier.
 Iodogénol Pépin.
 Iodométine.
 Iodone Robin.
 Iodostarine Roche.
 Iodothyline Catillon.
 Iodurase Couturieux.
 Iodures Souffron.
 Jugland Gmel.
 Laccodermes.
 Lebnol.
 Levurase.
 Levurine Couturieux.
 Lipoiodine Ciba.
 Néolyse.
 Néoplalysines du D^r Ri-
 quoir.

Néo-Riodine.
 Nisaméline Trouette-Perret
 Ouataplasmie.
 Panurel Tissot.
 Peptalmine.
 Phlyctol.
 Phostaniol.
 Pommade Lenoir.
 Procuta.
 Propidex.
 Propidon.
 Protéodyne.
 Rhagadine Bracquemond.
 Riodine.
 Sapolan.
 Savon Pérusol.
 Savon Roche au Thigénol.
 Silicyl.
 Sirop Crosnier.
 Sodothioli.
 Stannoxyli.
 Stanion.
 Staphylase du D^r Doyen.
 Staphylo-coccine Fraquet
 Staphylocide Andras.
 Stéramine.
 Sulfarsinol Lefèvre.
 Sulfodermol Rambaud.
 Thigénol Roche.
 Thyrcéline Grémy.
 Thionhydrol Grémy.
 Tridigestine Dalloz.
 Tulle gras Lumière.
 Ulcérine Berger.
 Vitase.
 Vitamyl.
 Xenaderm.

XVIII. — DIABÈTE

Biozol
 Choléo-Combrétoï Boldi-
 nisé.
 Diabétifuge.
 Diasclérol.
 Globugénol Chanal.
 Glycorol.
 Hémofixine Branchu.
 Hépatotanie Grémy.
 Insuline Byla.
 Insuline Fornet.
 Insuline Rogier.

Insulyl du D^r Roussel.
 Juglane.
 Kolatines.
 LévuLOSE Rogier.
 Panbiline.
 Pilules du D^r Beaufumé.
 Pilules du D^r Séjournet.
 Sinahin.
 Spasminé Jolly.
 Vin de Bugcaud.
 Vioxyli.
 Vitamine Rogier.

XIX. — EMPOISONNEMENTS INTOXICATIONS

Amibiasine.
Amidal.
Bulgarine Thépénier.
Carbosanis.
Cephœmetine.
Charbon Fraudin.
Charbon Tissot.
Digalène Roche.
Entéroseptyl Clérambourg.
Entérozone.
Eusomnine Bélières.
Formocarbène.
Furonculase.
Hypoderminozone.
Iodaseptine Cortial.
Lantol Couturieux.
Lebnol.

Mycolysine du D^r Doyen.
Néiodine Logeais.
Nigérine Vincent.
Oxy-injecteur du D^r Fialip.
Panbiline.
Phylactone Byla.
Propidon.
Produits Midy au Collargol.
Pulmocardine.
Quiétyl.
Rectopanbiline.
Sélénol Couturieux.
Septicémine.
Staphylase du D^r Doyen.
Staphylo-coccine Fraquet.
Uroïdine.
Vitase.

XX. — ESTOMAC

Alucol.
Babutyrose Lactella.
Benzolactol.
Biogastrine.
Bismuth Desleaux.
Bismuth léger Adrian.
Carbolactyl.
Carbosanis.
Cétrarose Gigon.
Cephœmetine.
Charbon Tissot.
Citrosodine Grémy.
Colloïd Leysin.
Condurango Gmet.
Diasas Progil.
Digestif Harvey.
Doloma-Cénophos.
Dragées Elkin.
Dyspeptine Hepp.
Elixir Ducro.
Elixir eupeptique Tisy.
Elixir du D^r Mialhe.
Entérozone.
Extrait de malt français
Desjardins.
Extrait gastrique Choay.
Extrait gastrique Moncour.
Extrait de Quinquina
Nanning's.

Farine de malt Heudebert.
Farines maltées Jammot.
Formocarbène.
Gastrocalcine.
Gastrocaol.
Gastrosodine.
Gélobarine.
Gélogastrine.
Génésérine.
Hipposarcine Roy.
Hopogan Bocquillon.
Kolatinés.
Kaolinase.
Képhir-Salmon.
Lab lacto ferment Mialhe.
Lebnol.
Levurase.
Malt Barley.
Maltase Fanta.
Maltozan.
Malt pailleté Progil.
Mangaine.
Néolyse.
Neoplalysines du D^r Riquoir.
Nigérine Vincent.
Nutromalt.
Opothérapie Choay.
Orthogastrine.
Panbiline.

Pangestyl Narty.
 Peptalmine.
 Peptodiasc.
 Peptone Trouette-Perret.
 Peptonal.
 Peptone Vassal.
 Peptosthénine.
 Persodine Lumière.
 Phoscoforme.
 Physioscyamine.
 Poudre Génia.
 Proxylol.
 Quina Laroche.
 Quassia-Kina Rabot.
 Rectopanbiline.
 Royérine Dupuy.
 Salsanos.
 Satureol.

Saugé Gmet.
 Sédogastrine.
 Sel de Hunt.
 Sel digestif Bè-me-cè.
 Sous azotate de Bismuth
 Tuslane.
 Spasmalgine Roche
 (Ampoules).
 Stomophile.
 Sulfoiodol.
 Sylvor.
 Tablettes Perroud.
 Tridigestine Dalloz.
 Vanadine.
 Vin de Bugeaud.
 Yaourtine.
 Yoghourt Lactella.
 Zimatine.

XXI. — FOIE - PANCRÉAS - RATE

Aniodol Interna.
 Benzolactol.
 Biléyl-Fournier.
 Bilifluine.
 Bilirhéine.
 Boldo Gmet.
 Boldoïne Eparvier.
 Capsules Bardet.
 Carbolactyl.
 Chlorobyl.
 Cholélyse.
 Choléo-Combretol boldi-
 nisé.
 Choléo Kinase.
 Choléo-lactol.
 Cholergine.
 Citrase.
 Diasés Progil.
 Dragées Elkin.
 Diurène.
 Extrait de bile Choay.
 Extrait de bile Moncour.
 Extrait hépatique Choay.
 Extrait entéro-pancréati-
 que Moncour.
 Extrait pancréatique Choay
 Extrait splénique Choay.
 Farines maltées Jammet.
 Félamine Sandoz.
 Formocarbène.
 Fucobiline.
 Gastrosodine.

Glycobyl.
 Glycolactimase.
 Grains de santé du D^r
 Franck.
 Hépatobyl.
 Hépatocrinol (Lipoïdes
 H. I.)
 Hexotal.
 Jécol.
 Kolatinés.
 Lebnol.
 Magnésie lourde de Durel.
 Opochlorine.
 Opothérapie Choay.
 Orthogastrine.
 Panbiline.
 Pancréol (Lipoïdes H. I.)
 Panfébrine.
 Pangestyl Narty.
 Peptosthénine.
 Pilules Debouzy.
 Proxylol.
 Rhodazyl.
 Rectopanbiline.
 Salsanos.
 Sédatine Christiaens.
 Sedothiol.
 Sernyl.
 Spasmalgine Roche (Am-
 poules, Comprimés).
 Sphérulines Moncour.
 Splénoocrinol (Lipoïdes H. I.)

Tridigestine Dalloz.
Uracétose.
Urisanine.
Urométine.

Urosan.
Vitase.
Yaourtine.
Zymatine.

XXII. — GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE

Agomensine Cyba.
Aïrol Roche.
Anexol.
Antiphlogistine.
Ariodol externe.
Apioline Chapoteaut.
Bain Carré.
Boricine Meissonnier.
Cétrarose Gigon.
Chloral bromuré Dubois.
Clonazone Daufresne.
Colloïdols du Dr Riquoir.
Comprimés Guillaumin à l'oxycyanure d'Hg.
Corps thyroïdes Moncour
Cryptargol Lumière.
Elixir de Virginie Nyrdhal.
Extrait ovarien Choay.
Extrait mammaire Choay.
Extrait placentaire Choay.
Extrait hypophysaire (lobe postérieur), injectable Choay.
Félargent.
Fer-ovarine Vitalis.
Floréaxes
Frialine Grémy.
Globugénol Chanal.
Gobérol.
Goménol.
Gyneco-Phytol.
Gynergène Sandoz.
Gynocrinol (Lipoides H. I.)
Gynolutéol (Lipoides H. I.)
Gynopausine.
Hamamelis Gmet.
Hémagène Tailleur.
Hemypnal Ciba.
Hexotal.
Hémoductyl.
Hémoglobine Deschiens.
Hydrulin.
Immunizols Grémy : Métrites.
Indhaméline Lejeune.
Kolakinés.

Laurénol.
Malt pailleté Progil.
Ménovarine.
Mésosome.
Métritols.
Naiodine Logeais.
Néolides.
Nitium Buisson
Novarine Vicario.
Ocréine Grémy.
Opothérapie Choay.
Orargol.
Ovules Amicros.
Ovules Chaumel.
Ovules Derma.
Ovules au Phytol.
Ovules Roché au Thigénol.
Panbiline.
Pilules Hélieniennes Naud.
Poudre ovarienne Moncour
Pyréthane.
Rectopanbiline.
Salubrine Phénix.
Sanoformine.
Savon Pérusol.
Savon Roche au thigénol.
Sécacornine Roche.
Sirop de la Maternité.
Sistomensine Ciba.
Sornyl.
Suppo-Gynals.
Surrénofanie Grémy.
Syncrines n° 1-4-4 bis 6 bis-7.
Synthol.
Tampol Roche.
Thigénol Roche.
Thionhydrol Grémy.
Thyrénine Grémy.

Thyrocréine Grémy.
Tonyol F.
Topique Bertrand.
Uraseptine.
Urométine Lambiotte.
Veinosine.
Vitamyl.

XXIII. — HÉMOSTATIQUES

Angéine.
Anthéma.
Arhema Gallier.
Boricine Meissonnier.
Chlorocalcion.
Elixir de Virginie Nyrdahl.
Ergot de seigle.
Extrait de sérum sanguin
Choay.
Extrait hypophysine (lobe
postérieur) injectable
Choay.
Gul Gmet.
Guipsine.
Gynergène Sandoz.

Hamaméline Roya.
Hamameliode.
Hamamelis Gmet.
Hémoductyl.
Hémostyl du D^r Roussel.
Rénaleptine.
Searénaline.
Sécacornine Roche (Am-
poules, Comprimés).
Sitrénaline Déhaussy.
Sirop phénique Vial.
Spectrol.
Synthol.
Tot'Hamelis.

XXIV. — HYPNOTIQUES

Achanol (Opiomanie, Mor-
phinomanie).
Ampoules de Pantopon
Roche.
Ampoules de Spasmalgine
Roche.
Arseniode Buriat.
Borosodine Lumière.
Bromiase Couturier.
Bromogénol Pépin.
Bromures Souffron.
Chloral bromuré Dubois.
Dial Ciba.
Dialacétine Ciba.
Didial Ciba.
Dozéol.
Energetène de Valériane
Byla.
Euronol.
Eusomnine Bélières.
Gardénal.
Hypneural Cos.
Hypodermozone.
Isobromyl.
Natodine Logeais.
Narcyl Grémy.
Neurène.

Neuréol.
Neurinase.
Pantopon Roche.
Passiflorine.
Quiéstyl.
Rutonal.
Sédobrol Roche.
Sédol.
Sédosine.
Sirop d'Aubergier.
Sirop du D^r Gelineau.
Sirop Teyssèdre.
Sonnifène Roche.
Sonéryl.
Spasmalgine Roche (Am-
poules, Comprimés).
Spasmine Jolly.
Tribromure Gigon.
Valbornine Rogier.
Valéral Puy.
Valérianate Grignon.
Valérianate Pierlot.
Valériane Gmet.
Valérobromine Legrand.
Valéromenthol.
Vériane Buriat.
Véronidia Buisson.

XXV. — INTESTINS

Acésine.
Adrépatine.

Aloysine.
Alucol.

Alunozal.
 Amblasiné.
 Anidal.
 Amylodiastase Thépénier.
 Anapeptone Vassal.
 Aniodol interne.
 Antirrhoïde.
 Babutyrose Lactella.
 Benzolactol.
 Benzophosphine Christlans.
 Bismuth Desleaux.
 Bismuth léger Adrian.
 Bilifluine.
 Biolactyl Fourrier.
 Blédine Jacquemaire.
 Boldo Gmel.
 Boléase Monal.
 Bulgarine Thépénier.
 Carbolactyl.
 Carbosanis.
 Cascara liquide Alexandre.
 Cascara Midy.
 Cascarine Leprince.
 Cathode.
 Cephœmétine.
 Charbon Tissot.
 Chloramine.
 Chlorobyl.
 Choléltolres Byla.
 Choléo-lactol Daguin.
 Colloïl Leysin.
 Choléo-Combrétol boldi-
 nisé.
 Collofolols du D^r Riquoir.
 Condurango Gmet.
 Coréiné.
 Créosoforme Lambiotte.
 Cristolax.
 Cryptargol Lumière.
 Dépuratif Kromelinck.
 Dimol.
 Doloma-Cénophos.
 Dragées Elkin.
 Dyspeptine Hepp.
 Elixir eupeptique Tixy.
 Entéroseptyl Clérambourg.
 Enterovaccin Lumière.
 Enterozoné.
 Extrait de bile Choay.
 Extrait entéritique Choay.
 Extrait entéro-hépatique
 Choay.
 Extrait intestinal Moncour.
 Farines maltées Jammet.

Félamine.
 Fixine Grémy.
 Formocarbène.
 Frangulose Flach.
 Fucosine.
 Gastrocaol.
 Gastro-Sodine.
 Gélotanin
 Glycobyl
 Glycolactimase.
 Goménol.
 Hémagène Tailleur.
 Hipposarcine Roy.
 Hopogan Bocquillon.
 Hormolaxine
 Huilaxine Gillot.
 Huile Crolas.
 Immunizols Grémy : Ap-
 pendicite ; Dysenterie,
 Entérite.
 Kolatinés.
 Képhir-Salmon.
 Lab-lacto ferment.
 Lactimase.
 Lactobacilline.
 Lactolaxine Fydau.
 Lactozymase.
 Lansoyl.
 Laxamalt.
 Laxatif Orgeat.
 Lebnol.
 Levurase.
 Licentine Grémy.
 Listose Vicario.
 Magnésie lourde de Durel.
 Maltosan.
 Malt pailleté Progil.
 Mangaine.
 Mocinum.
 Néolyse.
 Neo-laxatif Chapotot.
 Néoplatsines du D^r Riquoir
 Nigérine Vincent.
 Nujol.
 Nutromalt.
 Oléo-Mel.
 Opochlorine.
 Ortho-Gastrine.
 Panbiline.
 Pancréol (Lipoldes H. I.)
 Paulacto Midy.
 Papaine Trouette-Pérret.
 Paraffincol Hamel.
 Peptosténine.

Péristaltine.
 Physiocyammine.
 Pilules purgative du D^r
 Dehaut.
 Phylactone Byla.
 Physéline Grémy.
 Pommade Midy.
 Poudre Génia.
 Proxylol.
 Psinase Grémy.
 Purganol Daguin.
 Rectoline.
 Rectopanbiline.
 Salol Usines du Rhône.
 Salsanos.
 Scorogène.
 Sirop de la Maternité.
 Sirop phénique Vial.
 Sphérulines, entéritiques
 Moncour.

Stomophile.
 Sulfoiodol.
 Suppositoires Adreno-Styp-
 tiques Midy.
 Suppositoires Papet.
 Sylvor.
 Tœnifuge Kirn.
 Tamar indien.
 Taxol.
 Thaolaxine.
 Thigénol Roche.
 Tisane Saint-Luc.
 Tridigestine Dalloz.
 Varilaxine.
 Vasolaxine.
 Végétaline Dubois.
 Vitase.
 Yaourtine
 Yoghourt Lactella.
 Zymatine.

XXVI. — LYMPHATISME - SCROFULE RACHITISME

Algatan.
 Arséniode Buriat.
 Bain Carré.
 Biocalcose.
 Biogénol Demasles.
 Biozol.
 Cachets Roche de Thiocol.
 Capsules de Morrhuine Puy.
 Carnine Lefrancq.
 Céréalose.
 Céréossine.
 Chloro-Calcion.
 Citrase.
 Colloïdogénine.
 Comprimés Roche de
 Thiocol.
 Créosol Dubois.
 Curiodé.
 Cytobiase.
 Cytosérum Corbière.
 Diasés Progil.
 Diastogène.
 Elixir Ducro.
 Embryonine Barré.
 Eucalcium.
 Extrait malt français Des-
 jardins.

Extrait moelle osseuse
 Choay
 Farines maltées Jammet.
 Fer Larcade.
 Fer-ovarine Vitalis.
 Ferromalt.
 Ferrophytine Ciba.
 Fer manganèse Amicros.
 Fludiose.
 Fosfoxyl Carron.
 Globules Fumouze.
 Glutinettes d'hémoglobine
 Glycérophosphate Dalloz.
 Glycérophosphate Robin.
 Granulé Caresmel.
 Granules Crosnier.
 Hélihal.
 Hémagénine.
 Hémocyto-sérum Corbière
 Hémoglobine Dalloz.
 Hémofixine Branchu.
 Histogénol Naline.
 Holos.
 Huile Riche.
 Hypophosphites Churchill
 Iodalose Galbrun.
 Iodarsenic Guiraud.
 Iodaseptine Cortial.

Iodéyl Fournier.
 Iodogénol Pépin.
 Iodométine.
 Iodostarine Roche.
 Iodurase Couturier.
 Jécomalt Wander.
 Juglandine.
 Kolatinés.
 Lécithosine Robin.
 Lipocythol Grémy.
 Lipododine Ciba.
 Malt calciné.
 Marinol.
 Morrhuétine Jungken.
 Morrhualène Gautier.
 Morrhuol.
 Morucalcium.
 Néo-Riodine.
 Nergine Heudebert.
 Opocalcium de D' Guersant.
 Oposynergines.
 Ovomaltine.
 Panbiline.
 Pancalcine.
 Pangaduine.
 Persodine Lumière.
 Phosphate Pinard.

Phospho-Fluor Beynet.
 Phospho-Gaïacol Mary.
 Phosphogène Pavrichon.
 Phostaniol.
 Phytine Ciba.
 Polyminéral Fort.
 Prosthénase Galbrun.
 Reconstituant Mary.
 Sirop Crosnier.
 Sirop Roche au Thiocol.
 Solution Bardet.
 Sténergine.
 Succomusculine Chaix.
 Synthol.
 Tonudol.
 Tricalcine.
 Triféryl.
 Uroïdine.
 Vanadarsine.
 Vaucléol.
 Vin de Baudon.
 Vioxyl.
 Vitamina.
 Vitamine Rogier.
 Vitamyl.
 Zohol.
 Zomo-Musculosine Byla.

XXVII. — MALADIES INFECTIEUSES et PARASITAIRES, GRIPPE, PALUDISME, etc.

Anthraxone.
 Apaludol Auclair.
 Aplexil.
 Aniodol interne.
 Antalgot Dalloz.
 Benzolactol.
 Bismuth Desleaux.
 Cachets Kapytan.
 Cephoémétine.
 Cervol.
 Curatoxine Vendel.
 Curoxyure.
 Dicaliodé.
 Diéménal.
 Digalène Roche.
 Entérozone.
 Eranol.
 Ferromalt.
 Formocarbène.
 Globugénol Chanal.
 Griphol.

Hectargyre.
 Hectine.
 Hypodermozone.
 Immunizols Grémy.
 Iode organique Boissy.
 Kola granulé Astier.
 Kolarsine.
 Kolatinés.
 Orargol.
 Panbiline.
 Panfebrine.
 Panhémol.
 Phytinate quinine Ciba.
 Plurion Couturier.
 Produits Midy au Collargol.
 Propidon.
 Protéodyne.
 Quinquase.
 Quinoforme.
 Quinoïdine Duriez.
 Rectonambiline.

Résyl Ciba.
Septicémine.
Sirop Lanchat.
Solution Bardet.
Staphylase du D^r Doyen.
Staphylocide Andras.
Staphylo-coccine.
Stibal.

Synthol.
Tœnifuge Bardet.
Thyonhydrol Grémy.
Tonudol.
Urométine Lambiotte.
Urosan.
Uracétose.
Urisanine.

XXVIII. — NERFS (HYSTÉRIE, ÉPILEPSIE, NEURASTHÉNIE, ETC.)

Allonal Roche.
Ampoules de Pantopon
Roche.
Ampoules de Spasmalgine
Roche.
Antialgos Christiaens.
Arsylène Roche.
Azigol Thévenot.
Bain Carré.
Béatol.
Benzylol.
Biodynamine.
Biozol.
Borosodine Lumière.
Broméine Montagu.
Bromiase Couturier.
Bromogénol Pépin.
Bromure Robin.
Bromures Souffron.
Cérébrocrinol (Lipoïde
H. I.)
Cérébrofil Leysin.
Chloral bromuré Dubois.
Dial Ciba.
Dialacétine Ciba.
Diasténine Grémy.
Diastogène.
Doloma-Cenophos.
Dragées du D^r Gélinau.
Dragées névrosthéniques
Yse.
Energétique de valériane
Byla.
Euronol.
Eusomine Bellères.
Fludiose.
Fosfoxyll Carron.
Gardénal.
Génésérine.
Globugénol Chanal.

Glycérophosphate Dalloz.
Glycérophosphate Robin.
Hémoglobine Dalloz.
Histogénol Naline.
Hypneural Cos.
Kola Granulée Astier.
Kolatinés.
Lipocérébrine Chevreton.
Mokavène.
Morhualène Gautier.
Nafodine.
Néolysc.
Nergine Heudebert.
Neurène.
Neurinease.
Neurodose.
Neurolipase.
Neurotanik Grémy.
Neurotrophol Byla.
Neurovoïne Grémy.
Nopirine Vicario.
Opothérapie Choay.
Panbiline.
Pantopon Roche.
Passiflorine.
Phoscalgène.
Phosoforme.
Phystosecyamine.
Phytine Ciba.
Pilules du Dr Beaufumé.
Quiétol.
Rectopanbiline.
Rutonal.
Sédatine Christiaens.
Sédatoze.
Sédobrol Roche.
Sédol.
Sédoncurool Dechaussy.
Sédosine.

Sérum Nevrosthénique
Fraisse.
Sirop du D^r Gélincan.
Sirop d'Aubergier.
Sirop aux Hypophosphytes
de Fellows.
Solution Laroyenne.
Somnifène Roche.
Spasalgine Roche.
Spasmine Jolly.
Staphylase bromurée du
D^r Doyen.
Tribromure Gigou.

Valbornine Rogier.
Valéral Puy.
Valériane Gmet (sans alcool).
Valérianate liquide Gri-
gnon.
Valérianate Pierlot.
Valérobromine Legrand.
Valéromenthol.
Valimyl.
Vanadine Bocquillon.
Vérilane Buriat.
Vanucléol.
Véronidia Bulsson.

XXIX. — OBÉSITÉ

Afatyl (Lipoides H. I.)
Algatan.
Antifurique de Contrexéville
Colloïdine.
Corps thyroïde Moncour.
Curiode.
Dépuratif Kromelinck.
Doloma-Cénophos.
Dialyl.
Diasclérol.
Diastogène.
Eau de Saint-Colomban.
Extrait thyroïdien Choay.
Fucus Gmet.
Globules Fumouze.
Hémagénine.
Iodalose Galbrun.
Iodamelis Logéris.
Iodhydrinedu D^r Deschamp
Iodoimétine.

Iodostarine Roche.
Iodo-thyroïdine Catillon.
Iodure Philippe.
Lipoiodine Ciba.
Néo-Riodine.
Oxydothyridine Pâris.
Panbiline.
Panurol Tissot.
Riodine.
Salsanos.
Théisine.
Théobryl Roche (Ampou-
les, Gouttes).
Théosalvose.
Thyrénine Grémy.
Uraseptine Rogier.
Urazine.
Uroformine Gobey.
Urométine Lamblotte.

XXX. — OPHTALMOLOGIE

Aniodol externe.
Clonazone Daufresne.
Colluborine Dupuy.
Felargent.
Goménol.
Immunizols Grémy : Con-
jonctivites ; Ulcérations
de la Cornée.
Naiodine.
Ophtalmina.
Orargol (Collyre).

Panbiline.
Scurénaline.
Scuriforme.
Silicyl.
Stéramine.
Thigénol Roche.
Thionhydrol Grémy.
Tubes Dulcis.
Tubes du D^r Guiraud.
Vioforme Ciba.

XXXI. — OPOTHÉRAPIE ET VACCINOTHÉRAPIE

Adrépatine.
Adrénophyséine Grémy.
Agomensine Ciba.
Aplexil.
Capsules Sals.
Cardiotanic Grémy.
Choléo Kinase.
Colloïxols du D^r Riquoir.
Enterovaccin Lumière.
Euphon.
Epidosine Grémy.
Extraits totaux Choay.
Gynopausine.
Hémoglobine Deschiens.
Hépatotanic Grémy.
Huile Riche.
Immunizols Grémy : Abscès
chauds - Plaies suppu-
rées; Abscès froids - Fis-
tules; Acné; Appendi-
cite; Asthme; Asthme des
foies; Bronchites chro-
niques; Conjonctivites;
Cystites - Pyélonéphrites;
Dysenterie; Eczéma; Pso-
riasis; Entérite; Furon-
culose; Gangrène; Grip-
pe; Métrites; Méningoco-
que; Ostéomyélite; Otites;
Rhumatismes; Sarcome;
Typhoïde; Ulcérations de
la cornée; Uréthrites.
Lipoïdes H. I. — Chaque
lipoïde est en même
temps un aliment et un
excitant pour l'organe
dont il provient.
Neurovoïne Grémy.

Neurotanic Grémy.
Ocréine Grémy.
Opothérapie Byla.
Opothérapie Choay.
Opothérapie Fournier Fr.
Opothérapie Moncour.
Opothérapie de la Société
Française d'Opothérapie
S. F. O.
Opothérapie Paris.
Opozones Lumière.
Ostéohépatine.
Panbiline.
Panfébrine.
Panglandine.
Peptostéine Choay.
Pérubore.
Physéine Grémy.
Pilules du D^r Debouzy.
Pneumotanic Grémy.
Proxytases.
Rectopaniline.
Rénotanic Grémy.
Rhéantine Lumière.
Sinrénaline Dehaussy.
Sistomensine Ciba.
Splénotanic Grémy.
Surrénotanic Grémy.
Synérines Choay.
Thyrénine Grémy.
Thyrocréine Grémy.
Tridigestine Dalloz.
Vaccins atoxiques stabili-
sés Poulenc.
Vaccins bactériens I. O. D.
Vaccins microbiens cura-
tifs et préventifs Grémy.

XXXII. — OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE

Anaquinine.
Aniodol.
Antiasthme Bengalais.
Arhine Lambiotte.
Audigénine.
Balsamol.
Boricine Meissonnier.
Clonazone Daufresne.

Cocaïne Midy.
Colloïdogénine.
Colloïxols du D^r Riquoir.
Dragées Bengué.
Edistol.
Formocarbène.
Fluodyle.
Freinix.

Galform Lambiotte.
 Glycocarpine.
 Goménol.
 Granules Crosnier.
 Hémagénine.
 Huile Riche.
 Immunizols Grémy : As-
 thme des Foies ; Otites.
 Indhaméline Lejeune
 pluriglandulaire.
 Kinectine.
 Kipsol.
 Léniforme.
 Mésoforme.
 Mucosodine.
 Naiodine.
 Néol.

Orargol.
 Pastilles Géraudel.
 Pastilles Mackenzie.
 Pastilles Méry.
 Rhinargyné.
 Sirop Lanchat.
 Sirop Crosnier.
 Sodothiol.
 Stéramine.
 Sulfuryl Monal.
 Synthol.
 Tablettes d'oxymenthol
 Perraudin.
 Thigénol Roche.
 Vaccins bactériens I. O. D
 Vioforme Ciba.
 Zaryl.

XXXIII. — PEAU ET CUIR CHEVELU (GERÇURES, ENGELURES, etc.)

Aniodol externe.
 Arsylène Roche
 Baume Duret.
 Bi-iodure Souffron.
 Bulgarine Thépénier.
 Capsules Sals.
 Clonazone Daufresne.
 Collothiol.
 Créosoforme Lambiotte.
 Crypthermol.
 Curatoxine.
 Curlode.
 Dermo-plastols Dumesnil.
 Diachusine.
 Diadermine.
 Dmesta (Néo-)
 Ebanyl.
 Eczéda.
 Emplâtres Cavaillès.
 Entéroseptyl Clérambourg.
 Eranol.
 Extrait Thyroïdien Choay.
 Favolysine Thévenot.
 Formadermine.
 Furunculase.
 Gastro-Sodine.
 Globules Fumouze.
 Goménol.
 Granules Crosnier.
 Hémagénine du D^r Giraud.
 Huile Riche.

Immunizols Grémy : Acné
 Eczéma. — Psoriasis ; Fu-
 ronculose.
 Inotyol.
 Iodarsenic Guiraud.
 Iodéyl Fournier.
 Iodogénol Pépin.
 Iodométine.
 Iodone Robin.
 Iodostarine Roche.
 Iodothyroïdine Catillon.
 Iodurase Couturieux.
 Iodures Souffron.
 Jugland Gmel.
 Laccodermes.
 Lebnol.
 Levurase.
 Levurine Couturieux.
 Lipiodine Ciba.
 Mésoforme.
 Néol.
 Néolyse.
 Néo-Riodine.
 Nisaméline Trouette-Perre
 Ouataplasmé.
 Panbiline.
 Panurol Tissot.
 Peptonal.
 Phlyctol.
 Phostaniol.
 Propidex.

Propidon.
 Rectopanbiline.
 Rhagadine Bracquemond.
 Riodine.
 Sapolan.
 Savon Mollard.
 Savon Pérusol.
 Savon Roche au Thigénol.
 Silicyl.
 Sirop Crosnier.
 Sodothiol.
 Stanion Couturieux.

Stannoxyd.
 Staphylase du D^r Doyen.
 Staphylococcine Fraquet.
 Sulfodermol Rambaud.
 Stéramine.
 Thigénol Roche.
 Thyrénine Grémy.
 Thionhydrol Grémy.
 Tulle gras Lumière.
 Ulcérine Berger.
 Xemaderm.

XXXIV. — RECONSTITUANTS - STIMULANTS

TONIQUES - RÉCALCIFIANTS

Algatan.
 Ampoules Churchill indolores.
 Arrhénuelène.
 Arsycodyle.
 Arsylène Roche.
 Ascolcine Rivier.
 Bain Carré.
 Bain de Pennès.
 Biocalcose Chveretin.
 Biogénol Demasles.
 Biotose Ciba.
 Calcilline.
 Carnine Lefrancq.
 Céréalose.
 Cérébrofil Leysin.
 Céréossine.
 Colloïdogénine.
 Composés Gmet.
 Créosal Dubois.
 Crescol.
 Diascs Progil.
 Diastogène.
 Doloma-Cénophos.
 Dragées Hequet.
 Dragées névrosthéniques Ysc
 Elixir Duchamp.
 Elixir Ducro.
 Embryonine Barré.
 Entérozone.
 Epidosine Grémy.
 Eucalcium.
 Exo-orchitine Byla.
 Extrait orchitique Choay.

Extrait surrénal Choay.
 Farines maltées Jammet.
 Fer Bravais
 Fer manganèse Amicros.
 Ferrophytine Ciba.
 Ferromalt.
 Fer Larcade.
 Feroxal.
 Fer Rabuteau.
 Ferrocodile et Ferricodile.
 Fluidose.
 Fluidyle.
 Fortossan Ciba.
 Fosfoxyd Carron.
 Gaurol.
 Géodyl.
 Globugénol Chanal.
 Gloma.
 Glutinettes d'hémoglobine.
 Glycérophosphate Dalloz.
 Glycérophosphate Robin.
 Glykolaine Robin.
 Granulé Caresmel.
 Héltal.
 Hémagénine du D^r Giraud.
 Hémocrinol (Lipoides H.I.)
 Hémoglobine Byla.
 Hémoglobine Dalloz.
 Hémoglobine Deschiens.
 Hémostyl du D^r Roussel.
 Hipposarcine Roy.
 Holos.
 Hypophosphites Churchill
 Jecomalt Wander.
 Juglandine.

Kola Astier.
 Kola Midy.
 Kolatinès.
 Lipochol Byla.
 Lipocythol Grémy.
 Malt pailleté Progil.
 Manganoxyl.
 Marinol.
 Mésothorium Buisson.
 Morrhualène Gautier.
 Morrhuétine Juncken.
 Morrhuol.
 Moruocalcium.
 Musculosine Byla.
 Néo-arsycodile.
 Néo-Rhomnol.
 Neurolipase.
 Neuroplasmine Fort.
 Neurosine Prunier.
 Neurotrophol Byla.
 Névrosthénine Freyssinge.
 Nucléarsitol Robin.
 Nucléatol Robin.
 Opocalcium du D^r Guersant.
 Opothérapie Choay.
 Orexyl.
 Orchitine Byla.
 Ostéohépatine.
 Ovolécithine Billon.
 Ovomaltine.
 Pancalcine.
 Pangaduine.
 Pepto-fer Jailliet.
 Pepto-Kola Robin.
 Peptonate de fer Robin.
 Phos.
 Phosphate Pinard.

Phospho-fluor Beynet.
 Phostaniol.
 Phytine Ciba.
 Polyminéral Fort.
 Quassia-Kina Rabot.
 Quina Baron.
 Quinquine.
 Quinofidine Duriez.
 Quinquina Gmet.
 Rhomnol.
 Santogénol Caubin.
 Sérum névrosthénique
 Fraisse.
 Silicéyl.
 Sinrénaline Dehaussy.
 Sirop aux Hypophosphytes
 de Fellows.
 Sirop d'Hémoglobine Byla.
 Solution Henry Mure.
 Solution Pautauberge.
 Spectrol.
 Strychnarsitol Robin.
 Strychnofluocodyle.
 Synergyl Vadam.
 Synthol.
 Toni-lécithine Rogier.
 Tonikéine Chevrein.
 Tonudol.
 Tricalcine.
 Triféryl.
 Vanadarsine (ampoules-
 gouttes).
 Vanucléol.
 Vin de Bugeand.
 Zohol.
 Zomo musculosine Byla.
 Zymatine.

XXXV: — STOMATOLOGIE

Aniodol.
 Antipyrine Usines du Rhône.
 Aspirine Usines du Rhône.
 Boricine Meissonnier.
 Clonazone Daufresne.
 Crypthermol.
 Dial Ciba.
 Didial Ciba.
 Képhaldol.
 Mésoforme.

Nalodine.
 Néol.
 Névralgol Brossard.
 Pyramidon Usines du Rhône.
 Pyrethane.
 Quiétol.
 Spasmalgine Roche.
 Synthol.
 Véronidia Buisson.

XXXVI. — SYPHILIS

Acetylarsan.
 Arguéritol Lesure.
 Arsénobenzol.
 Biiodure Hg. Midy.
 Biiodures Souffron.
 Biodermyl Monal.
 Bismhydral.
 Bismuthoidol.
 Cathiote.
 Cérébrocrinol (Lipoides H. L.)
 Cyanhermine.
 Colloïdols du D Riquoir.
 Crypthermol.
 Curalues.
 Curiodol.
 Cytotropincs.
 Elixir Déret.
 Elixiriiododépuratif Pépin.
 Elixir Spes.
 Enésol.
 Eniote.
 Eparséno
 Eparséno infantile
 Eranol.
 Erythroloès.
 Galyl.
 Gambéol.
 Globules Fumouze.
 Granules Crosnier.
 Hectargyre.
 Hectine.
 Hermasinol.
 Hydrargol.
 Iodalose Galbrun.
 Iodarsenic Guiraud.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodéyl Fournier.
 Iodo-Bismuthate de Quinine Fraisse.
 Iodo-Bismuth Ercé.
 Iodogénol Pépin.
 Iodométine.
 Iodone Robin.
 Iodostarine Roche.

Iodurase Couturieux.
 Iodure Philippe.
 Iodures Souffron.
 Iode organique Boissy.
 Kolarsine.
 Lipiodol.
 Lipogyre Ciba.
 Lipoiodine Ciba.
 Luatol.
 Métarsénobenzol SACA.
 Musculargyre.
 Muthanol.
 Narsénol.
 Neoby Trouette Perret
 Néo-Iodine.
 Néo-Tréparsénan.
 Néo-Trépol.
 Novargyre.
 Novarsénobenzol.
 Oléo Bi-Roche.
 Oléo Iode Dubois.
 Pilules Lemary
 Plurion Couturieux.
 Pilules d'Hermal Bretonneau.
 Préventyl.
 Quinby (Quinio-Bismuth).
 Riodine.
 Rubyl.
 Sirop Crosnier.
 Staphylase iodurée du D Doyen
 Stovarsol.
 Sulfarène.
 Sulfarsénol.
 Sulfoiodol Robin.
 Suppargyres du D Faucher
 Suppositoires Corbières.
 Tarbisol
 Tartro-Bi Roche
 Thionhydrol Grémy.
 Tréparsénan.
 Trépol.
 Uroiodine.
 Veinargyre.
 Vin et Sirop Nourry.

XXXVII. - SYSTÈME VEINEUX - HÉMORROÏDES VARICES - ULCÈRES VARIQUEUX

Adrépatine.
 Angéine.

Aniodol externe.
 Antirrhoïde.

Anusol.
 Aphloïne.
 Baume Arôma.
 Baume Suelta.
 Carboxanis.
 Cratégine.
 Crème résolutive du D^r Rap.
 Diachusine.
 Dioséine Prunier.
 Elixir de Virginie Nyrdahl.
 Esculéol.
 Galyl.
 Glycocarpine.
 Gouttes fluxines.
 Gouttes de Sérù.
 Hamaméline Royà.
 Hamaméliode.
 Hamamélis Gmet.
 Hémagène Tailleur.
 Hémoductyl.
 Hemodrome.

Indhameline Lejeune (simple et pluriglandulaire).
 Iodamelis Logeais.
 Kerlöl.
 Panbiline.
 Pommade Logeais.
 Pommade Midy.
 Rectoline.
 Rectopanbiline.
 Silicyl.
 Suppositoires Logeais.
 Suppositoires Midy.
 Suppositoires Pepet.
 Synthol.
 Thyrodose.
 Tonyol F.
 Tot'Hamélis.
 Ulcéobande.
 Ulcéoplaque.
 Veinosine.

XXXVIII. — TUBERCULOSE

Algatan.
 Aloysine.
 Ampoules Churchill.
 Anaquintine.
 Angiolymphé du D^r Rous.
 Aniodol interne.
 Arséniode.
 Arsylène Roche.
 Ascoléine Rivier.
 Bactioxène.
 Balsamol.
 Beef Lavoix.
 Biocalcose Chevreton.
 Biogénol Demasles.
 Biozol.
 Cachets Roche de Thiocol.
 Calciline.
 Camphémol Ciba.
 Capsules de Morrhuine Puy.
 Capsules Sals.
 Carnine Lefrancq.
 Cathiade.
 Céréatose.
 Céréossine.
 Chlorocalcion.
 Cholergine.
 Colloïdogénine.
 Colloïxols du D^r Riquoir.
 Collothiol.

Composés Gmet.
 Comprimés Roche au Thiocol.
 Créosal Dubois.
 Crescol.
 Cytobiase.
 Diasol Progl.
 Diastogène.
 Dioradin.
 Doloma-Cenophos.
 Elatine Bouin.
 Elbon Ciba.
 Elixir Duchamp.
 Elixir Ducro.
 Embryonine Barré.
 Emulsion Marchais.
 Entérozone.
 Eranol.
 Eucalcium.
 Eucalyptine Le Brun.
 Eucytol.
 Farines maltées Jammet.
 Fluidose.
 Fortossan Ciba.
 Fosfoxyl Carron.
 Galacalcine La Tour.
 Gaurol.
 Géodyl.
 Germose.

Globugénol Chanaal.
 Globules Fumouze.
 Glutinettes d'hémoglobine
 Glycérophosphate Dalloz.
 Goménol.
 Gouttes livoniennes de
 Trouette-Perret.
 Gouttes Nican.
 Gouttes Scandinaves.
 Granulé Carezmel.
 Granules Crosnier.
 Heetine.
 Héltal.
 Hémagécine du D^r Giraud
 Hémolixine Branchu.
 Hémoglobine Dalloz.
 Hémoglobine Deschiens.
 Hémostyl du D^r Roussel.
 Hépatotanie Grémy.
 Hipposarcine Roy
 Histogénol Naline.
 Holos.
 Hypodermozone.
 Hypophosphites Churchill
 Immunizols Grémy : Abscès
 froids. — Fistules.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodéine Montagu.
 Jugland Gmet.
 Kola Astier.
 Kola Midy.
 Kolatinés.
 Lipocythol Grémy.
 Manganoxyl.
 Mésothorium Buisson.
 Morrhualène Gautier.
 Morrhuétine Jungken.
 Morrhuol.
 Morucalcium.
 Musculosine Byla.
 Neuroplasma Fort.
 Néocarsycodile.
 Nergine Heudebert.
 Neurotrophol Byla.
 Nucléarstol Robin.
 Nucléatol Robin.
 Œnophos.
 Oléo-iodé Dubois.
 Opocalcium du D^r Guersant
 Optarségol.
 Ostéohépatine.
 Ostréine Buisson.
 Oxy-injecteur du D^r Fialip.
 Panbiline.

Pancalcine.
 Panfébrine.
 Pélospanines Fournier.
 Perles Taphosote.
 Persodine.
 Phosote Lambiotte.
 Phospho Fluor Beynet.
 Phosphopinal Juin.
 Prostaniol.
 Phytine Ciba.
 Pneumocratol.
 Pneumotanie Grémy.
 Pneumobiol.
 Pulmocardine.
 Pulmostéryl.
 Quina Baron.
 Rectopanbiline.
 Résyl Ciba.
 Santogénol Caubin.
 Sauge Gmet.
 Sérum antiphymique
 Vadam.
 Séroplase.
 Silicéyl.
 Sirop Crosnier.
 Sirop Lancelot.
 Sirop Roche au Thiocol.
 Sirop phénique Vial.
 Spectrol.
 Terkal Monal.
 Thalaxotonine Vadam.
 Thiocol Roche.
 Thiopeptone.
 Tonikéine Chevreton.
 Tonudol.
 Tricalcine.
 Triféryl.
 Tuberculline C. L.
 Tubérol.
 Urolodine
 Vaccin antiasthmatique.
 du prof. Minet.
 Vanadarsine (ampoules,
 Gouttes).
 Vanadine Bocquillon.
 Vanucléol.
 Vérianne Buriat.
 Vin de Bugaud.
 Vioxyl.
 Vitamyl.
 Zimbyl.
 Zohol.
 Zomo-musculosine Byla.

XXXIX. — TUMEURS — CANCER

Aniodol.
Backerine activée.
Diachusine.
Doloma.
Néolyse et Sero-Diagnostif
Thomas et Benetti.
Néopla lysines de D^r Riquoir

Enophos.
Papier Fayard.
Patholysine.
Radiolysine.
Verrulyse.
Zimbyl.

XL. — VERS INTESTINAUX

Bismuth Desleaux.
Chénanthol.

Curoxyure.
Tenifuge Bardet.

XLI. — VOIES GÉNITO-URINAIRES

(REINS, VESSIE, URÈTRE, TESTICULES, etc...)

Adrépatine.
Anexol.
Aniôdol interne.
Antiurique de Contrexé-
ville.
Archéol.
Benzophosphine Christiaens.
Blennosine.
Boricine Meissonnier.
Capsules Bardet.
Carbosanis.
Clonazone Daufresne.
Colchi-Sal Midy.
Dmagon (Néo).
Eau de Saint-Colomban.
Elatine Bouin.
Eumictine.
Extrait Rénal Choay.
Extrait Rénal Moncour.
Formocarbène.
Globules Ramon.
Glyco-Phytol.
Goménol.
Gonacrine.
Gynergène.
Hamamelis Gmet.
Hemypnal.
Hétérolysine Olivier.
Héxotal.
Immunizols Grémy: Uré-
thrite.
Néphrocerinol (Lipoïdes
H. L.)

Panbiline.
Panurol Tissot.
Pilules du D^r Beaufumé.
Pipérazine Midy.
Préventyl.
Rectopanbiline.
Rhéantine Lumière.
Salol Usines du Rhône.
Salsanos.
Santal Monal.
Sécaeoranine Roche.
Sektal Grémy.
Septicémine.
Sornyl.
Sphérulines Moncour.
Théobryl Roche (Ampou-
les, Gouttes).
Théoxanthine.
Thigénol Roche.
Uracétose.
Uraséol.
Urseptine Rogier.
Urazine.
Urifluine.
Urilyson.
Urisanine.
Uroformine Gobey.
Uroiodine.
Urométine Lambiotte.
Urosan Dufayard.
Zimbyl.

2^e Partie

**DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES**

Médecine

ACÉSINE GUILLAUMIN

Composition. — L'Acésine est une pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chlorétone et de stovaine.

Propriétés. — Agent analgésique et vasoconstricteur dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier, dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

Indications. — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

Mode d'emploi. — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externe; quand les hémorroïdes sont internes, visser sur le tube la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications trois ou quatre fois par jour.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

ACÉTYLARSAN

(Oxyacétylamino-phénylarsinate de diéthylamine)

TRAITEMENT INTENSIF

DE LA

SYPHILIS

par voies Sous-Cutanée ou Intra-Musculaire

Activité thérapeutique sensiblement
égale à celle des arsénobenzènes.

Injectons véritablement indolores.

Extrême facilité d'emploi.

Très faible toxicité.

ACÉTYLARSAN pour ADULTES

Solution à 23,6 o/o
1 cc. = 5 cgr. d'Arsenic
Ampoules de 3 cc.

ACÉTYLARSAN INFANTILE

Solution à 0,4 o/o
1 cc. = 2 cgr. d'Arsenic
Ampoules de 2 cc

Boîtes de 10 ampoules.

Labor^{es} des Produits "USINES DU RHONE"

21, Rue Jean-Goujon - PARIS (8^e)

ACHANOL

Anti-Opium

Produit français exempt de Toxiques
des Tableaux A et B

à base de (Berberine-Hélénine-Granatotanin)

L'Achanol est l'élément chimiothérapique rationnel pour le traitement du morphinisme, du thébaïsme et des intoxications chroniques par les poisons stupéfiants.

L'Achanol permet d'obtenir un sevrage rapide et sans troubles pénibles et prémunit le convalescent contre les rechutes.

Demander la brochure rédigée à l'usage
exclusif des Médecins.

Produits Biologiques et Physiologiques
286, Faub. Bannier-Les Aydes — ORLÉANS

ADREMINÉ

Action. — **L'ADREMINÉ** possède une action :

- 1° Sur la pression sanguine;
- 2° Sur le cœur;
- 3° Sur les fibres musculaires-lisses et plus électivement sur celles des petits vaisseaux;
- 4° Sur la nutrition.

Posologie :

Per os C gouttes à doses fractionnées (toutes les heures, par exemple).

Injectons sous-cutanées, 1 à 10 mmgr., par séries d'injections dans les 24 heures.

Pharmacie du docteur MIALHE

8, rue Favart — PARIS

ADRÉNALINE

“ Usines du Rhône ”

SCURÉNALINE

Adrénaline synthétique lévogyre Codex chimiquement pure “ Usines du Rhône ” en solution stable au millième.

Flacons de 10 à 30 cc.

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc.

Laboratoire des Produits

“ USINES DU RHONE ”

21, rue Jean Goujon — PARIS (8^e)

ADRÉPATINE

POMMADE — SUPPOSITOIRES

Association paraglandulaire

Composition. — Extraits d'Organes : Foie, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse, Prostate.

Extraits Végétaux : Marron d'Inde finis stabilisés, Capressus, Hamamelis.

Excellents Antiseptiques et Calmants.

Propriétés et Indications thérapeutiques. — L'Adrépatine est une préparation pharmaceutique qui :

- 1^o Par les extraits paraglandulaires englobés ;
- 2^o Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;
- 3^o Par son action vaso-constrictrice locale ;
- 4^o Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique, est destinée à combattre non seulement l'espérithose adénomateuse et les complications de l'infection primitive, mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui préexistent à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des Hémorroïdes internes et externes, des Rectites, et Prostatites, du Prurit anal, des Fistules.

Mode d'emploi. — De 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de Pommade est muni d'une canule rectale.

Laboratoires LALEUF

49, avenue de La Motte-Picquet — PARIS (15^e)

Téléphone : Ségur 67-01

ÆTHONE

*Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche
et de la Toux*

Doses. — Pour les enfants, administrer :

5 à 6 fois par jour	{	de 1 mois à 1 an : Une goutte par mois d'âge. de 1 à 2 ans : 12 à 20 gouttes. de 2 à 5 ans : 20 à 25 gouttes. de 5 à 10 ans : 25 à 30 gouttes. de 10 à 15 ans : 30 à 35 gouttes. et plus s'il est nécessaire.
------------------------	---	--

2- Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : 50 à 60 gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée ou de sirop de tolu additionné d'eau. La dose totale pour les adultes peut être portée à 400 gouttes par 24 heures, s'il est nécessaire. L'Æthone doit être administré 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

FALCOZ & C^{ie}

9, Rue Boissonade — PARIS

AGOMENSINE CIBA

Substance protéidique extraite de l'ovaire, appartenant à la classe des hormones, soluble dans l'eau.

Action Physiologique.

Favorise le flux menstruel, accélère le développement des organes et l'apparition des caractères sexuels secondaires.

Indications :

I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées.

II. — Malaises qui précèdent ou qui accompagnent l'installation de la menstruation.

III. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale.

IV. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

Comprimés — Ampoules.

Doses. — 3 à 9 comprimés par 24 heures, 1 ou 2 ampoules.

Le flac. de 20 comp. 9 fr. ; la Boîte de 4 amp. : 12 fr.

(Voir Sistomensine)

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

AIROL " ROCHE "

Combinaison basique de bismuth oxyiodé donnant, au contact des plaies, de l'iode à l'état naissant.

AIROL " Roche ", en poudre.

Prop. thérap. — Antiseptique puissant, désinfectant, cicatrisant, kératoplastique, sans odeur, inaltérable à la lumière; toxicité moindre que celle de l'iodoforme (dont l'*Airol " Roche "* est le seul succédané pratique).

Indic. thérap. — Toutes celles de l'iodoforme.

Bien spécifier la marque " Roche ".

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie

21, Place des Vosges, PARIS

ALEPSAL GENEVRIER

Spécifique de l'Epilepsie et des Convulsions
(Communication à la Sté Médico-Psychologique de Paris)

Chaque comprimé renferme 0,10 de Phényl-éthylmalonylurée très pure associée à la Belladone stabilisée et à la Triméthylxanthine.

Posologie. — 2 comprimés par jour, absorbés purs ou dans une boisson chaude; le premier le matin au réveil, le deuxième le soir vers 5 heures. **AUCUN RÉGIME SPÉCIAL.**

« Avec l'ALEPSAL, les convulsions disparaissent sans observer de troubles psychiques; l'intelligence de l'ÉPILEPTIQUE s'éveille et son activité s'accroît normalement. » (Dr Ducoste, médecin chef des Asiles de la Seine).

Contre-Indications. — Néant.

Prix : Le tube, 6 francs

Laboratoire GENEVRIER

33, boul. du Château — NEUILLY-PARIS

ALGATAN

Hyposulfite-iodotannate de soude en milieu sulfocalcique fluoré. Iode entièrement assimilable sans iodisme.

Formes. — Cachets dosés à 1 gr. (correspondant à 0 gr. 03 d'iode métalloïdique ou à 0 gr. 50 de teinture d'iode). - Comprimés : 0 gr. 50 (correspond à 0 gr. 0165 d'iode métalloïdique ou à 0 gr. 25 de teinture d'iode).

Indications thérapeutiques. — *Tuberculose pulmonaire, intestinale et osseuse. Artério-sclérose. Emphysème. Asthme. Catarrhe bronchique. Affections cardio-vasculaires, Rachitisme. Tertianisme, Déchéance physique.*

Dose et mode d'emploi. — *Cachets* : Adultes : 2 à 6 cachets par jour.

Enfants : 1/2 cachet à 2 cachets suivant l'âge.

Comprimés : Adultes : de 4 à 12 comprimés par jour.

Enfants : 1 à 4 comprimés par jour suivant l'âge.

Laboratoires de L'ANIODOL

40, Rue Condorcet — PARIS

ALGOCRATINE

(Citrates de Phénylamidoxanthine)

Forme. — Cachets de 0 gr. 75.

Indic. thér. — Migraines, névralgies, sciaticques. En général toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les cas de *règles douloureuses*.

Posologie. — Un cachet dès les premiers symptômes de douleurs, un autre une heure après si nécessaire. Trois cachets par 24 heures.

Littérature, Echantillons :

LANCOSME

71, Av. Victor-Emmanuel-III — PARIS (8^e)

ALGOLANE

Médicament analgésique puissamment actif, sans odeur désagréable, - non irritant, exempt des inconvénients des préparations salicylées destinées à l'usage externe.

Indications. - S'emploie avec succès contre le rhumatisme aigu, subaigu ou chronique; les névralgies de toute nature; les douleurs musculaires (lumbago, torticollis), les douleurs de la colique hépatique; le prurit.

Mode d'emploi. - Verser quelques gouttes d'Algolane sur la région douloureuse, les étaler par une friction légère, recouvrir d'un imperméable et d'un pansement ouaté.

Littérature sur demande.

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

ALIBOURINE

Formes. — 1° *Pommade* en tube de 50 gr. environ.

Composition. — Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs, Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli, Extrait d'Hamamelis et de Millepertuis, Lano vaseline.

Indications. — *Eczémas suintants, Impétigo, Teigne, Plaies, Ulcères variqueux, Erysipèle.*

2° *Solution* concentrée, flacon de 60 cc.

Composition. — A base de sulfates de cuivre et de zinc purs, donne, diluée dans un litre d'eau, une solution se rapprochant d'une Eau d'Alibour 1/3 et chimiquement pure.
Ces deux préparations n'irritent jamais.

LABORATOIRES B. E. A.

Ch. BEHA, Pharm. de 1^{re} Classe — BELFORT

ALIMENT TINARDON

Nutrition - Recalcification - Reminéralisation

Forme. — En paquets dosés pour la préparation, soit au lait, soit à l'eau, d'un entremets agréable.

Composition :

Carbonate de chaux..	0 30	Lactose.....	2 30
Phosphate de chaux..	0 20	Caséine purifiée.	0 50
Glycéroph. de chaux..	0 05	Arrow Root.....	4 »
Magnésie calcinée. ...	0 03	Sucre.....	12 »
Eléments céréalo-légumineux.....	5 »	Cacao vanillé.	8 50

par paquet.

Posologie. — *Enfants* : 1 à 2 paquets par jour.
Adultes : 2 à 3 — — —

Indications. — Dégénérescence infantile, Scrofule, Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} Classe,
de l'École Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques est devenu le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du médecin.

ALLONAL " ROCHE "

ANALGESIQUE RENFORCÉ

Action thérapeutique. — L'Allonal Roche est l'isopropylpropénylbarbiturate d'amidopyrine ; il représente les propriétés calmantes bien connues de l'amidopyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnotiques de l'acide isopropylpropénylbarbiturique ($C^{10}H^{14}O^3Az^2$).

Indications thérapeutiques. — Douleurs, abcès, névralgies empêchant le sommeil ; insomnies légères ou tenaces associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le surmenage, la fatigue, la neurasthénie, agitation, excitation, délires, etc.

Avantages.

L'Allonal Roche ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées ; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté ; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal ; il n'a aucune action nocive ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

Comprimés. — Chaque fl. contient 12 compr. Chaque compr. = 0.16 isopropylpropénylbarbiturate d'amidopyrine.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 compr. p. 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, av. un peu d'eau ou de tisane $\frac{1}{2}$ h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS 3^e

ALOYSINE

A base de suc d'ail

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'haleine aucune odeur alliée.

Formes. — Pilules : pommade.

Indications. — *Pilules* : Entérites, Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire.

Pommade. — Tuberculoses externes, Plaies suppurées, Dermatose, etc.

Posologie. — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension, interrompre 48 heures tous les deux jours).

Laboratoire GOUZENE

139, rue de Paris, 139

à PANTIN (Seine)

ALUCOL WANDER

(Hydrate d'alumine colloïdal)

Réducteur d'HCl/

Traitement sédatif et curatif de l'hyperchlorhydrie et de l'auto-intoxication intestinale.

1. Protection de la muqueuse stomacale par le mucilage colloïdal qui forme l'ALUCOL au contact du suc gastrique hyperacide.
2. Fixation par cette masse mucilagineuse des principes fermentescibles et entéro toxines.

Formes. — Cachets et comprimés.

Paquets (dose spéciale - 3 gr. - pour pansement gastrique et traitement des états aigus).

Doses. — Un à deux cachets ou comprimés une heure avant et une ou deux heures après chacun des principaux repas.

Le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau sucrée, le matin à jeun, demi-heure avant le petit déjeuner et et environ deux heures après le repas, midi et soir.

Le traitement peut être renforcé sans inconvénient suivant l'avis du médecin.

Etablissements WANDER

58, rue de Charonne - PARIS (XI^e)

ALUNOZAL

(Salicylate basique d'Alumine U. R.)

L'ALUNOZAL libre, dans l'intestin seulement, l'alumine dont l'état gélatineux intensifie le pouvoir d'absorber les toxines et les propriétés astringentes. Ces effets sont heureusement complétés par l'action analgésique et antiseptique du salicylate alcalin formé.

ANTIDIARRHEIQUE PUISSANT

(Diarrhées aiguës, chroniques. Diarrhées des tuberculeux. Diarrhées des nourrissons)

Tolérance stomacale parfaite Toxicité nulle

Présentation et mode d'emploi. — 1° COM-
PRIMES à 0 gr. 50 (Tubes de 20), 2 à 10
pro die.

— 2° GRANULES à 25 %. Une
faible cuillerée à café correspond à un
comprimé.

Laboratoire des Produits USINES DU RHONE

21, Rue Jean Goujon, 21 — PARIS (8°)

AMIBIASINE

(Extrait de garcinia composé.)

(Accepté par le Service de Santé.)

Non toxique — Sans contre-indications.

Solution brune stabilisée, de saveur amère.

Action. — Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales, du ténésme. Antihémorragique et antidiarrhéique énergique. Agit sur l'amibe et ses kystes.

Indications. — Diarrhées de toutes natures et origines. — Dysenterie amibienne, bacillaire. — Entérites chroniques, muco-membraneuse, tuberculeuse. — Diarrhée infantile, cholériforme.

Dose :

Fermes aiguës : 6 à 12 cuill. à café « pro die » pendant 1 à 2 jours

Fermes chroniques : 3 à 6 — — — — 4 à 5 jours

Diarrhée infantile. Formuler : Amibiasine B. B. ou :

Manne en larmes 5 gr.

Eau bouillie..... 10 gr.

Amibiasine . . . 15 gr. (3 cuill. à café.)

(Dose à donner dans la journée et répéter pend. 3 à 4 jours.)

Remplacer le lait par l'eau bouillie ou eau de riz sucrée.

Littérature et Echantillons

Lab. AMIBIASINE : 27, rue de Miromesnil - PARIS

AMIDAL

Amidon paraffiné — Ferments lactiques

Formes. — Poudre et comprimés.

Indications. — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, source d'artério-sclérose, appendicite chronique.

Mode d'emploi. — Deux à trois cuillerées à soupe ou croquer six à huit comprimés par jour.

Laboratoire des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, Place des Vosges — PARIS (IV^e)

AMPOULES BOISSY

pour INHALATIONS

AMPOULES BOISSY de NITRITÉ d'AMYLE

Indications. — *Angines de poitrine, Hémoptysies, Crises gastriques du Tabès, Syncope, Mal de mer, Migraines, Epilepsie, Hémiplégie hystérique, etc.*

AMPOULES BOISSY d'IODURE d'ÉTHYLE

Indications. — *Asthme, Emphysème, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.*

Mode d'emploi. — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts, et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main.

Laboratoire BOISSY

32 bis, boulevard d'Argenson,
à NEUILLY-sur-SEINE

AMPOULES CHURCHILL

INDOLORES

à base d'Hypophosphites

Agents les plus actifs de la médication reconstituante
par le Phosphore

Ampoules indolores de Poliol Churchill : 0,10 d'Hypophosphites composés dans la proportion des bases minérales de l'organisme, avec addition de Méthylarsinate de Strychnine : 1 mgr. — *Indiquées* dans la Neurasthénie et dans tous les cas exigeant un reconstituant énergique.

Ampoules indolores d'Iroï Churchill, à base d'Hypophosphite de fer : 0,002 dans 1 cm³. — *Indiquées* dans Anémie, Chlorose, Aménorrhée, Dysménorrhée, Ictère hémolytique.

Ampoules indolores de Linol Churchill, à base d'Hypophosphite de chaux : 0,10 dans 1 cm³. — *Indiquées* dans Phosphaturie, Tuberculose, Asthénie, Diabète, Rachitisme, Dentition, Bronchites.

Ampoules indolores de Sorol Churchill, à base d'Hypophosphite de soude : 0,10 dans 1 cm³. — *Mêmes indications*, mais en cas d'Hypertension artérielle et d'âge avancé.

Et de tous autres Hypophosphites : Manganèse, Quinine, etc.
9 fr. la boîte de 10 ampoules (Prix réglementé)

PHARMACIE SWANN

12, Rue Castiglione, 12 — PARIS

AMPOULES DE DIGALÈNE

“ ROCHE ”

(Digitale injectable)

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

1 cc. $\hat{=}$ 0,15 ctg. poudre de feuilles fraîches de digitale.

Dose moyenne. — 1 à 4 ampoules et plus par 24 heures.

Prop. thér. — Solubilité parfaite, dosage rigoureux. — Action très rapide, tolérance absolue, effets constants aux mêmes doses, pas d'accumulation. (Voir Digalène “ Roche ”).

injections. — Hypodermiques, *intra-veineuses* intra-musculaires (indolores).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

AMPOULES DE PANTOPON

" ROCHE "

(opium total injectable)

1 amp. de 1 cc. = 0,02 etg. de Pantopon "Roche"

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 amp. par 24 heures et plus. Enfants 1/4 à 1/2 amp. par année d'âge et par 24 heures.

Indic. thér. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Le PANTOPON "ROCHE" représente tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0,01 etg. de Pantopon "Roche",
= 0,50 etg. de teinture d'opium,
= 0,025 mgr. d'extrait d'opium,
= 0,005 mgr. de morphine.

Boîtes de 3, 6 et 12 Ampoules

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges, PARIS

AMPOULES REIPAR

Composition :

Acide salicylique d'origine végétale et stabilisé par des procédés spéciaux.

Indications :

Tous les rhumatismes vrais, toutes les algies rhumatismales. Sciatiques.

Action :

Curative certaine, sédative très rapide.

Mode d'emploi :

En injections sous-cutanées, suivant les indications de la notice.

Echantillon gratuit à réception d'une simple carte de visite adressée au

Laboratoire du REIPAR

LUCQUY — (Ardennes)

AMPOULES DE SÉCACORNINE " ROCHE "

(Tous les principes actifs de l'ergot de seigle)
(Voir page spéciale Sécacornine " Roche ")

Indic. thér. — Hémorragies de toute nature, myocardites, congestion des poumons et de l'encéphale, atonie utérine avant, pendant et après les accouchements.

Doses et mode d'emploi. — 1 ampoule de 1 cc. de Sécacornine " Roche " agit comme 4 grammes de seigle ergoté.

Doses moyennes : 1/2 à 1 ampoule par jour.

Dose d'urgence : 2 ampoules et plus par 24 h.

(Voie hypodermique ou intramusculaire).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}
21, Place des Vosges — PARIS (3^e)

AMPOULES DE SPASMALGINE " ROCHE "

(Antispasmodique vrai)

Composition. — Chaque ampoule contient :

Un centigramme Pantopon " Roche ".

Deux centigrammes Papavérine " Roche ".

Un milligramme Atrinal " Roche ".

(Voir page spéciale Spasmalgine " Roche ")

Indications thérapeutiques. — *Tous les états spasmodiques* et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'estomac, de l'intestin, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation ante et post-opératoire, accouchements difficiles, tous états d'hyperexcitabilité, etc.

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour (par voie hypodermique ou intramusculaire).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}
21, Place des Vosges — PARIS (3^e)

AMPOULES DE THÉOBRYL

" ROCHE "

(Théobromine injectable)

Indications. — Toutes les fois que la Théobromine n'a rien donné, qu'il y a intolérance gastrique ou susceptibilité des malades ou chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

Doses et mode d'emploi. — Chaque ampoule = 2 cc.

Dose moyenne utile : Adultes, 1/2 ampoule 2 à 4 fois par jour.

Enfants, 1/4 ou 1/2 doses.

Dose d'urgence . . . Adultes, 3 à 4 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

Enfants, 1 à 2 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

(Par voie endoveineuse ou intramusculaire).

Nota. — Les injections intramusculaires sont indolores; il faut les faire à la face externe de la partie fessière de la cuisse — (Voir thèse du Dr Jouisse, Paris 1920) et les travaux des Prof. Pouchet, Rémond, Dubot, des Drs Richard St-Yves, Vigouroux, Ségard, Bénéch, etc.)

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, Place des Vosges — PARIS (3^e)

AMYLODIASTASE THEPENIER

Phosphates, Diastases et vitamines
de croissance des Céréales germées

Formes. — Comprimés et Sirop.

Indic. Thé. — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique) Tuberculose, Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive). Maladies par carence, digestion des féculepts.

Mode d'emploi. — Deux comprimés ou deux cuill. à café de sirop, après les repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou 2 comprimés écrasés d'amylodiastase dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Laboratoire des Ferments
du Docteur A. THÉPÉNIER

12, Rue Clapeyron — PARIS

R. C. Seine 120 854

ANAPEPTONE VASSAL

Forme. — Comprimés de Peptone, remplaçant les cachets (conservation parfaite).

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme, urticaires, troubles intestinaux.

Echantillon gratuit sur demande.

Etablissements Léon DANJOU

LILLE

ANAQUINTINE LESCÈNE

Composition. — Aldéhydes benzylcinnamiques, thymol-eucalyptol.

Forme. — Liquide légèrement rosé, entièrement miscible à l'eau.

Propriétés. — Puissant antiseptique diffusible. En applications sur la gorge et la poitrine, elle agit comme antispasmodique et réalise l'antisepsie des voies respiratoires.

Indications. — Traitement externe de la Coqueluche, des toux spasmodiques, asthme, laryngites, coryza.

Associée au *Balsamol*, elle constitue le traitement conjugué des toux spasmodiques donnant des résultats remarquables particulièrement dans la Coqueluche.

Prophylaxie des maladies contagieuses en asperersion sur les vêtements, linge, draps, etc. et en inhalations.

Mode d'emploi. — La diluer de 4 à 5 parties d'eau chaude pour compresses sur la gorge et la poitrine, recouvrir de taffetas gommé et d'une bonne couche d'ouate, laisser en place toute la nuit.

En inhalations et en aspersions, l'employer pure.

Laboratoires LESCÈNE

à LIVAROT (Calvados)

ANDROSTINE CIBA

(Extrait complémentaire)

Hormone issue de la lignée spermatogénétique de la glande génitale mâle.

Action physiologique. — Neutralisatrice de la sécrétion ovarienne excessive et action de suppléance à celle-ci lorsqu'elle est absente (castration).

Peut se formuler en association avec Agomensine ou Sistomensine suivant le cas.

Indications. — Ménopause chirurgicale. Hypersthénie génitale, érotomanie, onanisme, troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle.

Doses. — 2 à 6 comprimés par jour.

Le flacon de 40 comprimés : 10 francs.

Laboratoires Ciba, O. ROLLAND

1, place Morand. Lyon

ANGEINE

Vasoconstricteur. Hémostatique. Sédatif

Composition. — Extrait Hamamelis, Hydrastis, Viburnum, aa.

Forme. — Gouttes concentrées.

Avantages. — Composition stable ne précipitant pas (ni immédiatement ni tardiv.)

Action certaine et constante. — Les formules magistrales contenant un mélange d'hydrastis et d'hamamelis donnent une préparation trouble qui s'éclaircit rapidement p. addition de quelques gouttes d'HCl; mais l'aspect limpide ne persiste pas et il se forme dans les 48 h. un dépôt tantôt amorphe, tantôt cristallisé contenant la majeure partie de l'hydrastis (produit actif de l'extrait fluide de l'hydrastis) qui se trouve complètement perdu dans ces préparations.

Ind. thér. — Dysménorrhées, métrorrhagies, varices, hémorroïdes, tr. de la ménopause.

Posol. — 15 à 30 gttes, 2 f. p. j dans de l'eau au début des repas.

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo. — PARIS-XVI^e

ANGIOLYMPHE DU D^r ROUS

Prétuberculose — Tuberculose

Dans toutes ses manifestations : Pulmonaire, Ganglionnaire, Ossuse, Péritonéale, Rénale, Intestinale.

Indications. - Dans les formes pulmonaires : DIMINUTION et DISPARITION de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs, de la Fièvre et de tous les Symptômes.

AUGMENTATION de l'appétit, du poids, des forces, du sommeil, amélioration rapide de l'état général.

DIMINUTION, DEGENERESCENCE et DISPARITION des BACILLES DE KOCH et autres microorganismes pathogènes, dans les formes ganglionnaires, osseuses rénales etc. Amélioration rapide de tous les symptômes. Une boîte suffit d'ordinaire pour donner un commencement d'amélioration sensible.

Posologie. - De 2 à 5 cc. en une injection dans la fesse, faite quotidiennement, par série de 8 à 12, et reprise après 10 à 12 jours d'interruption.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4^{bis}, Rue Hébert — COURBEVOIE

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

ANIODOL

Le plus puissant antiseptique ext. et int.
diffère de tous les antiseptiques
par son absence de toxicité et de causticité

**Combinaison de triformal glycérine
et d'oxyméthylène sulfocarbimide**

Antisepsie externe

Formes. — Solution normale ; solution concentrée ; comprimés ; poudre ; savons ; ovules ; vaseline.

Indications. — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

Mode d'emploi et doses : Normale: 1 cuillerée à bouche p. 1 litre d'eau. Concentrée: 30 gttes ou 1 division p. 1 lit. Comprimés: (injections vaginales) $\frac{1}{2}$ comprimé p. 1 lit. d'eau. Poudre: saupoudrer les parties malades (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Savon: asepsie et désinfection des mains et des plaies. Ovules: (gynécologie) un ovule le soir. Vaseline: plaies, accouchements, rhinologie.

Antisepsie interne

Forme. — Gouttes.

Indications. — Fermentation gastro intestinale, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, gripes, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

Mode d'emploi et doses: 50 à 200 gttes p. jour en 3 ou 4 fois dans de l'eau ou une tisane.

Laboratoires de L'ANIODOL

40, rue Condorcet, Paris

Envoi échantil. gratuits à MM. les Docteurs

ANTALGOL DALLOZ

Composition. — Quino-Salicylate de pyramidon.

Forme. — Granulé.

Propriétés. — Analgésique par le pyramidon. Antiseptique par l'acide salicylique. Dissolvant de l'acide urique par l'acide quinique.

Indications. — Rhumatisme aigu ou chronique. Goutte. Lumbago. Sciatique. Migraines. Névralgies. Grippe. Contre l'élément Douleur en général.

Dose. — 2 à 4 cuill. à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans de l'eau.

Laboratoire DALLOZ

13, Boulevard de la Chapelle — PARIS (10^e).

ANTASTHENE

Composition. — Reconstituant du système nerveux, à base de glycérophosphates associés à un extrait cérébral et spinal.

Forme. — Comprimés - Ampoules de 2 cc.

Indications. — Reconstituant du système nerveux; particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

MODE D'EMPLOI.

Enfants : 1 injection tous les deux jours.
2 comprimés par jour aux repas.
Adultes : 1 injection par jour.
4 comprimés par jour aux repas.

Laboratoire de Biologie Appliquée

H. CARRION & C^{ie}

54, Faubourg Saint-Honoré - PARIS VIII

ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique
des Docteurs DUFOUR et LE HELLO

Médication antihémorragique basée sur un principe entièrement nouveau. Les propriétés coagulantes de ce sérum proviennent de réactions anaphylactiques provoquées à dessein chez l'animal qui le fournit. L'anaphylaxie passive ainsi réalisée est sans inconvénient pour le malade.

Principales indications. — Etats hémorragiques, hémophilie, toutes les hémorragies inaccessibles à l'action chirurgicale ou rebelles aux moyens hémostatiques habituels : Epistaxis, Hémoptysies, Hémorragies intestinales, etc. Préventif antihémorragique avant l'intervention chirurgicale.

Mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intra-musculaire à la dose de 10^{cc} (une ampoule). On peut, en cas de besoin, répéter les injections au bout de quelques heures ou les jours suivants.

Pas de contre-indication.

Littérature sur demande

Les Etablissements POULENC Frères
86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (2^e)
R. C. Paris 5386

ANTHRAXONE

Vaccin buccal contre la Furunculose

Principe actif. — Staphylocoques de différentes souches, spécialement préparés.

Indications. — Remplace avantageusement tout autre traitement de la Furunculose.

Forme. — Flacon de 30 pilules.

Dose. — 1 à 3 pilules, trois fois par jour, une demi-heure avant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Fait disparaître les Furoncles naissants, fait mûrir les autres.

Echantillons sur demande

INSTITUT de MICROBIOLOGIE-SARREBRUCK

ANTIALGOS CHRISTIAENS

Solution d'iodo-salicylate de colchicine en solution salicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique...	3 gr. 50
Colchicine...	0 gr. 005
Iode (ce qui peut se combiner).....	1 gr. environ
Excipient, Q s. p' 100 cm ³ .	

Dose et mode d'emploi. — *Acuts* : Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

Indic. thér. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc. (Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, les reins, le foie et l'estomac). Calme l'accès en 24 heures.

Le flacon, 20 francs

Le demi-flacon, 12 francs

LABORATOIRES DE LA PHARMACIE DE LA
PLACE ROYALE, 3, rue du Champ-de-Mars, REIMS
Compte Postal PARIS 214.33
R. C. Reims 4478

ANTI-ASTHMATIQUES du Docteur CLERY

Formes. — Poudres et Cigarettes.

Composition. — Solanées sélectnitrées.

Indicat. thérap. — Médicat. classique anti-dyspnéique. Sédation immédiate et traitement des crises d'Asthme et d'Oppressions.

Mode d'emploi. — Allumer un petit cône de poudre sur une assiette et respirer doucement la fumée qui s'élève.

Cigarettes : 1 à 6 par jour ; avaler la fumée au moment de la dyspnée.

Très efficaces, d'un usage pratiqué, sont comparativement très agréables.

LABORATOIRES DU D. CLERY,
57, Boulevard Saint-Martin — PARIS

ANTIASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de
Solanées nitrées et Menthol

Mode d'emploi — En faire brûler une petite pincée sur une soucoupe et, fermant les yeux, respirer doucement la fumée par les narines.

Indications. — Remède d'urgence dans les accès d'*Asthme*, *Emphysème*, *Coryza*, *Asthme des foins*, *Bronchites chroniques*, etc.

CIGARETTES SCHULZÉ-BENGALAIS

aux mêmes principes

Echantillons gratuits au Corps Médical et aux Malades sur recommandation du médecin traitant.

Laboratoires FAGARD

44, Rue d'Aguesseau. — BOULOGNE-sur-SEINE
Téléphone 705

DERNEVILLE

7, Rue Joncker — BRUXELLES — Téléphone 111-73

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

ANTI-ASTHME DEHAUSSY

Forme. — Pilules.

Composition et propriétés. — A tout *asthme*, quelle que soit sa forme, il faut une *même médication de fond*, visant le déséquilibre vago-sympathique commun à tous ces malades (Lobélie, belladone, adrénaline, calmants anti-asthmiques divers).

A chaque forme d'asthme, il faut, en outre, sa *médication complémentaire spéciale*. C'est pourquoi à la médication de fond ci-dessus, on a ajouté, selon la forme d'asthme à traiter, des agents complémentaires différents (iodure, expectorants, balsamiques, eupnéiques...), — L'Anti-asthme se présente donc sous les trois formes suivantes :

Anti-Asthmine A (Pure) *Asthme pur*, sans expectoration ou avec expectoration difficile.

Anti Asthmine B (Benzoïnée). — *Asthme vieilli* avec bronchite chronique et emphysème.

Anti-Asthmine C (Toni-cardiaque). — *Asthme vieilli* avec tendance à l'insuffisance cardiaque.

Les états asthmatiformes des vieux touseurs, avec dyspnée survenant par paroxysmes sont de même justiciables de l'Antiasthmine.

Doses et mode d'emploi :

— Pilules : Adultes, 4 à 6 par jour ; à dix ans, 2 à 3 par jour.

Laboratoires Ed. DEHAUSSY
44, rue Inkermann, 44. — LILLE.

ANTIGRIPPINE MIDY

(Acéto-Phényl-Salétidine, poudre de Gelsemium et poudre de Dower)

Ni Quinine — Ni Antipyrine

Cachets dosés à 0,65 cgr.

Dose et mode d'emploi. — 1 cachet à distance des repas, de préférence le soir au coucher, dans un grog chaud; renouveler au besoin une heure après.

Prop. thér. — Antithermique, Analgésique, Bactéricide.

Indications. — Grippe, Influenza, Rhume, Coryza, Maux de tête, Courbature, Névralgies.

Détail : 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (17^e)

ANTIPLHLOGISTINE

Glycéroplasma minéral aseptique
à chaleur durable et constante.

Composition. — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaulthéria, eucalyptus).

Propriétés. — Chaleur constante pendant plus de 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'il attire et engloutit.

Indications. — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe : Pneumonies, Pleuresies, Bronchites, Rhumatismes, Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites, Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie, etc.

Particularités. — Pâte molle, se délivre en boîtes fer blanc embouties de 150 gr., 300 gr., 1 kil., 2 kil. Se chauffe au bain-marie, s'étend directement sur la peau; on recouvre d'ouate. Action manifeste et soins rendus faciles.

B. TILLIER, Pharmacien

116, rue de la Convention — PARIS

R. C. Seine 16.936

ANTIPHYMIQUE VADAM

A base de Cholestérine iodo-balsamique galacolée et Cinnamate de benzyle.

Indications.

Traitement de toutes les affections inflammatoires pulmonaires (bacillaires ou parabacillaires).

Résultats immédiats chez les malades curables (Antisepsie, cicatrisation et histogénèse).

Dose :

Une ampoule tous les deux jours

-(Voir « *Thalassotonine Vadam* »)

Demander renseignements et Littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut

22, Rue de la Sorbonne — PARIS (V)

L'ANTIRHOÏDE

Huile indienne : Balanum, Lentiscum,
Myagrium, Laurum, Spica. etc.

Indications. — Traitement des hémorroïdes.

Mode d'emploi. — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibé largement avec l'huile ANTIRHOÏDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs, d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe

Pour les hémorroïdes internes, employer les SUPPOSI-CONES ANTIRHOÏDES qui, plongés dans l'huile antirhoïde doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Laboratoires BELIERES

19, Rue Drouot — PARIS

ANTIURIQUE DE CONTREXÉVILLE

(Complexe citro-sodique de Pipérazine)

Forme. — Granulé effervescent.

L'Antiurique de Contrexéville est un solvant des sables et calculs urinaux et biliaires. Il est doué de propriétés diurétiques notables et son efficacité est remarquable comme antiseptique des voies urinaires. Hypotenseur efficace, il diminue la tendance à la floculation du sérum sanguin.

Indic. thérap. — Goutte, Gravelle, Lithiase rénale, Rhumatisme, Obésité, Dermatoses.

Produits Biologiques et Physiologiques

286, Faubourg Bannier-Les Aydes, 286

ORLÉANS

ANTONAL

Traitement rationnel et polyvalent de l'hypertension vasculaire. — Spécifique des scléroses artérielles et viscérales. A base de principes dynamogénétiques du gui. — Diméthylquinoxanthine. — Extrait total hépatique.

Propriétés thérap. — Médicament d'une grande efficacité par son action à la fois diurétique, antitoxique et hypotensive, d'où son indication dans l'hypertension vasculaire et les maladies qu'elle accompagne : artériosclérose, cardiopathies artérielles, angine de poitrine, ménopause, congestions, hémorragipares, néphrites, etc.

Se présente sous forme de cachets et se prend à la dose de 1 à 3 par jour.

Prix : 8 fr. la boîte (Impôt en sus)

Littérature et échantillons :

Laboratoires CARESMEL

5 et 7, Rue Henry-Gréville — ANGERS

ANUSOL

Iodo résorcino sulfite de bismuth.

Forme :

Suppositoires; pommade.

Indications :

Hémorroïdes.

Agit également bien contre la constipation, prostatites, etc.

Dose :

Un suppositoire matin et soir.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

APHLOÏNE TROUETTE-PERRET

Elixir contenant en totalité les principes extractifs des plantes tropicales : Aphloia, Piscidia, Hamamelis, Hydrastis, Viburnum.

INDICATIONS.

Spécifique des troubles de la Ménopause, de la Puberté et du Système veineux (varices et hémorroïdes).

POSOLOGIE.

Une à deux cuillerées à café par jour aux principaux repas.

**LABORATOIRES
TROUETTE-PERRET**

15, rue des Immeubles-Industriels
PARIS-XI^e

APIOLINE CHAPOTEAUT

Composition. — Principes actifs de l'apium petrosilenum.

Indications. — Troubles de la menstruation, Douleurs cataméniales, Ménorragies, Aménorrhée.

Action. — L'APIOLINE régularise les règles et calme les douleurs qu'elles provoquent. Son action est supérieure à celle des autres emménagogues. Complètement inoffensive, reste sans action sur la grossesse.

Mode d'emploi. — 4 à 5 jours avant l'apparition des règles et pendant toute leur durée, prendre 2 à 3 capsules par jour au moment des repas.

LABORATOIRES DU D^r CHAPELLE,
8, Rue Vivienne — PARIS

APLEXIL

Vaccin préventif des complications pulmonaires de la Grippe et des fièvres éruptives

Utilisé :

- 1° Comme préventif en foyer épidémique chez toute personne saine.
- 2° Comme préventivo-curatif une fois la maladie déclarée.

Injecter, dans le premier cas, le contenu d'une ampoule dans les muscles de la hanche, et quatre jours plus tard, le contenu de la seconde ampoule dans ceux de la hanche opposée ; dans le second cas, injecter le contenu d'une ampoule à la première séance, et, le surlendemain, celui de la seconde ampoule.

(voir Vaccins Atoxiques Stabilisés)

Littérature franco sur demande

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (3^e)

R. C. Paris 3386

AQUINTOL COQUELUCHE

Chloro. — Bromo. — Fluor.

Modifie, dès les premiers jours, la toux.
Le malade n'éprouve plus de suffocation ni
de vomissements, il retrouve l'appétit et le
sommeil.

Dose :

Au-dessous de 6 mois :	2 à 4	cuillerées	à café
Moins de 5 ans :	3 à 8	—	à café
Moins de 5 et 15 ans :	4 à 8	—	à dessert
Adultes :	5 à 8	—	à soupe

Deux flacons sont en général nécessaires
pour éviter la rechute.

Pharmacie du D^r MIALHE

8, rue Favart — PARIS

Si le " DICTIONNAIRE DE SPÉ-
CIALITÉS PHARMACEUTIQUES "
vous rend des services, engagez les
Pharmaciens Spécialistes à y souscrire,
ce qui nous permettra de le perfec-
tionner et d'en augmenter le tirage.

ARHEMA GALLIER

Antihémorragique

Solution isotonique, stérile, non toxique, non anaphylactisante de *Pectine*, associée à son ferment minéral (Calcium).

La *Pectine*, agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, C. R., Ac. Médéc. 4 nov. 1924).

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 4 ampoules de 20 cc....	15 Frs
Boîte de 2 ampoules de 20 cc....	8 »
Ovules, la boîte de 6.....	10 »

Indications et Posologie. — *A titre thérapeutique* : Toutes Hémorragies, Epistaxis, Hémoptyxies, Hémorragies post-opératoires.

Faire boire, dans un peu d'eau sucrée, 1 à 4 ampoules, en 2 heures, selon la gravité de l'hémorragie.

A titre préventif : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie obstétrique, deux ampoules la veille, et deux ampoules, une heure avant l'opération, à vingt minutes d'intervalle.

Ne présente aucune contre-indication.

LABORATOIRE R. GALLIER,

Pharm., Ex-interne des Hôpitaux de Paris,

38, bd du Montparnasse — PARIS (xv^e)

Téléph. Ségur 08-42

ARHÉOL

Formule. — $C^{15} H^{26} O$.

Composition. — Principe actif de l'essence de santal.

Forme. — Fl. de 40 capsules contenant chacune 0 gr. 20 environ de produit.

Prop. thér. — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal, supérieure elle-même aux essences de Cèdre.

Indications. — Blennorrhagie et blennorrhée, cystites, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

Dose. — 10, 12 capsules par jour, en 3 fois : le matin, à midi et le soir, avant les repas.

Prix : 12 Fr. (sans impôt)

Laboratoires P. ASTIER

41 à 47, rue du Docteur-Blanche, PARIS (16^e)

ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Composé formaldéhydo-gaiacolo-tannique chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

Propr. Thér. — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

Indications. — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Est un excellent agent curatif du coryza, des rhinites et rhino-pharyngites.

Mode d'emploi. — On l'utilise soit en insufflations, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les coryzas, rhinites, maux de gorge.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

3, rue d'Edimbourg, PARIS (8^e)

124, Avenue Rogier, 124, BRUXELLES

ARQUÉRITOL LESURE

Huile injectable d'amalgame d'argent
à 40 % de mercure

Mode d'emploi. — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigr. Hg.

Indications. — Toutes manifestations syphilitiques.

Avantages. — Injection non douloureuse; absence de nodosités; tolérance parfaite grâce à l'action propre de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Flacon de 5 gr. : 16 fr. 50

Pharmacie VIGIER-LESURE

70, Rue du Bac — PARIS

ARRHÉNUCLÈNE BERGEVIN

Compos. — Complexe de Ferro-manganèse codiastasique et méthylarsinate de soude.

Propriétés. — Hématopoïétiques, phagocyto-gène et névrossthénique.

Indications. — Toutes les anémies et les asthénies et plus particulièrement la chloro-anémie des adolescents.

Mode d'emploi. — De 7 à 11 ans, 1 pilule midi et soir ; 12 à 18 ans, 1 pilule matin midi et soir ; à partir de 18 ans, 2 pilules midi et soir, avant les repas.

Après 8 ou 15 jours de traitement, interrompre pendant une semaine, pour reprendre ensuite jusqu'à guérison.

G. BERGEVIN

Docteur en pharmacie

CHATEAUDUN (E.-et-L.)

ARSÉNIODE BURIAT

Forme Gouttes. — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 %.

Indications. — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, chlorose symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatico-arthritique.

Mode d'emploi. — Doses moyennes. Enfants : 2 gouttes par 24 heures et par année d'âge.

Adultes : 15 à 30 gouttes, 2 fois par jour.

Laboratoire BURIAT

30, rue Pergolèse — PARIS (16°).

ARSYCODILE

Cacodylate de Soude pur

Formes. — Ampoules dosées à 0.05, 0.10, 0.20 et 0.50 pour applications progressives (*bien spécifier*).

Indic. thér. — Accélérateur de la nutrition générale, ramenant l'appétit, etc. Tout spécialement désigné pour l'usage sous-cutané.

Doses et mode d'emploi. — Une injection par jour pendant huit jours, repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

Docteur M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16°)

ARSYLÈNE " ROCHE "

Acide propénylarsinique

L'Arsylène " Roche " est un arsenic organique nouveau qui, sur les préparations inorganiques, arséniales, arsénites, liqueur de Fowler, etc., possède l'avantage d'une *toxicité pratiquement nulle* laquelle permet son emploi à doses élevées, sans craindre la brusque apparition de phénomènes d'arsénisme, tels que sécheresse de la gorge et de la bouche, troubles digestifs et nerveux, symptômes cutanés, bouffées congestives, essoufflement, hyperthermie, etc. ; il est en outre, *très bien toléré* par les voies digestives, ne provoque pas de dégagement d'oxyde de cacodyle (odeur alliacée de l'halicne) et il est *utilisé presque complètement* dans l'économie ; peut être substitué, en toute sécurité par le médecin traitant, aux cacodylates généralement employés, dans toutes leurs indications et à toutes doses.

Voir surtout Des Ritz, Prof. Roch, Dr. Garrigues, Dr. Gally, Dr. Schneider, thèses de Lyon, etc.)

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Affections nerveuses et mentales, *sclérose en plaques, contractures, chorée, mélancolie, anxiété, maladies de la peau, psoriasis, affections parasitaires, tuberculose au début, anémie grave, période de dépression du traitement Bi ou Hg, toutes les Anémies et toutes les Asthénies.*

POSOLOGIE et MODE D'EMPLOI

Thérapeutique intensive. — 1 à 4 ampoules et plus.

Doses massives. — Ampoules de 2 cc. à 0,20 tous les 2 ou 3 jours en injections intramusculaires ou endoveineuses.

Thérapeutique toni-stimulante. — 1 ampoule par jour et plus.

Doses d'entretien. — Ampoules de 1 cc. à 0,05 par voie hypodermique ou intra-musculaire. Enfants 1/4 ou 1/2 dose.

Thérapeutique progressive. — Méthode de Fowler. Granules à 0,01, : 1 granule avant chaque principal repas. Augmenter tous les jours d'un granule jusqu'à 8 par jour, puis, progressivement diminuer jusqu'à deux granules par jour.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS (3^e)

ARTÉRION VINCARDI

Principes actifs. — Origine végétale. Silice. Iode. Sulfures d'allyle, Citrates alcalins en combinaison organique directement assimilables.

Forme. — Capsules enrobées de gluten, ne se dissolvant qu'au contact des sucs intestinaux. **..Innocuité absolue, tolérance parfaite.** Pas de contre indication.

Indications. — Hypotenseur, sclérolysant, diminue la viscosité du sang. — **Action élective** au niveau des capillaires qu'il décrasse et assouplit. — Artériosclérose. — Hypertension, scléronéphrose.

Doses. — 5 à 6 capsules par jour aux principaux repas.

Laboratoire de l'Artériorion VINCARDI

VIGUIER, P. pharmacien

42, av. Borriglione et 36, av. Saint-Lambert
NICE (Alpes-Maritimes)

Chèques postaux, Marseille 105-38

ARTHRITOSE

Médicament-type de l'Arthritisme

Composition et Propriétés. — Fluorure de sodium (active la nutrition calcique), Benzoate de lithine (active les sécrétions biliaires et urinaires), Urotropine (aseptise les conduits excréteurs), Lysurie B. carb. sodique benzoaté (alcalinise l'appareil urinaire des arthritiques).

Indications. — Manifestations de l'arthritisme et des états acidosiques.

Forme. — Granulés soluble dans l'eau, sans effervescence, sans dégagement d'acide carbonique, sans formation de tartrates qui occasionnent toujours une augmentation de l'acidité organique contraire à la cure de désacidification.

Mode d'Emploi et Doses. — Une cuillerée à café, dans un peu d'eau ordinaire, d'Evian, de Vichy, de Vittel, etc., ou dans une infusion. Matin à jeun et soir en se couchant. — En cas de crise : 3 ou 4 cuillerées à café par jour. Une cuillerée à café dans un litre d'eau de table comme boisson ordinaire des arthritiques.

Remise sur commandes médicales

Prix réglementé : 8 fr. le flacon (sans impôt)

Laboratoires "LA BIOMARINE"

DIEPPE (Seine-Inférieure)

ASCEINE

Acet salicyl-para-acet- phénétidine-caféine.

Analgésique sédatif, antirhumatismal.
Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur.

Indications. — Toutes les algies: Névralgies, sciatique, migraine, etc., grippe, arthrites aiguës, et toutes manifestations rhumatismales.

Doses. — Adultes : 2 à 4 comprimés par jour; enfants : 1/2 à 2 comprimés.

Prix. — Le tube de 20 comprimés : 3 fr.

O. ROLLAND

1, place Morand. — LYON

ASCOLÉINE RIVIER

Il a été démontré par l'analyse chimique qu'une cuillerée à café ou cinq comprimés (doses moyennes) d'ASCOLÉINE RIVIER équivalent à un demi-litre de la meilleure huile de foie de morue.

Il a été démontré également que "L'ASCOLÉINE RIVIER" contient les Vitamines A et B.

"L'ASCOLÉINE RIVIER" se présente sous 4 formes : en huile (sans goût désagréable) pour les adultes; en comprimés (véritables bonbons) pour les enfants; en granulés phosphatés délicieux, et en ampoules injectables (action très rapide). Elle remplace l'huile de foie de morue dans tous les cas.

Toutes Pharmacies ou à défaut chez

Henri RIVIER, Pharmacien

26-28, rue Saint-Claude — PARIS

ASTHMYLOSE

Forme. — Sirop.

Composition. — Chaque cuillerée à bouche renferme ;

— Sirop thébaïque . . . 10 gr.
 1 K pur et desséché. . . 0 gr. 50
 Sirop aromatique . . Q. S.

Indications. — *Asthme. Emphysème. Bronchite chronique.*

Avantages. — Goût agréable ; dosage très rigoureux. Action rapide et durable. Pas d'intolérance ; *jamaïs d'iodisme.*

Posologie. — Adultes 1 cuill. à soupe ou 2 le soir au coucher *loin du repas.*

Dépôt Général et Echantillons :

France. — Laboratoires TAETZ

2, Rue Ludigulères — PARIS (IV^e)

Belgique. — M. F. RAMLOT

72, Rue de l'Escaut — BRUXELLES

ATOPHAN CRUET

Acide phénylquinolique², — carbonique⁴.
 Produit chimique pur. N'est pas un mélange de médicaments.

Formes. - Cachets ou comprimés dosés à 0,50.

Prop. Thér. — Goutte et rhumatismes articulaires. Manifestations arthritiques.

Dose. — 1 à 4 gr. par 24 heures dans les cas aigus. 1 gr. par 24 heures pendant 20 jours, dans les cas chroniques.

Mode d'emploi. — Pendant les repas, si le malade se nourrit, et à intervalles réguliers. Accompagner l'emploi du médicament de boissons abondantes et alcalines.

Robert CRUET, Docteur en Médecine

Pharmacien de 1^{re} Classe

8, rue du Pas-de-la-Mule — PARIS (III^e)

ATOQUINOL CIBA

Phénylcinchoninate d'allyle. Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

Indications. — Diathèse urique en général, goutte, rhumatisme, dermatoses d'origine arthritique et toutes manifestations uricémiques.

Doses. — *Etats aigus* : 4 à 8 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

Etats chroniques : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé, huit ou dix jours par mois.

La boîte de 20 cachets. 10 francs

Le flacon de granulé, 12 francs

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

AVANAZOL COUTURIEUX

Traitement du coryza

Description. — Comprimés composés de Levurine Extractive, extrait de gul et acore, pour le traitement du coryza : à employer dès l'apparition des premiers symptômes.

En flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Les comprimés d'AVANAZOL provoquent une réaction de la muqueuse nasale et une phagocytose énergique (Levurine Extractive), avec disparition de la congestion (gul) et de l'irritation (acore).

Indications. — L'AVANAZOL constitue le traitement le plus efficace du coryza, à condition d'absorber, dès les premiers symptômes, 18 comprimés par jour, en trois fois. Continuer à la dose de 12 à 20 comprimés par jour. On obtient ainsi l'avortement du coryza.

Laboratoire COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

AZUFROL

Soufre colloïdal

Description. — 1° Capsules kératinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules; 2° Pommade à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

Action Thérapeutique. — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du soufre par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie.

Indications. — 1° Capsules : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif, y adjoindre les injections de sulfuration (voir plus loin).

2° Pommade : Toutes affections cutanées justifiables du soufre.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche. — PARIS

Le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" est devenu le pendant du "FORMULAIRE MAGISTRAL" sur le bureau du médecin.

BABUTYROSE LACTELLA

Composition. — Babeurre homogénéisé, stérilisé, concentré.

Forme. — Boîtes métalliques de 450 g.

Indications. — Spécifique des affections gastro-intestinales, aiguës et chroniques des nourrissons. Spécifique des diarrhées et du choléra infantile.

Adresses. — Babutyrose, chez tous les pharmaciens et au siège social :

rue du Flocon, Tourcoing

Tél. 12-55

Agences : 89, Rue Turbigo, — PARIS

Tél. Archives 50-03

BACKERINE

ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie

Modifiant l'organisme par développement des agents de fermentation

Forme. — Ampoules, cachets, dragées.

Indications. — Traitement de toutes les hyperplasies (tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.

Mode d'emploi. — Injecter une ampoule SOUS LA PEAU, tous les quatre à six jours. On prescrira en même temps l'usage des dragées ou des cachets de ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'efficacité des injections. Prendre avant les repas, quatre cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans les cas d'urgence.

Laboratoire des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien.

4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

BAIN CARRÉ

Composition. — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels, bain marin complet.

Indications. — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatisme, arthritisme.

Enfants : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme

Gynécologie : Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 boîte par bain.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.

Bains toniques et stimulants : 28° à 30°, 15 minutes.

Bains sédatifs : 34° à 38°, 25 à 40 minutes.

Injectons vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

LANCOSME

71, Avenue Victor-Emmanuel III — PARIS (8°)

BAIN DE PENNÈS

Composition. — Association de : bromures chlorures, fluorures, phosphates, sulfates bicarbonates, borates, principe actif du delphinium - huiles essentielles volatiles.

Propriétés. — Dans le bain, vaso-dilatation périphérique intense. À la sortie du bain, sudation et émission importante d'urines - sensation de bien être et excitation de l'appétit.

Indications. — Congestions viscérales - fatigue - convalescence - chlorose - anémies - préhacillose - scrofule.

Contre-indications. - Infections algues - dermatoses - lésions du cerveau, du cœur, et du poulmon.

Mode d'emploi — Une fois entré dans le bain, faire dissoudre une dose de bain de Pennès. Ne pas dépasser 45 minutes de durée. Si l'effet thérapeutique est insuffisant, faire dissoudre une ou plusieurs autres doses. Au sortir du bain, se tenir au lit pendant 1 heure ou 2.

Laboratoires PENNÈS & TOULET

3, Rue de Latran — PARIS

BALSAMOL LESCÈNE

Composition. — Drosera Seillitine-Chloro-einnamates, Benzoate de Benzyle.

Forme. — Plus fluide et moins sucré qu'un sirop.

Caractéristiques. — CHEZ LES ADULTES, plus calmant, plus antispasmodique que le BROMOFORME, les composés forméniques et les narcotiques, CHEZ LES ENFANTS, il peut être administré à partir de 5 à 6 mois. Antiseptique des voies respiratoires.

Indications. — COQUELUCHE, toux spasmodiques, laryngées, toux émétisante des tuberculeux, asthme.

Doses. — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires L. LESCÈNE
à LIVAROT (Calvados)

BAUME ARÔMA

Spécifique des rhumatismes et des douleurs en général.

Composition et forme. — Baume à base d'essence de plantes aromatiques et des constituants du liniment de Rosen.

Essences aromatiques	0
Beurre de muscades..	2
Salicylate d'amyle....	4
Acide salicylique . . .	3
Vaseline	60

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et résolutif puissant.

Indications thérapeutiques — Rhumatisme aigu et chronique, goutte, lumbago, torticolis, efforts et toutes douleurs musculaires, courbatures, névrites, sciatiques crurale et brachiale, pleurésie sèche, points de côté, foulures, varices.

Mode d'emploi — Frictionner doucement et longtemps avec le baume pour en faciliter la pénétration. Étendre ensuite sur toute la région douloureuse une nouvelle couche de Baume et recouvrir avec une feuille de coton ordinaire que l'on maintiendra par une bande ou une ceinture, suivant qu'il s'agit d'un membre, ou du thorax et des reins.

Faire cette friction suivie du pansement une à deux fois par jour.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER
1, Place Victor-Hugo — PARIS (16°)

BAUME du D^r BAISSADE

Composition. — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

Action. — Anti-prurigineux et analgésique, supprime immédiatement les Démangeaisons et la Douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

Indications. — Eczémas suintants, secs, aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furunculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En onction douce (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

**LABORATOIRE DU BAUME
DU DOCTEUR BAISSADE,
SAINT-MENET-MARSEILLE**

BAUME BENGUÉ

Analgésique

Composition.

Menthol, salicylate de méthyle, lanoline.

Indications.

Rhumatisme, goutte, névralgies, points de côté, douleurs abdominales, douleurs de la gorge.

Mode d'emploi.

En onctions deux fois par jour en recouvrant d'une serviette ou flanelle.

Docteur BENGUÉ

pharmacien

16, rue Ballu. — PARIS (IX^e)

BAUME DELACOUR

Gerçures et Crevasses des Seins

Gerçures en général

Baume benzo-tannique

Mode d'emploi : Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume avec le pinceau qui accompagne le flacon et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec le pinceau et deux bouts de sein :

5 fr. 60 (impôt compris).

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie

19, avenue de Villiers — PARIS

BAUME RHODIA

(Salicylate de Glycol solubilisé U. R.)

Succédané propre et inodore des baumes et onguents à base de Salicylate de Méthyle.

TRAITEMENT EXTERNE DES DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES

Le *Baume Rhodia* ne provoque pas les irritations constatées avec certains éthers salicylés de la glycérine.

LABORATOIRE DES PRODUITS

« **USINES DU RHONE** »

21, Rue Jean Goujon — PARIS (VIII^e)

BAUME SUELTA

Composition.

Extrait de Marrons d'Inde stabilisé. Euprotol (Di-Iodosulforésorcinate de Bismuth). Stovaïne. Adrénaline 0,001 %. Baume du Pérou.

Indications et Propriétés.

Traitement local des Hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal. Sédation immédiate de la douleur, décongestion et vaso-constriction, antiseptie, suppression des hémorragies.

Mode d'emploi.

Onction le matin et après chaque garde-robe. Pansement pour la nuit. Une canule métallique s'adapte au tube pour permettre l'application de la Pommade sur les Hémorroïdes internes.

Echantillons :

LABORATOIRE A. FOURIS

13, rue Lacharrière. — Paris-XI^e

BEATOL

Prop. Thér. — Sédatif nerveux, Hypnotique.

Indications. — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, Intoxications, Maladies nerveuses ou mentales.

1^o Forme : Ampoules.

Composition :

Diéthylmalonylurée	0 gr. 25
Bromhydrate de scopolamine	1/4 de mgr.
Soluté de valériane.....	2 cm ³

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule injecté sous la peau.

2^o Forme : Liquide.

Composition :

Diéthylmalonylurée.....	0 gr. 18
Valériane stabilisée Q. P.....	5 cm ³
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 015

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuill. à café dans de l'eau sucrée, après le repas du soir, une heure avant le coucher.

3^o Forme : Comprimés.

Composition :

Diéthylmalonylurée.....	0 gr. 18
Extrait de valériane.....	0 gr. 10
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 02

Mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés pris avec de l'eau ou une infusion chaude dans l'intervalle des repas.

Laboratoires Réunis

11, Rue Torricelli — PARIS (17^e)

BEEF LAVOIX

ou Vin de Lavoix

Composition. — A base de vieux vin de Banyuls, le Beef Lavoix contient les principes nutritifs de la viande, les principes actifs du quinquina et des phosphates.

Indications. — Convalescence.
Tuberculose.
Épuisement.
Inappétence.
Anémie.
Grossesse.
Allaitement.

Posologie.

Un verre à Madère avant ou après chaque repas.

Maison du Docteur PILLET
5, avenue Victoria
PARIS

BELLAFOLINE "SANDOZ"

Tous les alcaloïdes principes actifs à l'état pur
exactement dosés

Médicament injectable

Puissance égale à celle de l'atropine
à dose moitié moindre

Traitement à effets constants
du Spasme et des Sympathoses
Modérateur des Sécrétions

Bellafoline :

(Comprimés) : 1 à 2, trois fois par jour.

(Gouttes) : 10 à 20, trois fois par jour.

(Ampoules) : 1/2 à 2 par jour (1^{re} injections).

SIROP DE BELLAFOLINE

spécialisé pour la médecine infantile

PRODUITS SANDOZ

3 et 5, Rue de Metz — PARIS (X^e)

Dépôt général et vente :

Usine des Pharmaciens de France

195, Rue de Turenne — PARIS (X^e)

BENZO-IODHYDRINE

(Capsules de)

La Benzo-iodhydrine n'est pas seulement la première réalisation de la cure iodée, sans iodisme (Thèse du D^r Chenal, F. M. Paris, novembre 1896), elle est aussi un corps iodé qui présente une activité thérapeutique très puissante, très étendue, et rare parmi les corps iodés.

C'est un médicament iodé hypotenseur diurétique, éliminateur puissant d'acide urique. Ces diverses qualités en font le médicament par excellence, des cardio et des artério-scléreux, des gouteux, des emphysémateux. — Chaque capsule de gluten correspond à 0 gr. 30 de KI.

Doses. — 3 à 10 capsules par jour, aux heures des repas.

Brochures et échantillons :

G. BRUEL

36, Rue de Paris — COLOMBES (Seine)

BENZOLACTOL

Granulé soluble, d'absorption très agréable

Propriétés thérap. — Antiseptique spécifique de toutes les affections du tube digestif. Par son action oxydante (MgO₂), transfusante et destructive, le *Benzolactol* possède le maximum d'action microbicide gastro-intestinale.

Composition. — Combinaison de Peroxyde de Magnésium (Hogean), de Benzoate de Naphtyl, de Salicylate de Phényl-Lactate de Manganèse de sucre granulé.

Indications. — Toutes les infections aiguës ou subaiguës du tube digestif. Fermentations et infections gastro-intestinales. Entérites, Entéro-colites muco-membraneuses, Embarras gastriques, Langue chargée, Intoxication gastro-alimentaire. Grippe à forme gastro-intestinale, Ictère, Gastro-entérite des nourrissons, Fièvre typhoïde, Affections cutanées, Furonculoses, Paratyphoïdes, Infections alimentaires, etc.

Cas Chirurgicaux et Affections Contagieuses

Dose et Mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café après les repas. Laisser fondre dans la bouche.

Pour les enfants (jusqu'à 2 ans), par demi-cuillerées à café 3 à 4 par jour.

Echantillons et Littérature

Laboratoires FEVRIER & DECOISY

26, rue de Sévigné — PARIS (8^e)

BENZOPHOSPHINE CHRISTIAENS

(Antiseptique des Voies urinaires et de l'Intestin)

Solubilisant de l'Oxalate de Chaux

Indications. — Coliques néphrétiques. Lithiase rénale, Diathèse urique et Oxalurique, Fermentations du tube digestif.

Composition. — Phosphines, benzoate, magnésie.

Doses. — Moyenne de 3 cuillerées à café par jour, empêche la précipitation de l'Oxalate de Chaux dans les urines.

Dose de 6 cuillerées à café, comme dissolvant des Calculs.

N'irrite pas le rein comme le fait l'Urotropine et a au contraire une action sédative.

2, rue du Champ-de-Mars. — REIMS

BENZYLOL

Gouttes à base de Benzoate de Benzyle

Antispasmodique des muscles lisses

Doses et mode d'emploi :

Adultes : 40 gouttes toutes les 3 ou 4 heures.

Enfants : 2 à 4 gouttes par année, toutes les 3 ou 4 heures.

Propriété thérapeutique. — Action antispasmodique sur tous les muscles lisses de l'organisme : muscles bronchiques, intestin, estomac, pyllore, voies biliaires, vessie, uretère, utérus et annexes.

Indications. — Asthme vrai, Coqueluche, Hoquet, Diarrhées douloureuses dues au péristaltisme exagéré de l'intestin, Constipation spasmodique, Colique hépatique ou néphrétique, Incontinence d'urine spasmodique, Dysménorrhée, Coliques utérines, Hypertension, etc.

E. HAUTDIDIER

37, rue Galilée — PARIS

BETUL-ÔL MIDY

(Méthyl oléo-salicylate comp.)

Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Compos. — Menthol et chloral en solution dans de l'essence de Bétula-Lenta obtenue par fermentation et distillation (salicylate de méthyle naturel).

Mode d'emploi. — Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du *Betul-Ôl* se fait si rapidement par la peau, que dix minutes après on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Prop. Thér. — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

Indications. — Lumbago, sciatiques, douleurs des articulations, névralgies.

Détail : 140, Faub. Saint-Honoré. — PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17^e)

BILEYL FOURNIER

Sels biliaires

(extraits de la bile de bœuf)

Forme. — Globules glutinisés (digestion intestinale).

Dose. — 4 à 8 globules par jour, à prendre vers la fin du repas, par 2 ou 3.

Indications. — 1^o Les causes d'arrêt d'excrétion : lithiase, compressions, ictères subaigus et chroniques par rétention;

2^o Les cas d'insuffisance biliaire : cholémie familiale, entérocolite muco-membraneuse.

Le flacon de 60 globules : 7 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

BILIFLUINE

du Docteur L. BIGNON, de Vichy
Traitement de la Lithiase Billaire
et des ictères

Composition. — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

Indications. — Lithiase biliaire. Ictère catarrhal. Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhose sous toutes leurs formes.

Posologie. — 4 pilules par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir (pilules et sirop).

Laboratoires " STÉNÉ "

Anciens Etablissements BEAUGONIN

4, Place des Vosges — PARIS

BILIRHÉINE

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

Indication :

Insuffisance hépatique.

Posologie :

Deux pilules glutinisées à la fin de chaque principal repas.

Laboratoires MONDOLAN

11, Place des Vosges — PARIS (IV^e)

BIOCALCOSE CHEVRETIN

Reminéralisant Intégral

Granulé brun, soluble dans l'eau. Outre une grande quantité de chaux, contient encore du phosphore, de la potasse, de la soude, de la magnésie, du fluor, de la silice, etc., dans les proportions de l'organisme sain.

Prop. thér. — Recalcification de l'organisme.

Indications. — Tuberculose, croissance, rachitisme, neurasthénie, dentition, diabète, grossesse.

Dose et Mode d'emploi. — 1 à 2 cuill. à café jusqu'à 8 ans, 3 à 4 au-dessus de cet âge et chez les adultes. A prendre dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE

52, Rue La Bruyère — PARIS

Télégramme : Cheorematte, Paris

BIODERMYL MONAL

Formes :

Ampoules, et globules glutinisées.

Composition :

Chaque *ampoule* de 2 cm³ contient : une solution indolore et bien tolérée de Hg I² à 1 %, soit 0 gr. 02 par ampoule.

Chaque *globule* contient : Hg I² pur 0.0025 ; Ki, 0.025.

Doses. — Série de 12 injections.

4 globules par jour, aux repas.

Traitement discret ; pas d'indications sur l'étiquette et le prospectus du flacon de globules.

Laboratoires MONAL & Cie

20, rue de Vienne — PARIS

BIODYNAMINE

Indications générales. — Débilité, Neurasthénie, Phosphaturie, Convalescence, Surmenage intellectuel, et tous états asthéniques et atoniques.

1^o Ampoules :

Sulfate de strychnine....	un milligr.
Cacodylate de soude.....	0 gr. 05
Nucléinate de soude.....	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude..	0 gr. 05
Sérum isotonique camphré..	un cc. 3
par ampoule	

(1 à 2 ampoules par 24 heures.)

2^a Gouttes concentrées (facilitant l'administration progressive): de X à XL gouttes, bien diluées, avant chaque repas, suivant le cas et d'après le tableau :

	20	40	60	80	100
	Gouttes	Gouttes	Gouttes	Gouttes	Gouttes
	cont.	cont.	cont.	cont.	cont.
Sulfate de Strychnine..	1 mill.	2 mill.	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate de Soude.	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Polyglycérophosphates					
donnant en Acide phos-					
phorique	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

3^o Elixir : Préparation d'un goût très agréable et contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Acide phosphorique officinal. ..	0 gr. 12
Méthylarsinate disodique... ..	0 gr. 012
Sulfate de strychnine.....	un 1/2 milligr.
2 à 3 cuillerées à soupe par jour.	

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, pharmacien de 1^{re} Classe
de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

BIOGASTRINE

Pansement gastrique complet c. a. d. associé à la médication sédatrice et à la médication antispasmodique

- 2 Formes :** 1° Granulé non aromatisé, de couleur blanche, ne contenant pas de sucre ;
2° Granulé aromatisé, de couleur jaune pâle, contenant 15 %, seulement de sucre.

Doses : Chaque jour régulièrement à jeun, loin des repas, une ou deux cuillerées à café.

1° le matin ; 2° vers 17 heures ; 3° le soir au coucher, au moins 3 ou 4 heures après le repas.

Avantages : Grande efficacité. Pas d'intolérance, ni de contre indication, ne constipe jamais. Pas d'accoutumance, même en cas de traitement prolongé. Prix très avantageux permettant un traitement peu onéreux.

Echantillons et littérature

BERTHIOT et C^{ie}

PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE

1, Boulevard Henri IV — PARIS

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

BIOGENOL

DEMASLES

PUISSANT ACCELERATEUR DE LA NUTRITION GÉNÉRALE
(Médication arsenico-nucléo-phosphatée)

GRANULÉ. — Contenant par cuillerée à café :

Glycéro-arséniate de chaux. 0,01

— phosphate — 0,50

1 cuillerée à café avant les 2 principaux repas.

LIQUIDE. — Même composition que le granulé, mais contient de la cola en plus.

1 verre à liqueur avant les deux repas.

GOUTTES ARSENO-BIOGENOL

par XX gouttes :

Sulf. de strychnine... 1 milligr.

Glycéro-arséniate..... 5 —

Extrait de cola..... 2 centigr.

— coca..... 2 —

— quinquina.. 2 —

GOUTTES PHOSPHO-BIOGENOL

par XX gouttes :

Sulf. de strychnine... 1 milligr.

Acide phosphorique... 3 gouttes

Extrait de cola..... 2 centigr.

— coca..... 2 —

— quinquina.. 2 —

Doses moyennes : 10 à 20 gouttes aux 2 repas.

Doses progressivement croissantes (progression quotidienne de cinq gouttes) jusqu'à 90 gouttes aux deux repas.

AMPOULES de 1 cm³ (boîte de 12), injections hypodermiques indolores, une ampoule contient :

Glycéro-arséniate .. 0,01 centigr.

Sulf. de strychnine. 0,001 milligr.

Laboratoire DEMASLES, Vienne (Isère)

BIOLACTYL FOURNIER

Symbiose de deux ferments lactiques
orientaux sélectionnés

Usage médical :

1^o Culture en bouillon :

En boîtes de 10 fl., pour adultes.

La boîte : 18 fr.

En boîtes de 2 fl., pour nourrissons.

La boîte : 5 fr.

En boîtes de 6 tubes (pour le caillage
du lait).

La boîte : 5 fr.

2^o Culture sèche; boîtes de 60 comprimés (4 à 6 par jour).

La boîte : 7 fr.

Indications. — Traitement des putréfactions intestinales et de l'auto-intoxication digestive.

Usage chirurgical :

1^o Culture liquide, en boîtes de 6 tubes.

La boîte : 5 fr.

2^o Culture sèche en poudre.

La boîte : 5 fr.

Indications. — Pansements des plaies infectées, escharres, vaginites, cystite tuberculeuse, affections nasales et laryngées, pyorrhée alvéolo-dentaire.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boulevard de l'Hôpital — PARIS

BIONERGYL

Complexe nucléo manganique. Le plus puissant réparateur des tissus musculaires, nerveux et osseux.

Propriétés thérapeutiques. — Apporte à ces tissus, non seulement le phosphore et l'arsenic (directement assimilables) nécessaires à leur restitution *ad integrum* mais aussi le manganèse "véhicule" de l'oxygène indispensable à tous phénomènes d'assimilation et de restauration anatomiques.

Présentation. — Granulé fondant d'une saveur particulièrement agréable.

Indications. — Anémies et chloroses. Neurasthénie. Convalescence. Surmenage. Amaigrissement. Tuberculose dans ses triples manifestations : pulmonaire, cutanée, osseuse. Rachitisme. Troubles de la croissance.

Posologie. — Chez l'adulte : 2 cuillerées à café par jour : chez l'enfant : 1 cuillerée à café, avant les repas.

Maro DELAGE, Pharmacien

2, Place du Théâtre-Français — PARIS

BIOTOSE CIBA

Extrait vitaminé polyvalent

Préparation de saveur agréable, contenant les trois grandes classes de vitamines (facteurs hydro et liposolubles).

Action physiologique. — Favorise l'assimilation des substances alimentaires et aide à la fixation du calcaire. Active le fonctionnement des glandes endocrines, aide à la digestion des substances amylacées, active le transit intestinal.

Indications. — Toutes les maladies de croissance. Etats de chétivité et d'hypovitalité. Rachitisme. Troubles digestifs. Convalescence. Grossesse, allaitement. Chez l'enfant, toutes les fois qu'il ne peut être alimenté par le lait de la mère ; chez l'adulte, toutes les fois qu'un régime d'aliments conservés ou stérilisés est imposé par les circonstances ou l'état des voies digestives.

Le flacon, 8 francs

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

BISMHYDRAL

Composition :

Définie et stable de chlorure mercurieux pur, et d'azotate basique de bismuth spécialement préparés.

Propriétés thérapeutiques. — Réalise l'association et la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (Docteur Milian).

Indications :

Syphilis à toutes les périodes et sous toutes ses formes. Cure d'entretien par voie buccale.

Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité.

Doses : Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

Littérature et Echantillons

LANCOSME

71, Avenue Victor-Emmanuel-III PARIS (8^e)

BISMUTH LÉGER ADRIAN

Privé d'Arsenic et d'Argent

Le **BISMUTH LÉGER ADRIAN** n'a rien de commun avec le Sous-nitrate de Bismuth du Codex 1884 et du Codex 1908 et ne doit pas lui être substitué.

C'est un complexe contenant une forte proportion d'Oxyde de Bismuth légèrement carbonaté.

Ce produit est très riche en métalloïde, d'une grande pureté, complètement privé de toute trace d'arsenic.

Sa densité très faible lui procure une grande légèreté.

Il est formulé couramment par MM. les Médecins dans les diverses affections du tube digestif aux lieu et place du Carbonate de Bismuth.

Le **BISMUTH LÉGER ADRIAN** est livré en flacons de :

50 grs, 100 grs, 250 grs, 500 grs, 1 kilog.

et en boîtes de 10 paquets de 5 grammes et 10 grammes

Fabrication et vente en gros :

ADRIAN & C^e

9 et 11, Rue de la Perle à PARIS (3^e)

R. C. Seine 43.957

BISMUTH DESLEAUX

Composition. — Carbonate de bismuth pur, amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial assurant son adhérence parfaite à la muqueuse.

Action. — Pansement idéal de la muqueuse gastro-intestinale, le bismuth étant avant tout dans les affections de l'estomac le médicament de la douleur (Prof. Hayem). — Met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate (nitrites). Supérieur aux produits de substitution (kaolin, tale), goût agréable, facilement absorbé par les malades les plus difficiles.

Indications. — Ulcères, Ulcérations, Gastropathies, Hyperchlorhydries, spasmes, gastro-entérites, Oxyurias, etc.

Dosologie. — (Chaque flacon porte un couvercle-mesure dont le contenu correspond à environ 10 gr. de produit). — 10 à 50 gr. par jour suivant les cas, soit le matin à jeun, soit fractionnés 1/2 heure avant chaque repas, dans eau ou tisane. — Oxyures, Adultes, 30 gr. par jour, en 2 fois, à jeun. Enfants, 5 à 10 gr. par jour, en 2 fois, à jeun, selon l'âge, dans un verre d'eau tiède. — Une cure de 8 jours suffit habituellement, une deuxième cure peut paraître utile, une troisième est rarement nécessaire.

Fournisseur des Hôpitaux de Paris et Provinces

LANCOSME

71, Av. Victor-Emmanuel-III — PARIS (8^e)

BISMUTHOIDOL

Bismuth colloïdal, à grains fins.

AMPOULES.

Titrées à 0 gr. 004 par cc.

Indolores.

Sériles.

Solution aqueuse.

INDICATIONS.

Spirillicide.

Syphilis.

Toutes maladies à protozoaires.

MODE D'EMPLOI.

Une ampoule tous les 2 ou 3 jours dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

LABORATOIRE M. ROBIN

13, rue de Poissy. — Paris

BLÉDINE JACQUEMAIRE

Composition. — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines) extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à Juillet 1920).

Propriétés. — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

Indications. — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition (*Rachitisme*). Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (*Diarrhées, Constipation, Gastro-entérites*) ; désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

Particularités. — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur ni de composition.

Doses. — Du 1^{er} au 4^{me} mois : 1/2 à 1 cuillerée à café par biberon. Du 5^{me} au 6^{me} mois : 1 1/2 à 2 cuillerées à café par biberon. À partir du 7^{me} mois : 1 cuillerée à soupe par repas ; 1 1/2 à 2 pour les adultes.

Nota. — La Blédine peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

Etablissements JACQUEMAIRE

M. MIGUET, Docteur en Pharmacie

VILLEFRANCHE (Rhône)

BLENNOSINE

Vaccin buccal contre la Blennorragie

Principe actif. — Gonocoques de différentes souches, spécialement préparés.

Indications. — Blennorragie aiguë ou chronique, ainsi que leurs complications.

Forme. — Flacon de 30 pilules.

Dose. — 1 à 3 pilules, trois fois par jour, une demi-heure avant les repas, jusqu'à ce qu'une réaction locale et générale se soit manifestée. Cette réaction, d'ailleurs légère, prouve l'efficacité spécifique de ce vaccin buccal antiblennorragique.

Propriétés thérapeutiques. — Fait diminuer, puis disparaître l'écoulement, évite toute complication, guérit les complications existantes.

Echantillons sur demande

INSTITUT de MICROBIOLOGIE-SARREBRUCK

BOLDOÏNE ÉPARVIER

Forme et Composition. — Granulé sucré, agréable à prendre. Contient, par cuillerée à café, la partie active de 4 grammes de Boldo frais, partie aromatique comprise.

Action physiologique. — Stimulant général. Action spécifique sur le foie - s'oppose aux fermentations intestinales - favorise les oxydations et l'élimination des déchets (urée).

Indications thérapeutiques. — Affections du foie en général - Lithiase biliaire - Lithiase rénale - Ictère - Dyspepsies d'origine hépatique - Anorexie - Atonie des voies digestives - Cachexies.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à café par jour après les repas, prises en nature ou dissoutes dans un peu d'eau chaude.

Echantillons sur demande adressée à :

LABORATOIRE ÉPARVIER

26, Grande Rue Saint-Clair, 26 - LYON

BOLEASE MONAL

Forme. — Globules glutinisés.

Comp. — Bile et boldo, extraits complets et inaltérables.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Action. — Cholagogue, toni-hépatique, anti-toxique et sédative.

Indications. — Troubles biliaires et hépatiques. *Affections hépatiques* : lithiase, ictères, congestions, cholémie, cirrhoses. *Affections intestinales* : entérites muco-membraneuses, constipation, auto-intoxications.

Laboratoires MONAL & C^{ie}
20, rue de Vienne — PARIS

BORICINE MEISSONNIER

Tétraborate de Sodium chimiquement pur en poudre fine. Sel défini, cristallise en rosettes résultant de la combinaison de l'acide orthoborique et du biborate de sodium infiniment supérieur à ses composants par :

1^o Sa pureté — Sel cristallisé neutre, non caustique.

Se solubilité. — 16 0/0 à froid dans
75 0/0 à l'ébullition } l'eau
parties égales dans la glycérine.

3^o Son pouvoir bactéricide. — Stérilisante à 5 0/0.

4^o Sa non-précipitation des aloïdes et son action sur les microbes.

Indications — Succédané des bora: impurs et de l'acide borique dans tous leurs emplois. Succédané de l'iodoforme. Hémorristatique puissant.

Hygiène et antiseptique générale de la peau et des muqueuses : conjonctivites, otites, ozène, stomatites, laryngites, dermatoses, maladies des voies urinaires, gynécologie, pi les brûlures.

Mode d'emploi :

En poudre : Insufflations en gynécologie, ophtalmologie, o-rhino-laryngologie.

En solution : De 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

1 cuillerée = 25 gr. Boricline

Laboratoires LOGEAS

22^{bis}, rue de Sully. — BOULOGNE-S/SEINE près PARIS.

BOROSODINE LUMIÈRE

Médication Borée — Calmant Antispasmodique

Toutes les applications de la médication bromurée. - Aucun de ses inconvénients. - Nervosité infantile. - Insomnie. - Incontinence d'urine. - Névrose. — Délire. — Neurasthénie.

**ACTION CONSTANTE, RAPIDE, SURE,
SANS DANGER.**

Adultes. — Borosodine Lumière, titrée à 5 gr. de tartrate borico-sodique chimiquement pur par cuillerée à café. Une demi à deux cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée à prendre en deux fois à la fin des principaux repas.

Enfants. — Sirop de Borosodine Lumière dosé à 1 gr. de tartrate borico-sodique par cuillerée à café.

Dose : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

PRODUITS SPÉCIAUX DES LABORATOIRES A. LUMIÈRE

M. SESTIER PHARMACIEN

9, Cours de la Liberté — LYON

BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de
Substances cutané-muqueuses

Composition et présentation. — 1^o Soluté alcoolique; 2^o Pommade; les deux à base de dérivés terpéniques et de phénols.

Prop. thérap. — Régénérateur de la cellule. Anesthésique local. Antiseptique. Non toxique.

Indications. — Plaies. Brûlures. Contusions. Boutons. Aphtes. Piqûres. Crevasses du sein. Rougeurs des nourrissons, Ulcères variqueux. Vulvites, etc., etc.,

Mode d'emploi. — Badigeonnages, frotions, pansements adhérents au coton, selon les cas. — Prix: Flacon, 6,75 (L. C.); tube, 5,60 (L. C.)

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo. — PARIS-XVI^e

TABLETTES-PILULES de BRIDES

de Brides-les-Bains (Savoie)

Composition. — Extraits végétaux et sels deshydratés des eaux de BRIDES.

Indications thérapeutiques. — Toute la gamme des affections arthritiques et en particulier l'obésité et l'artério-sclérose.

Doses et mode d'emploi. — De deux à quatre tablettes par jour, soit en deux fois matin et soir, soit en une seule fois au coucher.

Prix en France : 8 francs la boîte plus l'impôt.

Dépôt Général pour le gros :

Laboratoires EVANS

17, Rue Rochechouart — PARIS IX.

Tél. : Trudaine 45-07

BROMÉINE MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

Propriétés. — Action sédative et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

Indications. — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

Formes Pharmaceutiques. — *Amponles* dosées à 0,02 cgr. — *Pilules* : 0,01 cgr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour. — *Sirop* : 0,03 par cuil. à soupe. Dose : 1 à 3 cuill. par jour. — *Gouttes* : X gouttes = 0,01 de Broméine crist. Dose : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

BROMIASE

Description. — Capsules kératinisées contenant

Bromure de potassium.....	0 gr. 30
Bromure d'ammonium.....	0 gr. 20
Levurine extractive.....	0 gr. 10

en fl. de 50 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle des bromures, mais sans bromisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage de kératine qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie, et ne répugnant pas au malade.

Indications. — 2 à 12 capsules par jour, dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale
(Voir l'étude sur l'iodogénol)

Forme. — Gouttes.

Doses et mode d'emploi. — 20 gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. A prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

Prop. thér. — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

Indications. — Toutes celles des Bromures métalliques : affections du système nerveux, insomnie, hystérie, convulsions, épilepsie, névralgies, etc.

Laboratoires PÉPIN & LEBOUcq

à COURBEVOIE (Seine)

BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome et de peptone de viande de bœuf.

Gouttes dont 40 = 1 gr. de bromure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 20 à 50 gouttes. *Enfants* : 10 à 20 gouttes.

A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

Prop. thér. — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

Indications. — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

Laboratoires M. ROBIN
13, rue de Poissy — PARIS

BULGARINE THEPÉNIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal

Forme. — Bouillon, comprimés et poudre.

Indic. Thér. — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte), Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale), Dysenterie, Dermatoses, Furunculoses, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du choléra. *Poudre* : Rhinites, ozènes, stomatites, pansement des plaies.

Modes d'emploi. — *Adultes* : Sueur deux comprimés ou boire un verre à moitié de Bouillon, une demi-heure avant le repas. *Enfants* : Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Lab^{re} des Ferments du Docteur A. THEPÉNIER
12, Rue Clapeyron — PARIS

BYLIÉRINE

Pilules glutinisées à noyau mou.

Extrait de fiel de pore (*animal omnivore supérieur et extrait fiel de bœuf animal herbivore*).

Pancréatine. Hexaméthylène. Tetramine.

Présentation : Boîtes de 40 pilules.

Indications thérapeutiques. — Opothérapie hépatique.

Posologie. — 4 à 6 pilules par 24 heures aux repas.

Laboratoires D. DROUET & PLET

37, rue de Marly, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

CACHETS KAPYTAN

contre la Grippe

Composition. — Codéine (1 cent. par cachet),
Teinture d'aconit (3 gouttes par cachet),
Benzoate de soude, terpine, benzonaphtol.

Propriétés thér. — Sédatif de la toux, fluidifiant les sécrétions bronchiques, antiseptique du tube digestif (Grippe, Influenza).

Indications. — Grippe, Bronchites, Asthme pulmonaire, Rhumes et toutes Affections broncho-pulmonaires.

Posologie. — 4 cachets dans les 24 heures, pris entre les repas, dans un grog fortement alcoolisé.

L'étui de 12 cachets : 5 fr. 60

Echantillons et Littérature :

PHARMACIE BARDET,

FONDÉE EN 1860

76, Rue de Sèvres — PARIS (VII^e)

CACHETS de NÉVRALGOL BROSSARD

Analgésiques - Antithermiques - Fébrifuges

Indications. — Névralgies faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatique. Grippe. Rhumatismes. Migraines.

Doses et mode d'emploi. — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes, à distance des repas.

Prix : 6 fr. 50 la boîte de 12 cachets, impôt compris.

— 3 fr. 40 — 6 — —

Laboratoires SOENEN & BROSSARD

CORNAUD et BROSSARD, Successeurs

1, Rue des Cordouans — LA ROCHELLE

Echantillons sur demande des Docteurs.

CACHETS " ROCHE "

DE THIOCOL

1 Cachet " Roche " de Thioeol = 0,50 egr. Thioeol " Roche ".

1 gr. Thiocol " Roche " = 0,52 egr. gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 par jour et plus.

Prop. Thér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocyto-gène, Eupéptique et Orexique.

Indic. Thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

CACHETS " ROCHE " de Thiocol

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

CACODYLO-PHOSPHATE VITAL

DE JACQUEMAIRE

Association synergique de cacodylates et glycérophosphates très purs (voir *Phosphate vital*), dont la tolérance est toujours parfaite et l'efficacité maximum.

Formes et Doses. — (En boîtes de 10 ampoules pour injections hypodermiques) :

Cacodylo-Phosphate vital de chaux
Cacodylo-Phosphate vital de soude
ou Cacodylo-Phosphate vital de fer,

1 à 2 injections de 1 cme par jour.

Propriétés. — Le Cacodylo-Phosphate vital à base de chaux ou à base de soude constitue un puissant arsenico-tonique. — Le Cacodylo-Phosphate vital de fer réalise la médication hémato-gène par excellence (réunion de l'arsenic cytogène, du fer hémoglobino-gène, et du Phosphate vital stimulant de la nutrition et des échanges physiologiques).

Indications. — Contre toutes les formes de la faiblesse et de l'épuisement.

Etablissements JACQUEMAIRE
M. MIGUET, Docteur en Pharmacie
VILLEFRANCHE (Rhône)

CALCILINE

Calciline ordinaire : Ph. de Chaux tri.... 0,35
 Carbonate de Chaux . 0,07
 Fl. de Calcium 0,005

par Comprimé ou par demi-mesure

Calciline Adrénalinée. — Même formule plus 2 gouttes de solution adrénalinée au millième.

Calciline Methylarsinée. — Même formule plus 0,005 de Méthyl. de soude.

Forme. — Comprimés. Granulé.

Mode d'emploi. — 2 comprimés ou 1 mesure, avant chaque repas. — Enfants 1/2 dose.

Propriétés. — Recalcifiant typé en raison de sa composition : Phosphate, Carbonate, Fluorure de Calcium.

Indications. — Anémie, Scrofule, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire, Croissance, Adénites, Maladies des Os, Diabète, Grossesse, Carie Dentaire, Convalescence.

Aucune contre indication.

Laboratoire de la " CALCILINE "

ODINOT, Pharmacien

21, rue Violet — PARIS

CAPSULES BARDET

à l'huile de HAARLEM vraie

Composition. — Chaque capsule contient 8 gouttes d'*huile de Haarlem vraie*, garantie importée de la seule maison fabriquant la véritable huile.

Indications. — Affections goutteuses et rhumatismales, Gravelle, Maladie du foie, Calculs, etc.

Posologie. — 2 à 4 capsules par 24 heures.

Le flacon de 30 capsules : 12 francs

Formuler : « Capsules BARDET ».

Echantillons : **PHARMACIE BARDET**

FONDÉE EN 1860

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e)

CAPSULES BRUEL

à l'éther Amyl Valérianique

Sous la forme originale (1881) des capsules Bruel, l'Ether Amyl Valérianique est un médicament antispasmodique puissant dont l'emploi est formel toutes les fois qu'on voudra prescrire un antispasmodique puissant et sans danger.

Dépourvu de toute toxicité, il permet, aux doses thérapeutiques, de calmer sans morphine les spasmes les plus rebelles aux médicaments, depuis l'angoisse des aortiques et des nerveux jusqu'au spasme douloureux des coliques hépatiques et néphrétiques.

C'est un précieux hypnotique.

Dose. — 3 à 15 capsules par jour.

Brochures et échantillons :

G. BRUEL

36, Rue de Paris — COLOMBES (Seine)

CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrée en Galacol, à la dose de 0,05 egr. dissoute dans 0,20 egr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

Dose. — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas ou matin et soir dans une tasse de lait ou de tisane.

Propriétés. — Se dissolvant lentement dans l'intestin, répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

Indications. — Toux, Catarrhes, Bronchites chroniques, Tuberculose, etc.

Laboratoire FREYSSINGE

6 Rue Abel — PARIS

CAPSULES DE MORRHUINE PUY

à l'extrait complet d'Huile de Foie de Morue
supériodé

Dosées à 2 milligr. d'iode combiné par capsule

Elles représentent chacune 15 grammes d'huile de foie de morue débarrassée de l'oléine et margarine indigestes.

L'extrait complet d'huile de foie de morue obtenu par un procédé spécial breveté, contient réellement toutes les Vitamines, les acides gras, le brome, l'iode, le phosphore, la lécithine, principes actifs de l'huile de foie de morue.

Maladies du système lymphatique, Ralentissement des fonctions lymphoïdes, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Adénopathie, Arthritisme, Scléroses, Cachexie, Rachitisme.

Doses. — Enfants de 0 à 17 ans 2 à 6 capsules; Adultes 18 ans et au-dessus 6 à 10 capsules, avant manger.

Littérature, Laboratoire PUY
à GRENOBLE (Isère)

CAPSULES RAQUIN

Capsules au *Copahivate de soude*, à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac.

Avantages :

Tolérance parfaite, ni odeur, ni renvoi.

Doses :

Le *Copahivate de soude*, ou copahu physiologique, est prescrit dans le traitement de la blennorrhagie, d'origine récente ou ancienne, à la dose de 6 à 12 capsules par jour, à prendre en trois fois, le matin, au repas de midi, et le soir en se couchant.

Établissements FUMOUE
78, Faubourg Saint-Denis — PARIS

CAPSULES TAETZ

Elastiques russes à l'Huile de Ricin *vierge*.

Forme. — Capsules molles.

Propriétés. — *Purgatif* le plus doux à l'intestin. *Laxatif* idéal.

Avantages. — Sans odeur ni saveur, de digestibilité parfaite, permettent l'usage même journalier de l'huile de ricin aux personnes les plus délicates.

Présentation. — Boîtes de 4, 6 ou 8 capsules selon la grosseur.

Dépôt général et Echantillons :

France. — Laboratoires TAETZ

2, Rue Lesdiguières — PARIS (IV^e)

Belgique. — M. F. RAMLOT

72, Rue de l'Escaut — BRUXELLES

CARBOLACTYL

Composition :

Ferments lactiques et pancréatiques sélectionnés, adsorbés par du charbon végétal pulv. algues à muellage.

Indications :

Auto - intoxications gastro - intestinales. Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatoses.

Formes :

1^o Boîte de 30 cachets ;

2^o Poudre avec cuiller-mesure.

(n'existe pas sous forme de comprimés).

Doses :

Adultes : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures pro die. — Enfants : 2 à 6 mesures pro die.

Echantillons et Littérature sur demande

19, Rue de Fieurus — PARIS (VI^e)

CARBONATE DE BISMUTH

La forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth est certainement la *Tablette Perroud*. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les reflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de Bismuth par tablette divisée en 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes, elles seront plus rapides en résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie* 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicamenteusement puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge.) — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *gastralgie*, *hypersécrétion* ; dans les fermentations intestinales, à petites doses, seule ou associée, la *Tablette Perroud* rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD
7, rue des Archers — LYON

CARBOSANIS

CHARBON ORGANIQUE A POUVOIR D'ADSORPTION CONSTANT

Propriétés. — Pouvoir adsorbant considérable (plus de 50 fois la valeur du charbon végétal) puissant antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

Indications. — Empoisonnements. Fermentations gastro-intestinales. Hyperchlorhydrie. Ulcus. Entéro-colites. Diarrhées intenses. Plaies.

Formes. — Granulé et poudre.

Laboratoire MONTAGU
49, boulevard de Port-Royal. — PARIS.

CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure
Principe actif du *Strophantus gratus*

Présentation et posologie. — 1° Voie buccale.
Solution glycéro-alcoolique à 2 p. 1000 (25 gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).

Petites doses : 25 gouttes par jour en une fois.

Doses moyen. : 50 à 75 gtes par j. en 2 ou 3 fois.

Doses fortes : 100 gouttes par jour en 4 fois.

2° Voie intraveineuse. — Ampoules titrées telles que 1 cc. = 1/4 mgr. ouabaïne. 1/4 mgr. p. inject.

Indications. — Toutes les insuffisances cardiaques avec hypotonieité marquée ; en un mot, tous les cas où il y a dilatation cardiaque (Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir Digibaine).

Echantillons et littérature

Laboratoires DEGLAUDE

6, r. d'Assas, Paris (6^e). Tél. : Fleur. 31-85.

Belgique : *Agent Général* : **L. PRUNIÈRES**

19, Rue Louis Hap — BRUXELLES

CARNINE LEFRANÇO

Sue de viande de bœuf crue, concentré à froid, dans le vide, en solution suero-glycérinée.

Indications. — Reconstituant énergique, prescrit dans : *Anémie, Anorexie, Convalescences, Tuberculose, Affaiblissements, etc.*

Dose et mode d'emploi. — Une à quatre cuillerées à soupe par jour, pure ou additionnée d'une boisson froide ou tiède.

Établissements FUMOÛZE

78, Faubourg Saint-Denis — PARIS

CASCARA MIDY

à base de Cascara Sagrada naturel, complet et épuré, mais non dénaturé par des manipulations chimiques.

Pilules dosées à :

1^{re} 0,12 cgr. d'extrait hydro-alcoolique de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

2^e 0,10 cgr. de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 pilules le soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

Prop. Thér. Laxatif doux et à effet constant, ni irritant, ni drastique.

Indications. — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrite aux femmes enceintes et aux nourries.

Détail : 140, Faub. Saint-Honoré, PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17^e)

CASCARINE LEPRINCE

C¹² H¹⁰ O⁵

Indic. thér. — Constipation habituelle, Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc.

Cholagogue puis Copragogue de tout premier ordre. (Véritable spécifique des causes et des conséquences de la constipation).

Doses et mode d'emploi. — Pilules à 0,10 : 1 ou 2 Pilules le soir au coucher, ou aux repas si la constipation est d'origine digestive.

Docteur M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

CEPHÆMETINE

Composition. — Combinaison définie d'émétine céphœline et psychotrine, déposée sous le nom de « **CEPHÆMETINE** » dont l'action se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de noir animal, à grains microscopiques et lavés, maltine, carbonate de bismuth et excipient approprié.

Indications. — Entérite, Dysenterie, Diarrhée gastrique infectieuse et parasitaire (amibiases).

Nota. — Les troubles dus à l'Helminthiase ne sont pas atténués et l'échec de la thérapeutique éclaire le diagnostic.

Posologie. — Un cachet une heure après la fin des repas, suivi d'un autre demi-heure après le premier.

Présentation. — Boîte de 30 cachets.

LABORATOIRE de la CEPHÆMETINE

L. PUECH, Pharmacien

44, rue Gambetta, à BIARRITZ

Dépôt. — Drogueries et Commissionnaires en spécialités.

CÉRÉALOSE

Farine alimentaire contenant tous les phosphates organiques assimilables du blé, de l'orge et de l'avoine, ainsi que toutes leurs vitamines.

Propriétés. — Aliment parfait, pour tous les âges (dentition, croissance, formation des os, anémie, convalescence, vieillesse) en raison de ses propriétés digestives et nutritives, de sa teneur en phosphates naturels assimilables et vitamines.

Indications. — Nourriture complémentaire du nourrisson, des mères et de leurs enfants, des femmes enceintes et des nourrices, des malades ou convalescents, de tous ceux qui ont besoin de phosphates et de vitamines.

Emploi. — Sous forme de bouillies au lait, la « Céréalose » est d'une saveur très agréable et très facile à digérer.

Prix de la boîte : 5 fr. (sans impôt)

Laboratoires P. ASTIER

41 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS

CÉRÉBROIL LEYSIN

Sels solubles non oxydés de phosphore directement assimilables.

Présentation. — Liqueur et Sachets.

Indications. — Insuffisance cérébrale, dépressions nerveuses, perte de mémoire, de volonté, apathie, irrésolution, phobies, tics, aphasie, asthénie génitale.

Propriétés. — Augmente la faculté d'attention volontaire, l'intensité de la pensée, l'énergie morale, la puissance de travail et la résistance physique. Facilite la rééducation cérébrale. Médication réelle de la fatigue, du surmenage et des neurasthénies.

Posologie. — Un sachet ou une cuillerée à café avant chacun des deux principaux repas. Si le malade doit prendre du *Nitrogl Leysin*, lui indiquer de prendre le *Cérébroil Leysin* au milieu du repas. Supprimer toutes médications contenant de la strychnine ou de l'arsenic.

Prix : 22 fr. 40 — Au Corps Médical : 16 fr. 50

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e)

CÉRÉOSSINE DEHAUSSY

Composition. — *La Céréossine Dehaussy est un minéralisateur complet* : elle renferme, en effet, sous forme de poudre d'os frais, la totalité des sels minéraux nécessaires à la vie, y compris les " infiniment petits chimiques " (G. Bertrand).

Elle apporte en outre un surcroît de phosphore assimilable sous forme de phosphates tirés des graines de céréales ; le fer même du sang sous forme d'hémoglobine ; un stimulant remarquable des centres de rénovation cellulaire, le nucléinate de Manganèse ; du fluor et de la silice nécessaires au poulmon (Tammann).

La Céréossine Dehaussy est aussi un minéralisateur efficace car elle contient le " mordant opothérapique ", capable de suppléer à la déficience des glandes à sécrétion interne qui régissent le métabolisme minéral. Grâce à cet apport endocrinien (parathyroïde-et-tissulaires) la déminéralisation est arrêtée, et l'apport minéral est fixé (Boex, M. Callum) La Céréossine ne renferme ni Surrénale, ni Adrénaline, dont l'influence déminéralisatrice est prouvée (Manoussakis, Lyon 1923).

Indications Thérapeutiques

1°) Minéralisation préventive

Grossesse, Allaitement : assure un large apport de sels minéraux, évite les spoliations, *Croissance* pénible ou trop rapide, *Caries dentaires, Pré-tuberculeux* : facilite la réaction de défense fibrino-calcaire, améliore l'état général.

2°) Reminéralisation

Médication accessoire de toutes les maladies où l'agent infectieux a lésé les glandes fixatrices (grippe, scarlatine, rougeole, typhoïde, syphilis et hérédo-syphilis, Tuberculose même ouverte).

3°) Etats de déchéances organique

La Céréossine est aussi un " Reconstituant " extrêmement actif, indiqué dans l'anémie (hémoglobine), la neurasthénie (phosphates des Céréales) les états de faiblesse et de dépression (Nucléinate de Manganèse).

Posologie

Cachets : 2 à 3 par jour, 10 ans 1/2 dose.

Poudre : 2 à 3 cuillères à café par jour, 10 ans 1/2 dose.

Granulé : en cuillères à café ; 1 à 2 ans, une ; 3 à 5 ans, 2 ; 6 à 10 ans, 3 ; 15 ans, 4.

Laboratoires DEHAUSSY

44, rue Inkermann, Lille

CERVOL

(Bromhydrate double de Quinine et Caféine)

Propriétés thérapeutiques. — Antitbermique, analgésique, antinévralgique, bactéricide. (Sans action secondaire ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur l'estomac.)

Composition. — Bi-bromhydrate de Quinine et de Caféine associé par un mode de préparation spécial à l'Acetphénétidine et à l'Antifébrine.

Forme. — Etui de 12 cachets.

Indications. — Névralgies diverses — Grippe, Migraines, Rhumatismes, Douleurs et Affections fébriles en général.

Doses. — Adultes : 2 à 4 cachets pro die.

19, Rue de Fleurus — PARIS (6*)
Echantillons et littérature sur demande

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

CETHOCAL

Composition. — Complexe de sulfates de terres rares (avec prédominance de cérium et de thorium), de sulfate et de carbonate de calcium, contenant du lanthane et du didyme.

Action. — Les sels, en particulier les sulfates de terres rares, catalyseurs d'oxydation, sont des destructeurs de toxines, d'où leur action puissante dans l'Eczéma, considéré comme réaction de défense (GOUZEROT). Antiseptiques puissants, à action élective sur le bacille de Koch (DROUIN), ils constituent de véritables spécifiques des dermites, en particulier et tout spécialement des tuberculoses cutanées.

Forme et prix. — *Poudre* : 6 francs.

Gouttes : 10 francs.

Indications. — Eczémas de toutes formes, Impétigo, Herpès, Acné, Ulcérations de la peau, Erythème fessier des bébés, Pyodermites, Lupus, Psoriasis, Adénites, Tuberculoses verruqueuses, Métrites (en tous pansements).

Mode d'emploi. — *Poudre* : Employer la poudre telle quelle ou, mieux, délayée dans un peu d'eau bouillie, à consistance de crème; l'appliquer sur la lésion et laisser sécher, faire tomber l'excès avec un coton ou un linge sec. Une application matin et soir.

Gouttes. — *Adultes* : XX gouttes, 2 fois par jour, au début des repas de midi et du soir.

Enfants : A partir de 6 ans, V à X gouttes.

LABORATOIRE DU CETHOCAL,

1, Rue du Val-d'Oise,

SAINT-MAURICE (Seine)

CÉTRAROSE GIGON

Composition — Solution d'Acide protocétrarique*

$C_{30} H_{48} O_{12}$ à 0,016 milligr. par cm. c.

Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques. — Médicament à électivité musculaire, Analgésique gastrique, Spécifique contre les vomissements, Vomissements de la grossesse, Etats nauséux, Douleurs gastriques, Troubles digestifs, Indigestions.

Mode d'emploi et Doses. — 15 à 20 gouttes en une fois dans un peu d'eau sucrée.

Jusqu'à 200 gouttes par 24 heures.

Laboratoires du D^r André GIGON

7, rue Coq-Héron — PARIS (1^{er})

CHARBON TISSOT

(Grains anisés de)

Forme. — Charbon de peuplier aggloméré au gluten mucogène, aromatisé à l'anis, très légèrement additionné de benzo-naphtol, ou simple.

Le mode d'agglomération en gros grains glutinisés en fait la meilleure forme d'administration du charbon de peuplier en même temps que la plus agréable.

Indications. — Dyspepsie, Gastralgie, Flatulence, Digestions difficiles, Nausées, Hoquet, Renvoi, Embarras et Fermentations intestinales.

Dose. — 1 cuill. à café soit après chaque repas, soit le soir en se couchant ce qui suffit habituellement.

Nota. — Avaler comme des graines de lin avec une gorgée d'eau si possible.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, Boulevard de Clichy. PARIS

CHELOÏDINE

Pommade résolutive et calmante
à base de Thiosinanine, salicylate de
soude et stovaine.

Dépourvue de toute toxicité.

Indic. thérap. — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

Mode d'emploi. — Deux fois par jour, appliquer, gros comme une noisette, sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

Laboratoire A.-P. BROCADET

89, Rue du Commerce — PARIS

Téléph. Ségur 52-47

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

CHENANTHOL

Thérapeutique des Helminthiases

Composition. — Le **CHENANTHOL** est la forme officinale définitive et parfaite de l'*Essence pure de Chenopodium Anthelminticum*, obtenue par une technique spéciale de la distillation des sommités fleuries de cette plante.

Principe actif : Ascaridol ($C^{10} H^{18} O^2$).

Caractéristiques. — *Inoffensif* ; action rapide, sûre et complète. Le **CHENANTHOL** s'est imposé comme traitement spécifique des parasites du tube digestif : *Ascaris*, *Ankylostome*, *Anguillule*, *Oxyures*, *Trichocéphale*, etc., etc.

Pouvoir vermicide comparé :

B. Naphthol	1 gr. 30	élimine	26 %	des vers
Eucalyptol+chloroforme	—	—	46 %	—
Thymol	2 gr.	—	88 %	—
Chenanthol	1 cc. 5	—	96 %	—

La **SANTONINE** est capricieuse et dangereuse

Le **THYMOL** a occasionné des accidents mortels ; il est malaisé à prendre, et pleinement actif à fortes doses seulement. Son efficacité tombe à demi dès qu'on sort des doses élevées. Au contraire, l'efficacité du **CHÉNANTHOL** est pratiquement constante quand on diminue les doses; qualité précieuse dans la thérapeutique infantile.

Posologie et mode d'emploi. — Les capsules de Chénanthol sont rigoureusement dosées en volume et non en gouttes (1/4 de cent. cube par capsule). On donne une capsule par 3 années d'âge ; maximum : 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purge saline : 1 heure 1/2 après la dernière.

Régime. — Pas de régime préparatoire. *Diète de rigueur* pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge.

Renouveler le traitement au bout de 10 jours, si on le juge à propos, comme cure radicale.

LABORATOIRE L. HINGLAIS
EPERNAY (Marne)

CHLORAL BROMURÉ DUBOIS

Médicament spécifique du système nerveux, dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas l'estomac. — Liquide sucré, de consistance sirupeuse, Contenant les principes des écorces d'oranges amères représentant 0,40 chloral et 0,60 bromure par cuillerée de 20 gr.

1 à 6 cuillerées, à café ou à soupe, selon l'âge, dans les 24 heures.

Flacons et demi-flacons.

Insomnies, Coqueluche, Epilepsie,
Menstruations douloureuses, Névralgies
Névroses, Psychoses.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS

CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

Forme. — Pilules à enrobage de gluten recouvert d'un enduit inattaquable par le suc gastrique.

Compos. — Chloramine T 0 gr. 05, Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10.

Indic. Thér. — Dysenteries. Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, etc.

D'une innocuité absolue, elles permettent *réellement* de réaliser la désinfection intestinale : Fétidité des selles.

Posologie. — 2 à 8 pilules par jour au commencement des principaux repas.

Laboratoire FREYSSINGE

6, Rue Abel — PARIS

CHLORÉTHYLE BENGUÉ

Chloréthyle Bengué.

Anesthésie locale, névralgies.

Flacons en métal et en verre. Fermeture à clapet très pratique.

Anestile Bengué.

Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°.

Anesthésie locale, névralgies.

Narcotile Bengué.

Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale.

Flacon de 50 gr. gradué à gros jet, fermeture à clapet. — Tubes scellés 3, 5, 10 cc. pour anesthésie générale.

Chlorure de méthyle pur.

Bidons de 250, 500 gr. et 1 kilo.

Docteur BENGUÉ

pharmacien

16, rue Ballu. — PARIS (IX^e)

CHLOROBYL

Composition :

Tochlorine.....	0 gr. 05
Bile purifiée.....	0 gr. 10
Charbon.....	0 gr. 10

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Prop. Thér. — Désinfection intestinale.

Indications. — Entérite, Dysenterie, Affections cutanées.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Laboratoires Réunis

11, Rue Torricelli

PARIS (17^e)

CHLORO-CALCION

Forme :

Gouttes.

Composition :

Solution titrée de *Chlorure de calcium* chimiquement pur, stabilisé. 80 gouttes = 1 gr. Ca Cl^2 .

Dose :

20 à 40 gouttes aux repas, dans de l'eau sucrée.

Action :

Chloro-Calcion est le *récalcifiant* physiologique type. La solution de Ca Cl^2 , directement assimilable, n'utilise pas l' H Cl du suc gastrique trop souvent déficitaire chez les tuberculeux. Il ménage donc la puissance digestive de l'estomac.

La présence en quantité suffisante de calcium dans le sang est un des facteurs essentiels de la coagulation (Carnot).

Chloro-Calcion apporte au sérum la chaux qui lui manque. C'est l'*Hémostatique de choix*.

Indications :

Récalcifiant. Lymphatisme, Prétuberculose, Croissance, Rachitisme, Carie dentaire, Allaitement, Fractures.

Hémostatique. Toutes hémorragies, hémophilie, maladies du sang, anémies et chlorose.

MICHELS, Pharmacien de 1^{re} Classe
9, Rue Castex — PARIS

CHLOROFORME LAMBIOTTE Frères ANESTHÉSIQUE

Avantages. — Pureté chimique irréprochable. Stabilité et conservation parfaites. Répond à tous les desiderata des chirurgiens et cliniciens. Est, par surcroît, le moins coûteux des chloroformes.

Présentation. — Ampoules de 30 et 50 gr., et boîtes de 4 ampoules de 30 gr.

Indications. — Tous emplois chirurgicaux et médicaux.

Littérature et Échantillons :

PRODUITS LAMBIOTTE FRÈRES

3, *Rue d'Edimbourg* — PARIS (VIII^e)
et 124, *Avenue Rogier* — BRUXELLES

CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

Composition. Extrait de Combretum. Extraits biliaires. Extrait de boldo boldinisé.

Propriétés. — Opothérapie et Phytothérapie associées: Cholagogue, Diurétique, Eupeptique, Anti-toxique, Laxatif.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire. Cirrhoses, Ictères, Cholecystites, Cholémie, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse. Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

Dose. — Prescrire 1 à 3 pilules après chacun des deux grands repas. Dose moyenne 4 pilules par jour.

Prix : le flacon : 8 francs

Laboratoires CAILLAUD

25, r. Drouot, PARIS (9^e). — Tél.: Cent. 59-92

CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase
Dragées ovoïdes kératinisées dosées
à 0 gr. 25 d'extrait

Doses et mode d'emploi. — 6 à 12 ovoïdes par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

Prop. Thér. — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

Indications. — Spécifique de l'entérocolite mucéo-membraneuse.

Laboratoires DURET & REMY
ASNIÈRES (Seine)

CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

Formule du Dr L.-G. MARY

Forme. — Comprimés à enrobage spécial (soluble dans l'intestin).

Composition. — Extraits biliaires, ferments lactiques, pancréatine extractive.

Dose. — *Adultes* : 4 à 8 par jour, aux repas.
Enfants : 1/2 dose (ne pas croquer, mais avaler).

Indications. — Infections intestinales et Auto-intoxications, Entérites, Affections hépatiques provenant d'insuffisance biliaire, Cirrhoses, Diarrhées estivales, Troubles de la peau.

Echantillons sur demande aux
ÉTABLISSEMENTS DAGUIN,
à SAINT-MAUR (Seine)

CHOLERGINE

Médication Antitoxique, Colloïdes et Lipoides
Principes définis du fœte et de la bile de taureau
dissous dans l'huile végétale.

Société de Thérapeutique (Janvier 1911)

Académie de Médecine (Avril 1911)

Académie des Sciences (Juin 1911)

Forme. — Ampoules injectables de 2 cm³.

Mode d'emploi. — Injections dans la fosse retro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 % de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. 20 à 30 injections avec arrêt de 5 à 10 jours entre chaque dizaine. Léger massage après piqûre.

Prop. — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique. — Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires ni équivalents, employée journellement dans les hôpitaux.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, rue de la Source, PARIS (16^e)

Téléph. : Aut. 06.62

CITRASE

Sérum antianémique selon les formules du
D^r Normet, à base de citrates et tartrates
(communications à l'Académie de médecine).

Formes. — Ampoules pour injections intra-veineuses et ampoules pour injections sous-cutanées.

Indications. — Anémies pernicieuses, Etats leucémiques, lymphoïdes, etc.

LABORATOIRES ROBERT ET CARRIÈRE,

37, Rue de Bourgogne — PARIS

TÉLÉPH. : Ségur 29-49 ; Fleurus 13-09

R. C. 176249, Seine.

CITROSODINE Grémy

Hypéracidité (douleurs gastriques).

Antémétique (vomissements des nourrissons);

Eupeptique (dyspepsies, gastro-entérites).

Action lithotriptique et diurétique.

Action sur la viscosité du sang.

(*Pneumonies — Broncho-pneumonies*
Gangrènes séniles.)

Comprimés de 0 gr. 25 citrate trisodique.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : 4 à 8 comprimés (2 ou 3 fois p. jour).

Enfants : 3 à 4 comprimés

Pneumonies : 4 comprimés toutes les heures ou 8 comprimés toutes les deux heures, dans un demi-verre d'eau; la médication étant continuée jour et nuit, jusqu'au 2^e ou 3^e jour qui suit la crise.

Laboratoires P. LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (11^e)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré
non toxique

Généralisation
de la méthode Carrel-Dakin

Composition :

Comprimés dosés à 0 gr. 25 de chloramine sodique pure et stable.

Indications :

Gynécologie et toutes infections locales :
angines, abcès, plaies infectées,... et
comme agent prophylactique en
temps d'épidémie : grippe, fièvre
typhoïde...

Posologie :

UN comprimé par verre d'eau pour
gargarismes, pansements humides des
plaies, lavages dans les affections de
la gorge, du nez, des oreilles...

DEUX comprimés par litre d'eau pour
lavages de la vessie et dans toutes les
affections de l'appareil génito-uri-
naire de l'homme et de la femme.

Avantages :

Action antiseptique puissante (100 fois
plus actif que le formol), absence de
causticité, innocuité absolue.

Flacon de 60 comprimés : 7 fr.

Tube de poche : 2 fr. 50

Echantillons médicaux sur demande

Laboratoire

des ANTISEPTIQUES CHLORÉS

40, rue Thiers — LE HAVRE

COCAÏNE MIDY

(Chloroborates)

Chaque pastille contient :

0,002 mgr. de Chlorhydrate de Cocaïne.

0,05 cgr. de Chlorate de Potasse.

0,05 cgr. de Biborate de Soude.

Dose et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12-pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Prop. Thér. — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx ; Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge.

Détail : 140, Faub. Saint-Honoré, PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17^e)

CODOFORME

Compos. — Comprimés enrobés constitués p. une nouv. combinaison bromoformique solide associée à la codéine ; se dissolvent d. l'intestin seulement où ils libèrent sans fatigue pour l'estomac une quantité rigoureusement constante de bromoforme pur.

Chaque comprimé représente : Codéine, 1 cgr. ; bromoforme IV gttes ; teinture d'aconit et belladone aa. V gttes ; terpine et benzoate de soude comme excipient.

Indic. — Spécifique des toux sèches (spasmodiques, laryngo-trachéales, post-grippales, névropath.). Sédatif remarquable de la toux des tuberculeux, assurant calme et repos, sans irritation gastrique ou inappétence.

Posol. — 5 compr. p. j. ; 6 à 8 d. toux rebelles. Grands enf. (à part. de 5 ans) 2 à 3 compr. p. 24 h. Avaler s, sucer ni croquer.

Laboratoires BOTTU (Anc. Labor. du Néol)
35, r. Pergolèse. PARIS-16^e. Tél. Passy 43-89.

COLARSÉ

Reconstituant général du système nerveux,
et du tissu osseux.

Formes. — Cachets de 0 gr. 60. Granulé soluble.

Composition. — Anhydroxyméthylène diphosphate de chaux et de magnésie extrait de l'embryon du blé.

Méthylarsinate disodique, cinq centigrammes par cuiller à soupe de granulé ou deux centigrammes et demi par cachet.

Vitamines.

Indicat. thérap. — Convalescence des maladies infectieuses, Neurasthénie, Anémie profonde, Chloro-anémies tardives, Chloro-anémie tuberculeuse, Prétuberculose, Phosphaturie, Rachitisme, Arthritisme.

Mode d'emploi :

	<i>Cachets</i>	<i>Granulé</i>
De 6 à 12 ans,	2 cach. p. jour	2 cuil. à café p. jour
De 12 à 18 ans,	3 — —	2 — à dessert —
Adultes.....	4 — —	2 — à soupe —

Laboratoire du COLARSÉ

49, Rue Thiers — BOULOGNE-sur-MER

COLCHI-SAL MIDY

(Colchicine — Ess. de Wintergreen)

Chaque capsule contient :

1/4 de mgr. colchicine pure dissoute dans 0,20 egr. Salicylate de Méthyle naturel (Ess. de Wintergreen) obtenu par fermentation et distillation et équivalent à 0,25 egr. Salicylate de Soude.

Dose. — 4 à 16 capsules par jour par prises fractionnées.

Prop. Thé. de l'Ess. de Wintergreen

Augmente l'élimination de l'acide urique et des autres éléments solides de l'urine. — 2° Calme la douleur. — 3° Liquéfie et augmente la sécrétion biliaire. — 4° Légèrement diurétique. — 5° Diaphorétique. — 6° Diminue la fièvre. — 7° Combat la congestion et facilite la résolution des inflammations (G. Sée). — 8° Action antiseptique sur le sang.

de la Colchicine

Diminue la production d'acide urique. — 2° Augmente rapidement l'élimination de tous les produits brûlés et pousse à l'oxydation. — 3° Soulage la douleur. — 4° Augmente la sécrétion biliaire. — 5° Légèrement diurétique. — 6° Diaphorétique. — 7° Purgatif.

Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17°)

COLLOIDES AMICROS

Le Laboratoire des Produits Amicros est spécialisé dans la préparation des formules à base de métaux colloïdaux simples ou complexes ; (v. Orargol), et des colloïdes radio-actifs « Radiumicros ». — Solutions injectables : boîte de 6 amp. de 5 cc ou 1 amp. de 10 cc. Solutions non inject. ; voie buccale : gouttes Amicros. Pansements et Ovules Amicros et Radiumicros.

Gouttes Amicros : métaux colloïdaux électriques en solution concentrée. Présentation : flacon de 60 gr. avec compte-gouttes. Indications : 3 indications principales. Gouttes d'Orargol Amicros : États infectieux, fièvres, gripes. Gouttes d'Étain Amicros : Staphylococcies, furonculoses. Gouttes de Fer Manganèse Amicros : Anémie, chlorose.

Fosologie. — Enfants, 20 à 100 gttes suivant âge ; adultes, 1 à 2 cuil. à café par jour à prendre en plusieurs fois dans une boisson quelconque.

Laboratoire des PRODUITS AMICROS.

G. HELME, pharmacien de 1^{re} classe
5, rue Clauzel, PARIS, 9^e — Tél. Trudaine 00-47

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

COLLOÏDOGENINE du D^r BAYLE

Nature.

Extrait de rate de porc.

Formes.

1^o Colloïdogénine injectable (ampoule de 5 cc) ;

2^o Colloïdogénine sirop (cruchons).

Indications.

Tuberculose (toutes localisations et formes) ;

Prétuberculose ; Anémies de toutes natures.

Action.

Augmentation rapide des hématies (50 %) ; augmentation des leucocytes (40 %) ; augmentation de l'hémoglobine (40 %) ; raréfaction puis disparition des bacilles de Koch ; progression rapide des forces et du poids ; cicatrisation des lésions.

Emploi et doses.

Séries de 12 inject. (intrafessières ou sous-cutanées abdominales) en 22 jours. Chaque série est séparée de la suivante par 8 jours de repos. Le sirop de colloïdogénine est donné dans le même temps (4 cuill. à soupe par jour aux repas). Dans les cas légers ou comme prophylaxie le sirop suffit.

Doses chez l'enfant.

Colloïdogénine injectable au-dessous de 5 ans 1 cc par année d'âge ; au-dessus de 5 ans l'injection sera de 5 cc.

Colloïdogénine sirop, 1 cuill. à café p. jour jusqu'à 3 ans, 2 jusqu'à 5 ans, une cuill. à soupe jusqu'à 7 ans, 2 jusqu'à 10 ans, trois jusqu'à 14 ans.

Laboratoire CHAIX

10, rue de l'Orne

P A R I S-XV*

COLLOIL LEYSIN

Association agissant comme adoucissant, calmant, cicatrisant, saturant. Régulateur de la sécrétion chlorhydrique.

Présentation. — Comprimés, Liqueur, Gouttes.

Indications. — Hyperchlorhydrie, Ulcus Géant, Ulcère rond, Stricture Spasmodique du Pylore.

Propriétés. — Calme immédiatement les douleurs, s'oppose à l'exagération de la sécrétion chlorhydrique, cicatrise les ulcérations.

Posologie. — Mâcher les Comprimés, un à un, dès que paraissent les douleurs.

Prix : 22 fr. 40 — Au Corps Médical : 16 fr. 50

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e)

Téléphone : Auteuil 14-73

COLLO-IODE DUBOIS

(Gouttes et Dragées)

Composition.

Iodhydrates d'acides aminés.

Indications.

Pouvant remplacer l'Iode, les Iodures, les Peptones iodées, etc., sans aucune crainte d'Iodisme. — Les dragées de Collo-Iode théobromo-caféiné sont particulièrement indiquées dans l'asthme, l'emphysème, les maladies du cœur et ses complications (artério-sclérose, insuffisance rénale), les intoxications diverses, etc.

Posologie.

GOUTTES : Maximum utile chez les adultes : 60 gouttes.

DRAGÉES théobromo-caféinées : 2 à 6 dragées par jour, suivant l'âge.

Laboratoires BOTTU

(Laboratoires du Néel et Dubois réunis)

35, Rue Pergolèse — PARIS (16^e)



COLLOÏXOLS du Dr RIQUOIR

Colloïxol Antibacillaire n° 1. — (Permanganate de calcium et monochlorhydrine fixés sur du bleu de méthylène.)

Dans la Tuberculose pulmonaire, injecter 1/4 de cc. tous les 5 jours, puis 1/2 cc. tous les jours.

Colloïxol Antibacillaire n° 2. — (Permanganate de calcium, thiocol et goménol fixés sur du bleu de méthylène.)

Dans les Tuberculoses externes, injecter 1 cc. pendant 12 jours, repos 10 jours et reprise.

Colloïxol Antibacillaire n° 3. — (Permanganate de calcium, thiocol et monochlorhydrine fixés sur du bleu de méthylène.)

Dans les Tuberculoses ganglionnaires, injecter 1 cc. par jour.

Colloïxol Antiarthritique. — (Salicylate de soude fixé sur du bleu de méthylène.)

Dans le Rhumatisme, la Goutte, la Sciatique, injecter 1 à 3 cc. par jour.

Colloïxol Antientéritique. — (Chlorure de magnésium fixé sur du bleu de méthylène.)

Dans l'Entérite, la Diarrhée infantile, injecter 1 à 2 cc. par jour.

Colloïxol Antipyosique — (Permanganate de calcium, fixé sur du bleu de méthylène.)

Dans la Salpingite, la Furunculose, injecter 1 cc. par jour.

Cachets. — (Les complexes colloïdaux existent sous forme de cachets; 3 par jour.)

Prix de la boîte de 12 ampoules : 16,80 (impôt compris)

Prix de la boîte de 18 cachets 16,80 (impôt compris)

SOCIÉTÉ DES COMPLEXES COLLOÏDAUX DU DOCTEUR RIQUOIR

MERMINOD & C^{ie}

49, Rue de Paradis — PARIS (10^e)

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre

Composition. — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50.

Propriétés. — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments.

Indications. — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, fluxus blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau entre les doigts,

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

COMPRIMÉS " ROCHE "

DE THIOCOL

1 comprimé " Roche " de Thiocol = 0,50 egr. Thiocol " Roche ".

1 gr. Thiocol " Roche " = 0,52 egr. gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 par jour et plus.

Prop. Thér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

Indic. Thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, tuberculose, coqueluche, rachitisme, dyspepsies, entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

Comprimés " Roche " de Thiocol

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

CORÉÏNE

Mucilage rigoureusement pur, sans l'adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal.

(Procédé Taillandier)

La Coréïne n'est pas de l'agar-agar.

La Coréïne n'est pas extraite de l'agar-agar.

C'est du mucilage pur.

Propriété unique. — Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

Indications. — Constipation simple Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.

La Coréïne constitue un traitement remarquable, souvent le seul, de la constipation et de certaines formes diarrhéiques.

Forme. — Granulé et Paillettes.

Bibliographie. — Pathologie gastro-intestinale, A. Mathieu et J.-C. Roux, etc.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, Rue de la Source — PARIS (16^e)

Téléphone : Aut. 06-02

CRATÆGINE

A base de fleurs fraîches d'aubépine stabilisées (non toxique)

Prop. therap. — Tonique et régulateur cardiovasculaire. Si elle ne peut être considérée comme un succédané de la digitale, elle maintient utilement l'action obtenue avec ce médicament cardiaque comme elle doit maintenir celle que l'on obtient avec l'ouabaine. — Vaso-dilatateur. Hypotenseur par action vasculaire périphérique.

Indic. therap. — Erethisme cardiaque. Palpitations des nerveux et des neurasthéniques. Troubles congestifs de la ménopause. Tachycardie paroxystique essentielle. Goitre exophtalmique.

Doses et mode d'emploi. — XV à XX gites, 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée. — Dose maxima : XXX gouttes 3 fois par jour.

E. LEROUX, ex-interne des Hôp. de Paris.
Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Inférieure).

CRÈME RÉSOLUTIVE du Dr RAP

Composition. — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à action fortement vaso-constrictive et analgésique:

(Hamamelis, Arnica, Noix vomique, etc..)

Propriétés. — Calme la Phlébaldgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

Indications. — Varices, phlébites, insuffisances veineuses.

Mode d'emploi. — En massage matin et soir. S'il existe une contre indication au massage, employer la « Friction Rapé » en lotion ou en pulvérisation.

Laboratoire R. CAVAILLES

34, Rue de Turin — PARIS-VIII*

CRÉOSAL DUBOIS

Gaïacol - Ac. Phosphorique - Calcium
Sirop, Comprimés, Solution, Granulé, Ampoules

Composition :

Sirop et Solution : 50 centigr. de Créosal par cuillerée à bouche.

Granulé	150	—	—	—	à café.
Ampoules	{	10 centigr. de Créosal sodique	{	par	
		5 — de Méthylarséniate double		ampoule	
		de Sodium et de Strychnine		de	
		5 — Saccharose pure		1 centimètre	

Propriétés et Indicat. thérap. — Recalcifiant puissant, antibacillaire, accélérateur de la nutrition. Employé avec succès dans : la *Tuberculose pulmonaire, osseuse ou cutanée*, les *Bronchites aiguës ou chroniques*, les *Toux rebelles*, le *Lymphatisme*, la *Scrofule*, le *Rachitisme*, etc., etc.

Laboratoires LALEUF

40, av. de La Motte-Picquet — PARIS (15*)

Téléph. : Ségur 65-61

CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Combinaison d'aldéhyde formique (4 %) et de créosote (96 %). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieur à l'iodoforme dans tous ses emplois.

Prop. Thérap. — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

Indications. — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, etc..

Mode d'emploi. — Existe sous trois formes :

1° *Créosoforme-Poudre*, présenté en flacons poudreux, pour saupoudrage des plaies.

2° *Créosoforme-Onguent*, présenté en tubes d'étain.

3° *Créosoforme-Ovules*, pour pansements gynécologiques.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

3, rue d'Edimbourg, PARIS (8°)

124, Avenue Rogier, 124, BRUXELLES

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Constitution. — La *Cryogénine* est une semi-carbazine dont la formule est la suivante :



Poudre cristalline blanche, inodore, presque insipide, peu soluble dans l'eau (2 p. 100 à 20°), soluble dans la glycérine (5 p. 100) et dans l'alcool (11,50 p. 100).

Propriétés. — La *Cryogénine* représente le médicament antipyrétique, analgésique type. Elle agit avec une égale sûreté contre les températures fébriles et contre les phénomènes douloureux.

Posologie. — De 0 gr. 50 à 4 gr. *pro die* chez l'adulte.

Formes. — Poudre; Comprimés; Cachets; Pilules.

En raison de fréquentes substitutions, causées d'échecs ou d'accidents, préférer les formes spécialisées. Comprimés et cachets, dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25 de cryogénine. Pilules, dosées à 0 gr. 10 de cryogénine.

Produits spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER, Pharmacien

9, cours de la Liberté — LYON

CRYPTARGOL LUMIÈRE

ARGENTOTHIOGLYCERINE SULFONATE DE SODIUM

renferme 35 % d'argent métallique

Il se présente sous forme d'une poudre jaune très soluble dans l'eau ; sa solution est neutre et ne noircit pas à la lumière.

A. — ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Le *Cryptargol Lumière* a donné comme antiseptique intestinal des résultats remarquables, infiniment supérieurs à ceux obtenus avec les autres méthodes utilisées jusqu'ici.

Mode d'Emploi et Doses :

Adultes. — Pilules : 4 à 6 par jour aux repas.

Enfants. — Sirop : 1 à 4 cuillérées à café par jour, selon l'âge.

B. — GYNÉCOLOGIE

Ovules au *Cryptargol*.

Pansement Gynécologique idéal.

PRODUITS SPÉCIAUX DES LABORATOIRES A. LUMIÈRE

M. SESTIER PHARMACIEN

9, Cours de la Liberté — LYON

CURALUÈS

du Docteur L. Lafay

Adopté dans les Hôpitaux de Paris, les Hôpitaux militaires, les Prisons de la Seine, le Ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, etc.

Forme. — Ampoules de 1 à 2 cc contenant : 0 gr. 08 ; 0,16 ; 0,24 ; 0,32 de Bismuth métal.

Composition. — Suspension huileuse d'oxyde de Bismuth hydraté.

Propriétés. — Très active, indolore, non toxique, la plus riche en métal.

Indic. therap. — Tous accid. syphilit.

Doses p. adultes. — 1 ou 2 inject. intramuscul. p. sem., suiv. teneur bismuth choisie par le médecin.

Pharmacie L. LAFAY et F. FERRAND

54, Chaussée d'Antin, PARIS-IX^e

CURATOXINE VENDEL

Médication anti-infectieuse par voie buccale.

Présentation. — Saccharolé soluble.

Formule. — *Urotolithine* (0.25 par cuillerée à dessert) en combinaison *Benzo-Salicylée-Sodique*, *Iode combiné* (0.01 par cuil. à dessert) *Extraits* et *Sels laxatifs* et *diurétiques* *Boldo*, *extrait hépatique*, *glycérophosphates*.

Action. — Anti-toxique. Antiseptique. Emoncto-riale "La Curatoxine élimine les toxines".

Indications. — *Tous les états infectieux aigus ou chroniques.*

Infection des voies biliaires, Ictères, Infection vesico-Pyélo-rénales Maladies infectieuses.

Septicémies. Suppurations chroniques.

Dermatoses d'origine digestive: Aenè. Furonculose.

Urticaire. Rhumatismes goutteux. Arthritisme.

Posologie — 2 cuillerées à dessert dans les états infectieux chroniques; 2 à 4 cuillerées à dessert dans les états aigus. *Enfants*: prescrire par cuillerées à café.

Laboratoire E. VENDEL

61, Rue de Vaugirard — PARIS

CUROXYURE

Traitement efficace des oxyures

Forme. — Pommade en tube muni d'une canule en os.

Composition. — Acide thymique, naphthaline; savon médicinal; extraits d'absinthe et de tanaïsie.

S'applique aussi bien aux enfants qu'aux grandes personnes *sans aucun danger.*

LABORATOIRE B.E.A.,

Ch. BEHA, Pharmacien de 1^{re} Classe,
BELFORT

CURIODE

Composition : Combinaison organique d'iode et d'un dérivé protéique d'origine animale.

Avantages : Entièrement assimilable, plus efficace que les iodures alcalins et jamais aucun phénomène d'intolérance ou d'iodisme. — Elimination régulière.

Propriétés : Le Curiodé est :

- a) *Vaso-Dilatateur* (Artériosclérose, hypertension, etc.)
- b) *Stimulateur des organes lymphoïdes et des séreuses.* (Adénopathies, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathie.)
- c) *Donne de la fluidité au sang et aux sécrétions.* (Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques, Coqueluche.)
- d) *Indispensable au traitement de la Syphilis.*

Indications : 1° *Affections cardio-vasculaires.*

(Artériosclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Péricardite.)

2° *Affections respiratoires.*

(Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques, Coqueluche, Laryngite chronique, Bronchites anciennes.)

3° *Affections des organes lymphoïdes.*

(Adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathies, Hydarthroses.)

4° *Syphilis et toutes ses complications.*

Posologie : Vingt gouttes correspondent à :

1 gramme de KI ou à 0 gr. 04 d'iode métalloïdique.

Doses moyennes : 30 à 40 gouttes par jour, à prendre en deux fois (aux repas).

Remarque : Quand les doses atteignent 60 gouttes, il est préférable de commencer par 10 gouttes à chaque repas (20 gouttes par jour) et d'augmenter d'une goutte par repas tous les jours, jusqu'à 30 gouttes par repas.

Repos une semaine par mois.

CURIODE ARSÉNIÉ

Composition : Combinaison organique d'iode, d'arsenic et d'un dérivé protéique d'origine animale.

Indications : Les mêmes que celles du Curiodé et de l'arsénite. Recommandé chez les enfants et les adultes atteints d'affections pré-tuberculeuses et d'adénopathies simples ou trachéo-bronchiques.

Posologie : Vingt gouttes correspondent à : 1 gram. d'iodure de potassium ; 0 gr. 005 d'acide arsénieux ; 0 gr. 05 de méthylarsinate de soude (arsbénal) ; 2 cuill. à soupe de sirop lodotannique.

Doses moyennes : Adultes, 30 à 50 gouttes par jour. Enfants, 2 à 3 gouttes par année d'âge.

Mode d'emploi : A prendre en 2 fois pendant les repas. Commencer par des doses faibles et augmenter tous les jours d'une goutte par repas. — Repos une semaine par mois.

TOLÉRANCE ET INNOCUITÉ ABSOLUES

Echantillon gratuit à MM. les Docteurs

Laboratoires DORANTOWICZ

17, Avenue Parmentier — PARIS

CYTOBIASE

EXTRAIT TOTAL DE FOIES FRAIS DÉGRAISSÉS DE MORUE

Composition — Renferme sous un faible volume tous les éléments actifs des cellules hépatiques, **complètement dégraissés** du gadus morrhua (Phospholipoides et éthers cholestériques, vitamines liposolubles).

Formes pharmaceutiques.

Gouttes (20 gouttes représentant les éléments actifs de 2 verres d'huile de foie de morue) le flacon 6 fr. 50.

Ampoules, la boîte 10 fr.

Indications thérapeutiques.

Affections des voies respiratoires.

Affections du système osseux.

Affections lymphatiques.

Tous les cas d'amaigrissement et de déchéance.

Posologie.

Gouttes : Enfants jusqu'à 7 ans, 8 à 10 gouttes.

De 7 à 15 ans, 12 à 20 gouttes.

Adultes, 25 à 30 gouttes.

A prendre 2 fois par jour avant les repas dans une gorgée de liquide quelconque.

Ampoules de 2 cc inject. intra-trachéales: bacilloses pulmonaires. Ampoules 1 cc. injections sous-cutanées: bacilloses ganglionnaires et osseuses.

LABORATOIRES DU CYTOBIASE

36, rue des Archives. — PARIS

Reg. Comm. Seine : 49.513

CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition.

Cocodilate de soude chimiquement pur. — Trente centigr.
Sulfate de zirconine Un milligramm.
Sérum isotonsant chloruré Cinq centicub.

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée ou intra-musculaire au niveau de la cuisse ou de la fesse, tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

Indications. — Lymphatisme. Anémies. Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire et ostéo-articulaire. Neurasthénie. Asthénie post-grippale. Convalescences.

Présentation. — Cyto-Sérum pour adultes 12 ampoules de 5 centicubes.

Cyto-Sérum infantile 12 ampoules de 2 centicubes.

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes - PARIS - Tél.: Wagram 37-64

CYTOTROPINES

Associations lipoido-mono-métalliques.

En ampoules : Sn. Hg. Fe. Cu. Ag.

En pilules : Sn. Fe. Hg.

Indications. — Ressortissant respectivement à chaque métal.

Littérature sur demande

Ampoules, la boîte de 8 : 8 fr. 50

Pilules, l'étui de 60 : 7 francs

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boulevard de l'Hôpital — PARIS (5^e)

DÉPURATIF KROMELINCK

Essence de salsepareille rouge
composée et concentrée

Indications. — Artério-sclérose et toutes affections de l'appareil circulatoire. Affections du tube digestif productrices de toxines. Obésité.

Posologie. — 3 cuillerées à soupe (pur ou dilué dans une eau légère), par jour, pendant un mois.

Salsepareille rouge iodurée
du Docteur Kromelinck

Recommandée pour le traitement des spécifiques

Mêmes indications — Même posologie

Laboratoires BELIERES

19, Rue Drouot — PARIS

DERMO-PLASTOL DUMESNIL

(Plastols Dumesnil)

Forme avec le *Zébo-Plastol* et le *Crémo-Plastol* le groupe des Plastols Dumesnil, pâtes poreuses composées, très-homogènes et destinées à être appliquées sur la peau, à la manière des pommades, dans toutes les dermatoses d'origine digestive et dont le type est l'eczéma sous toutes ses formes.

Propriétés. — Le Dermo-Plastol calme immédiatement les démangeaisons et assure la réparation intégrale des tissus malades.

Indications. — Les Plastols peuvent être appliqués sur toutes les parties du corps ou des membres : eczémas de la vulve ou du rectum, psoriasis, parakératoses psoriasiformes de Brocq, eczémas séborrhéiques de Unna, prurits avec lichenification et eczématisation, pityriasis, impétigo, prurigo, etc.

Laboratoires DUMESNIL

10, Rue du Plâtre — PARIS

DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique
à base de bioxyde de manganèse,
de bicarbonate de soude,
de chlorhydro-méthylarsinate de lithine,
d'antipyrine, de nitrate d'urane
et de santonine.

Doses. — 1 cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours; diminuer s'il y a lieu, après analyse du sucre; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Laboratoire des Produits SCIENTIA
21, rue Chaptal — PARIS

DIACHUSINE

(Traitement externe des néoplasmes)

1^o Vernis à la Diachusine arsénicale. — S'adresse aux cancroïdes en général, surtout aux petits cancroïdes de la face. Ne doit pas être employé sur des tumeurs à surface plus étendue qu'une pièce de 2 fr. environ.

Mode d'emploi. — Déterger l'ulcération de ses croûtes à l'aide de compresses humides, sécher avec un tampon d'ouate hydrophile, puis passer le vernis avec un pinceau.

2^o Poudre de Diachusine. — S'emploie lorsque la surface ulcérée atteint ou dépasse la grandeur d'une pièce de cinq francs.

Mode d'emploi. — Saupoudrer quotidiennement les cancers ulcérés après appropriation et assèchement.

LABORATOIRES A. LEJEUNE
12, rue Emilio-Castelar. — Paris-XII^e

DIADERMINE

Excipient pour Pommmades.

Définition. — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, onctueux, parfaitement homogène, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau, et pénétrant très rapidement à travers l'épiderme.

Indications. — La Diadermine doit être substituée à la vaseline, à l'axonge et à la lanoline, dans la confection des pommmades médicamenteuses. Servir pour les massages, touchers, etc. Être recommandée comme crème de toilette parfaite, pour les épidermes les plus délicats.

BONETTI Frères

12, rue Vavin — PARIS (6^e)

DIAL CIBA

(et Dial soluble)

Hypnotique anti-nerveux

Diallylmalonylurée. Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétéude. Procure un sommeil calme et réparateur, et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, son usage étant même prolongé.

Indicat. — Insomnie nerveuse en général et chez les agités, les émotifs, les surmenés. Etats dementiels.

Trois formes: Comprimés, Gouttes et Ampoules (Dial soluble).

Doses. — 1 ou 2 comprimés au coucher pour les insomnies du soir, au réveil pour celles du cours de la nuit. Adultes: 1 à 2 comprimés, XXX à LX gouttes, 1 ou 2 ampoules.

Prix: le tube de 12 comprimés, 5 frs. — Le flacon Dial soluble, 7 francs. — La boîte de 5 ampoules, 8 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

DIALACETINE CIBA

Sédatif, Antipyrétique, Analgésique

Diallylmalonylurée, plus éther allylique du paracétaminophénol. Action sédative, analgésique et antipyrétique permettant d'instituer une thérapeutique efficace et sûre dans l'ensemble des cas où l'irritabilité nerveuse compte parmi les symptômes dominants.

Indications. — Agitation et délire au cours des maladies aiguës. Epilepsie, Hystérie, Névroses diverses. Angine de poitrine, Névralgies, lumbago, etc.

Doses. — Dose sédative : 1 à 3 comprimés par 24 heures par 1/2 ou 1 comprimé, avec intervalle de 2 à 5 heures. Dose hypnotique et analgésique, 1/2 à 1 comprimé au maximum.

Le tube de 15 comprimés : 8 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

DIALYL

Dissolvant urique

Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle. Calculs, Coliques néphrétiques et hépatiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

Forme. — Granulé effervescent.

Posologie. — Deux cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 8 fr. le flacon

Laboratoire Alph. BRUNOT

16, Rue de Boulainvilliers — PARIS

(Téléphone : Auteuil 20-21)

DIASCLEROL

Composition. — Association Sédobenzyl ($C^6 H^5 CH^2 SO^3 K$) (antispasmodique, hypotenseur), hydrate de pipérazine et salicylate de lithine en milieu citraté.

Indications. — Diathèse urique, Hypertension, Artério-sclérose, Arthritisme, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Coliques hépatiques et néphrétiques, Obésité, Diabète.

Dose et mode d'emploi. — Granulé effervescent, 3 à 6 cuil. à café par jour, dans un peu d'eau, quelques minutes avant les repas.

Le DIASCLÉROL n'étant pas toxique, son emploi peut être prolongé.

Prix : 8 fr. 50

LABORATOIRE DE L'OPOCALCIUM,

RANSON, docteur en pharmacie,

121, Avenue Gambetta — PARIS

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques est devenu le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du médecin.

DIASES PROGIL

Composition. — Farines fraîches de céréales diastasées, de conservation indéfinie, renfermant toutes leurs vitamines.

Propriétés. — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber, grâce à une prédigestion s'opérant pendant la cuisson, qui permet l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité.
Sans aucun surmenage des organes digestifs, elles assurent une suralimentation rationnelle.

Indications. — Nourrissons (particulièrement au moment difficile du sevrage), Enfants, Malades, Convalescents, Vieillards. Tous les malades à régime : Cardiaques brightiques, Rhumatisants, Dyspeptiques, Tuberculeux, Cachectiques.

Mode d'emploi. — Délayer une partie de DIASE dans 3 parties d'eau froide. Chauffer à feu très doux en remuant constamment jusqu'à ce qu'un brusque épaissement se produise. Retirer du feu et continuer de remuer jusqu'à la liquéfaction de la bouillie (quelques minutes). Consommer tel quel ou assaisonner comme indiqué dans la brochure spéciale jointe aux boîtes.

Nomenclature. — Cacao (déjeuners, goûters), Froment (bouillies très fluides, bébés au biberon), Avoine (suralimentation), Riz, Orge (rafraichissantes, variant agréablement le régime).

PROGIL

Société anonyme au capital de 50.000.000 de fr.

PARIS (X^e) : 6, boulevard de Strasbourg.

LYON (IV^e) : 10, Quai de Serin.

DIASTOGÈNE DEHAUSSY

Le plus actif, le plus scientifique et le plus agréable des reconstituants

Composition et propriétés. — Par ses **Arsines**, stimule puissamment la nutrition ;

Par sa **Nucléine Manganésifère**, favorise la régénération du sang et du système nerveux et accélère les oxydations ralenties par la maladie.

Par sa **Kola fraîche stabilisée**, agit comme un tonique cardiaque précieux et comme un diurétique éliminant les déchets mal oxydés et les toxines.

Indications thérapeutiques. — Tous les états de déchéance organique ; chaque fois qu'il faut stimuler puissamment un organisme affaibli, incapable de revenir par lui-même à un meilleur état de nutrition. Très utile médication préparatoire à la cure de reminéralisation.

Posologie et mode d'emploi. — Diastogène élixir (forme la plus active et la plus agréable), légèrement alcoolisée. Adultes : 2 verres liqueur par jour, pur ou dans un peu d'eau.

Diastogène granulé (Dyspeptiques et Entérites).
Enfants : 2 ans : 1 cuill. à café p. jour ; 4 ans : 2 cuill. à café ; 8 ans : 3 cuill. à café ; 12 ans : 4 cuill. à café ; 16 ans et au-dessus : 6 cuill. à café par jour.

Diastogène comprimés (p. diabétiques) : 6 par jour.

N. B. — Toutes les formes de Diastogène Dehaussy se trouvent chez tous les grossistes ou les pharmaciens ; s'ils en sont momentanément dépourvus, ils peuvent se les procurer. Si néanmoins, le malade éprouvait la moindre difficulté, il lui suffirait de s'adresser directement aux **Laboratoires DEHAUSSY**, 44, rue Inkermann, à Lille, qui expédie immédiatement et sans frais.

Laboratoires E. DEHAUSSY

44, rue Inkermann, Lille (Nord)

DICALIODE

Iode Colloïdal Electrique

Médicament de choix pour l'administration de doses massives d'iode.

Composition et forme. — Suspension aqueuse d'un gel d'iode colloïdal, *sans aucune combinaison chimique*. Teneur en iode : quatre pour cent.

Indications. — Toutes celles de l'iode administré à l'intérieur : Affections pulmonaires, Tuberculose, Asthme, Emphysème, Coqueluche, Maladies de la peau, Mycoses, Goitre, Artériosclérose.

Avantages. — Absorption facile, sans troubles gastro-intestinaux, même à haute dose. On peut, en quelques jours, par doses progressives et fractionnées, donner 2 grammes d'iode par 24 heures ; pas d'iodisme, diffusion rapide dans l'organisme, élimination très marquée par la peau et les voies respiratoires.

Mode d'emploi. — Cure de 20 jours, repos de 8 à 10 jours, entre deux cures. 1 cc. le premier jour, augmenter progressivement et atteindre 5 à 10 cc. à partir de la seconde semaine (la dose maxima absorbée a été de 50 cc. par jour, pendant 3 jours, sans aucun inconvénient). Le meilleur véhicule est le lait frais (1 tasse pour 5 cc.). On peut employer aussi le vin rouge ou une tisane.

N. B. — Pour éviter l'amaigrissement des malades absorbant de fortes doses de Dicaliode, il y a lieu de les reminéraliser.

Conservation. — Parfaite en tenant le flacon bien bouché et renfermé dans la boîte.

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER,

1, Place Victor-Hugo

DIDIAL CIBA

Hypnotique-analgésique

Diallylmalonylurée et diallylmalonylurate d'éthylmorphine, chaque comprimé étant formé de 0 gr. 075 de Dial pur, plus 0 gr. 025 de diallylmalonylurate. Pouvoir narcotique plus prononcé que le Dial, et action nettement analgésique, d'où indication toutes les fois que l'insomnie est sous la dépendance de la douleur.

Indic. — Toutes les insomnies relevant de la douleur : névralgies, traumatismes, tabès, cancers, etc. Agitation maniaque, excitation psychique. Calmant pré et post-anesthésique.

Doses. — 1 à 3 comprimés à 0 gr. 10 par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie due à la douleur ; par doses refractées, aux repas dans les autres cas.

Le tube de 12 comprimés, 9 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

DIENOL

Indications. — Broncho-pneumonie. Pneumonie.

Composition. — Métaux colloïdaux, Fe Mn, obtenus par électrolyse.

Forme — Ampoules isotoniques de 10 cc.

Mode d'emploi. - *Adultes.* - Une ampoule par jour, en injection hypodermique.

Très jeunes enfants. — Une demi-ampoule de 10 cc. par jour (soit 5 cc). On peut aussi employer la voie rectale : le contenu d'une ampoule de 10 cc. additionné d'une quantité égale d'eau tiède est administré par voie rectale deux fois par jour. Mais l'injection hypodermique reste, cependant le moyen le plus rapide et le plus sûr.

J. DEPRUNEAUX, Pharmacien de 1^{re} Classe
18, Rue de Beaune & 31, Rue de Verneuil
— PARIS (VII^e) —

DIGALÈNE " ROCHE "

Digitale injectable

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

Posologie et Mode d'emploi :

Ampoules, Solution, Comprimés.

1 cc., ou XXX gouttes, ou 2 comprimés
= 0,15 cgr. poudre feuilles de digitale.

Doses très faibles ou d'entretien cardiotonique :

Adultes : XX gouttes. — Enfants : 1 à X gouttes (voies buccale ou rectale).

Doses faibles ou sédatives :

Adultes : XXX à LX gouttes (voies buccale ou rectale); 2 à 4 comprimés (voie buccale); 1 à 2 cc. (voie intramusculaire indolore). — Enfants : V à XV gouttes, selon l'âge.

Doses fortes ou antiasystoliques :

Adultes : XC à CLXXX gouttes (voies buccale ou rectale); 3 à 6 cc. (voies intramusculaire ou *endoveineuse*). — Enfants : V à XX gouttes et même 1 à 2 cc. (*cas désespérés*).

Prop. Thér. — Action très rapide, tolérance parfaite, pas d'accumulation.

Indic. Thér. — Chaque fois que le cœur faiblit.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque
Association digitaline-ouabaïne

Présentation et posologie. — 1° *Voie buccale.* — Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gttes = 1/10 millig. digitaline crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.

Doses faibles (cures prolongées d'entretien) X à XV gttes par jour.

Doses moyennes : XXX gttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).

Doses fortes : XL à L gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).

2° *Voie intraveineuse.* (Méthode exceptionnelle) : Ampoules titrées à XV gttes de solution par cc : lcc. p. injection et p. jour pendant 6 à 7 jours.

Indications. — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonicardiaques ont échoué.

Laboratoires DEGLAUDE

6, r. d'Assas, Paris (6°). Tél. : Fleur. 31-85

Belgique : Agent Général : L. PRUNIÈRES
19, rue Louis Nap. — BRUXELLES

DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant, sous une forme optimale, l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale. Stable, d'action constante, toujours bien tolérée, rigoureusement dosée.

Indic. — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules) et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

Posologie. — Celle de la poudre de feuille de digitale, à laquelle elle correspond poids pour poids.

Formes pharm. — Comprimés de 10 cgr. = 10 cgr. poudre de feuilles. — Ampoules de 1 cm³ = 10 cgr. poudre de feuille.

Le tube de 25 comprimés, 9 francs.

La boîte de 5 ampoules, 10 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

DIGIMIALBAÏNE

Composition :

L gouttes contiennent :
1/3 de mmgr. de digitaline,
2/3 de mmgr. d'ouabaïne.

Posologie :

Cardiotonique. — X à XV gouttes par 24 heures.

Sédatif. — XXX gouttes, 2 fois par 24 heures, pendant 7 jours.

Antisystolique. — XL à L gouttes, 2 fois par 24 heures, pendant 5 jours.

Pharmacie du docteur MIALHE
8, rue Favart — PARIS

DIGITALINE CRISTALLISÉE MIALHE-PETIT

La plus fidèle
de toutes les préparations de digitale.

Titrage chimique rigoureux.

1 cc. = 50 gouttes = 0.001 digitaline cristallisée

Effets thérapeutiques toujours identiques à eux-mêmes.

Effets physiologiques constants et contrôlés.

(Employée dans les hôpitaux depuis 1889).

Dose. — Cardiotonique : 3 à 4 gouttes par jour. — Sédatif : 5 à 10 gouttes. — Antisystolique jusqu'à 50 gouttes dans les 24 heures.

Pharmacie du Dr MIALHE
8, rue Favart — PARIS

DIGITALINE NATIVELLE CRISTALLISÉE

Prix Orfila — Prix Desportes

Décernés par l'Académie de Médecine de Paris.
La Digitaline Nativelle agit plus sûrement
que toutes les autres préparations de
Digitale. Elle est employée dans tous les
Hôpitaux de Paris.

Indications. — 1^o Asystolie; 2^o Insuffisance car-
diaque; 3^o Troubles du rythme cardiaque.

Formes. — *Granules* au 1/10 et au 1/4 de
mill. — *Solution* au 1/1000. — *Ampoules*
au 1/10 et au 1/4 de mill.

*Ampoules de Solution au millième pour injections intra-
veineuses.*

Spécifier sur les ordonnances : Granules,
Solutions ou Ampoules Nativelle

Echantillons :

Laboratoire NATIVELLE

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

DIORADIN

Combinaison radio-active
Médication antibacillaire

Composition. — Sels d'iode, camphre mentholé,
terpènes et Bromure de Radium.

Présentation. — Ampoules de 1 cc., 12 amp.

Propriétés. — Bactéricide, exaltant la phagocytose.

Indications. — Tuberculose sous toutes ses formes.
Tous états infectieux.

Mode d'emploi et doses. — En injections intra-
musculaires ou sous-cutanées, région supé-
rieure du bras et de préférence dans la
région musculaire des fesses. — On injec-
tera aux adultes une ampoule de 1 cc. et
aux enfants au-dessous de 10 ans 1/2 am-
poule de 1/2 cc. 30 injections quotidiennes
consécutives; continuer jusqu'à la 40^e, avec
1 injection tous les 2 jours. On peut recom-
mencer une seconde série après un inter-
valle de 15 jours à 3 semaines.

La boîte de 12 ampoules : 20 francs

Laboratoires CAILLAUD

25, r. Drouot, PARIS (9^e). — Tél.: Cent. 59-99

DIOSÉINE PRUNIER

(Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine).

Mode de Présentation. — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0,25 cgr.

Mode d'Action. — La "Dioséine Prunier" diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

Indications. — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

G. PRUNIER & C^{ie} (Maison Chassaing)

6, Rue de la Tâcherie — PARIS

R. C. Paris 53.818

DIURÈNE

(Extrait total d'adonis vernalis)

Formes. — Liquide. — Pilules.

Prop. Thér. — Tonique cardiaque et diurétique azoturique. Adjuvant inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

Indications. — Indiqué dans tous les cas d'arythmie, d'asystolie, d'œdème, dans toutes les affections du foie, néphrites, artério-sclérose.

Posologie. — 2 à 6 cuill. à café ou 4 à 12 pilules par 24 heures.

Laboratoires CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

DI UROÏODINE

Composition.

La « DI-UROÏODINE » ou iodo-éthylate d'hexaméthylène tétramine est une combinaison organique contenant 48 % d'urotropine rigoureusement titrée, associée au benzoate de lithine et à la formine libre.

Propriétés.

Action oxydante, stimulante, bactéricide et antitoxique.

Dissolvant de l'acide urique.

Pouvoir antiseptique remarquable sur le bacille d'Eberth, sur le colibacille, sur le streptocoque et le pneumocoque ; se retrouve après 40 minutes dans le liquide céphalo-rachidien.

Antipyrétique chez les bacillaires.

Indications.

Septicémies de tous genres : Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Fièvre typhoïde, Fièvres éruptives graves, Infections puerpérales, Arthrites infectieuses, Méningites, Erysipèle, Encéphalite épidémique et ses séquelles, Pyélonéphrites, etc...

Forme.

Ampoules de 3 cc 3/4.

Posologie.

Une à deux ampoules par jour, en injections intramusculaires ou mieux en injections intraveineuses.

(Une boîte est envoyée gracieusement à MM. les Docteurs qui en font la demande).

LABORATOIRE
de l'UROÏODINE

45, boulevard Lafayette
CALAIS

DOLOMA

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon

Composition. — Carbone-Fluorophosphate Magnésien-Manganoso-Calcique.

Formes. — Poudre et granulé.

Propriétés. — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

Indications. — Dyspepsies, Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences : *Cancer et Tuberculose*.

Cure antidyspeptique. — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillerées à café de granulé.

Cures reminéralisantes, simple ou intensive. — Voir fiche *Œnophos*.

DOLOMA INJECTABLE

Composition. — Citrophosphite Magnésien, Manganoso-calcique, Ampoules de 2 cc. et de 5 cc., sans toxiques. Injections hypodermiques indolores

Propriétés. — Névrossthénique idéal, Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales : Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

Indications. — Epuisement du système nerveux déminéralisation phospho-terreuse, Prétuberculose, Cancer, Prophylaxie de la récédive post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc., ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

Prix.

La boîte de poudre <i>Doloma</i>	9.50	Impôt compris
» granulé »	11 »	» » »
» 10 ampoules <i>Doloma</i>	11 »	» » »

Communications : à l'Académie de Médecine, avril 1918 ; à la Société française pour l'étude du cancer juin 1919 — décembre 1920 ; Concours médical, mars 1920 ; Journal des Praticiens, mai 1920, etc , etc.

Littérature et échantillons sur demande à

Laboratoires d'Etudes Biologiques

29, Place Bossuet — DIJON

DRAGÉES BENGUÉ AU MENTHOL

Composition. — Menthol-cocaïne et borate de soude ou menthol-boraté de soude (sans cocaïne).

Indications. — Affections de la gorge, pharyngites, laryngites, angines, faiblesse de la voix, antiseptie de la bouche.

Mode d'emploi. — 8 à 10 dragées par jour.
Laisser fondre dans la bouche.

Docteur BENGUÉ
pharmacien

16, rue Ballu. — PARIS (IX^e)

DRAGÉES ELKIN

Composition.

Pancréatine	}	à à P. E.
Bile		
Soufre électrolytique		

par pilule dragéifiée soluble dans l'estomac.

Indications. — Tous les cas où la digestion est troublée - Digestions lentes, pénibles - Ballonnements, somnolence après les repas - Dyspepsies nerveuses - Fermentations gastro-intestinales - Ulcères, cancer, névrose du pylore - Gastro-entérite.

Mode d'emploi.

Deux dragées après les repas suivies d'une infusion très chaude.

Laboratoires DEPRUNEAUX
18, Rue de Beaune, 18 — PARIS (VII^e)

DRAGÉES DU D^r GELINEAU

Composition :

Bromure de potassium associé à l'Arsenic et à la Picrotoxine.

Indications thérapeutiques :

Epilepsie. Affections nerveuses.

Posologie :

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoire J. MOUSNIER

à SCEAUX (Seine) près PARIS

DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer)

Propriétés. — Associent les qualités antispasmodiques du brome et l'action hématopoïétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication :

Calmer sans affaiblir,

Reconstituer sans exciter.

Indications. — Chloro-Anémie, Nervosisme.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de "Sirop").

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES "YSE"

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée) Nux vomica - Kola - Guarana

Indications et propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la Neurasthénie, *du surmenage intellectuel, de la dépression physique et cérébrale*, amnésie, des états adynamiques et asthéniques.

Mode d'emploi (sauf avis du médecin). — Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Laboratoire « YSE »

65, Rue Louis-Blanc — PARIS (x^e)

DRAGÉES TONI-CARDIAQUES LE BRUN

Composition.

Strophantus	0.01	pour une dragée
Spartéine	0.01	— —
Caféine	0.06	— —
Scille	0.01	— —

Prepr. therap. — Cardiotonique, sédatif de la dyspnée cardiaque. Régulatrices et renforçatrices, elles tonifient le myocarde et activent la diurèse.

Indications. — Insuffisance cardiaque. Asystolie. Maladies mitrales. Œdèmes cardiaques, Myocardites.

Posologie. — 4 à 6 dragées p. jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

Le flacon de 50 dragées: 8 fr.

LABORATOIRE LEBRUN

5, rue Hippolyte-Lebas, 5. — Paris

DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique Physiologique pur, extrait du porc vivant
Procédé du Docteur HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

Indications. — Hypopepsie, Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café avant chaque tétée ou prise d'aliments.

ADRESSER TOUTES DEMANDES :

Laboratoire de Physiologie du Puits d'Angle
LE PUITS D'ANGLE, LE CHESNAY (S.-&-O.)

Représentants pour la Belgique :

MM. COUTELIER, Frères
37, rue de Potter, 37. — BRUXELLES

ECZÉDA

(ZnO lehtyolosallieylé.)

Pâte sans corps gras, en tube d'environ 100 gr.; très adhésive, ne coule pas, ne tache pas.

Mode d'emploi. — Application matin et soir.

Prop: thérap. — Calme instantanément tous les prurits. Spécifique de toutes les affections entanées, qu'elle isole du contact de l'air.

Indications. — Eczéma, Impétigo, Prurit anal et vulvaire, Urticaire, etc.

G. BEYTOUT & L. CISTERNE

12, Boulevard Saint-Martin — PARIS

EDISTOL

Composition. — Acides borique, tartrique, citrique ; menthol, huile de Pinus sylv., gaulcol, terpinéol, cinéol, Styrax benz.

Indications. — Toutes affections et antiseptie des muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

Mode d'emploi. — *Gargarismes* et bains de gorge : 1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

Fumigations : 1 à 2 cuillerées à café par bol d'eau bouillante.

Vaporisations : 1 cuillerée à café dans le verre d'eau d'un pulvérisateur à vapeur.

Bain nasal : 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

LABORATOIRES Henri DUFOUR.

40, Rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret)

EDOVACCIN T. B.

Vaccin buccal antituberculeux

Principe actif. — Bacilles tuberculeux isolés des affections tuberculeuses les plus diverses et dégraissés par un procédé spécial breveté en France.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire, osseuse et autres.

Forme. — Flacon de 30 pilules.

Dose. — 1 à 3 pilules par jour.

Propriétés therap. — Après une réaction locale et générale, légère diminution et disparition de la Fièvre, des Sueurs, de la Toux, des Douleurs et de la Faiblesse, Augmentation du poids et des forces, Amélioration de l'appétit, du sommeil et de l'état général.

Echantillons sur demande

Institut de Microbiologie — Sarrebruck

EKTOGAN BOCQUILLON

Poudre composée à base de $Zn\ O^2$ traité, sans odeur ni couleur, se prêtant à toutes les formes de pansements.

Propriété. — Dégage d'une façon lente et continue de l'oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec un ferment ou un acide organique quelconque (sang, pus, transpiration, moiteur, salive, etc.).

Indications. — En chirurgie, Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie, Hygiène.

FORMES. — Poudre, pommade, Pâte, Emplâtre, Gazes, Mèches, Nez et Oreilles. Ektodrains.

Lab. des PEROXYDES MEDICINAUX

12-18, Rue Lamartine — PARIS

ÉLATINE BOUIN

Dérivé du sapin de Norwège (Gemme et Goudron)

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Doses et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuill. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. — 1 à 2 cuill. à café pour les enfants.

A titre préventif. — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuill. à dessert par verre de liquide.

Indic. thér. — Affections des bronches (toux rebelles, catarrhes, emphysème, asthme); de la vessie et des reins (cystites, pyélites, gravelle).

Laboratoires FAGARD

44, Rue d'Aguesseau - BOULOGNE-sur-Seine

Pharmacie Derneville, 66, Boulevard de Waterloo

BRUXELLES

ÉLIXIR DÉRET

Iodure double de Tanin et de Mercure

Solution vineuse titrée d'Iodure de Tanin et de Mercure en combinaison stable. Teneur en Iode de 0 gr.033 et en mercure 0 gr. 005 par cuillerée à soupe. Dépourvu d'arrière-goût métallique.

Prop. Thér. — Antisyphtilitique. — 1° Absence d'accidents d'hydrargyrisme, grâce à l'action spéciale du tanin. — 2° Innocuité sur les voies digestives jamais de diarrhée. Des faits cliniques montrent l'Elixir Déret souvent toléré par des malades qui ne pouvaient antérieurement supporter un autre traitement mercuriel.

Doses. — Adultes: 1 cuill. à soupe; Enfants: 1/2 à 1 cuill. à café; à prendre 2 fois par jour dans un verre gradué pour éviter le contact du médicament avec le métal de la cuillère. Ces doses peuvent être doublées.

Nota. — Aucune indication de la nature mercurielle de la préparation n'est faite sur l'étiquette ni sur l'enveloppe. L'Elixir Déret peut donc être pris aussi discrètement qu'on le désire.

Laboratoires GLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ÉLIXIR DUCRO

Préparation aromatique et sucrée, très agréable au goût, 20° alcool, contenant les principes des écorces d'oranges amères et 0,10 d'hypophosphite de soude par 15 gr. d'élixir.

Asthénie, Anorexie, Convalescences : Un verre à liqueur ou une cuiller à soupe, selon l'âge, pur ou étendu d'un peu d'eau, avant ou après le repas.

Pneumonie et maladies infectieuses adynamiques : Une cuiller à café ou à soupe, selon l'âge, toutes les heures.

Il exerce alors, plus et mieux que la potion de Todd, une action d'épargne très favorable aux malades.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS

ELIXIR EUPEPTIQUE TISY

Composition. — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

Avantages. — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.

Contient à l'état de pureté, tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

Indications therap. — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, athrepsie, vomissements.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur au comm. ou à la fin de chaque repas.

Laboratoire VAUDIN ET GUILLAUMIN
Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V. — PARIS.

ÉLIXIR du Dr MIALHE

Préparation. — Suc gastrique complet.
— Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années.
(*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où le suc gastrique fait défaut : Dyspepsies ; douleurs nerveuses ; digestions lentes et difficiles ; vomissements incoercibles de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à bouche immédiatement après le repas ; demi-dose pour les enfants.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

ÉLIXIR SPES

Iodure double d'Arsenic et de Mercure

Préparation moins alcoolique qu'un vin et physiologiquement assimilable au Sirop de Gibert.

Composition de l'Élixir. — Une cuillerée à soupe contenant exactement :

I ... 0,008)
 Hg... 0,006) correspondant à (0,01 Iodure Hg
 As ... 0,001) (0,005 Iodure As

Très agréable à prendre

Indications — Syphilis et Hérède-syphilis. Bien toléré son emploi n'occasionne ni hydrargyrose, ni stomatite, ni erythème, ni diarrhée.

Doses : Adultes . 2 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour, au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau.

Verre mesure gradué accompagnant le flacon

Observation importante. — Présenté comme tonique et modificateur, l'Élixir Spes ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure.

susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie Oto-Rhino-Laryngologie.

Prix : 10 fr (Impôt compris)

Docteur GUIRAUD Ex-Pharmacien des Hôpitaux

60, Cours d'Aquitaine — BORDEAUX

ÉLIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

(*Hamamelis et Capsicum*)

Remède Classique contre :

Accidents de la Ménopause, Varices
 (Congestions et Hémorragies), Varico-
 cèles, Hémorroïdes, Phlébites.

Un verre à liqueur après chaque repas.

Echantillons :

PHARMACIE MORIDE

20, rue de La Rochefoucauld — PARIS

EMBRYONINE DU D^r BARRÉ

Poudre d'embryons ou germes de blé

ALIMENT-REMEDE IDEAL, d'une richesse exceptionnelle en principes minéraux, vitamines de céréales (facteur A hydrosoluble et facteur B liposoluble) et autres substances minimales.

SPECIFIQUE DU RACHITISME et de toutes les maladies par carence. Indispensable à tous les enfants débilités, soit pure, soit mélangée au quart avec les farines infantiles commerciales pour en compenser la carence en vitamines.

PREVENTIF EFFICACE des complications bacillaires de la grossesse, de l'allaitement, ou des convalescences de maladies aiguës. Diminue le danger de cohabitation avec les tuberculeux ouverts.

BASE LA PLUS RATIONNELLE du traitement hygiénique-diététique dans toutes les tuberculoses internes et externes, de préférences aux produits carnés souvent mal supportés en raison de leurs toxines. Rend possible la cure à domicile des tuberculeux pauvres, la cure sanatoriale chronique étant définitivement à abandonner pour eux parce qu'elle ne fait que reculer l'issue fatale, d'après le Professeur Léon Bernard (Presse Médicale, 21 nov. 1922). — Double les bons effets du sanatorium, des stations maritimes, climatiques, ou d'altitude, et en maintient les heureux résultats.

DOSE ET MODE D'EMPLOI :

Adultes : 3 fortes cuillerées à café, trois fois par jour.

Enfants : 1 forte cuillerée à café par année d'âge et par jour. Délayer dans boissons chaudes : lait, thé, tilleul, café, etc.

Notice et échantillon franco sur demande

Usine EMBRYONINE BARRÉ

à Argentan (Orne)

EMPLATRES R. CAVAILLÈS

Caoutchoutés, adhésifs (formules de l'hôpital Saint-Louis). Dermatoses subaiguës et chroniques : Oxyde de zinc. Rouge de Vidal. Vigo. Huile de Cade. Ichtyol, etc.

Coloplastre pour pansements. Emplâtre caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc, en bobines de 1, 2, 3, 5 %, etc.

Coloplastre perforé, toutes dimensions.

Gaze anadhère. Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies. Simple. Baume du Pérou. Ichtyol. Sapolan.

Laboratoire R. CAVAILLÈS

34, rue de Turin — PARIS (8^e)

ENDOCALCASE

Médication spécifique de toutes les déminéralisations

COMPOSITION. — Sels insolubles de chaux, de manganèse, de fluor et de silice. *Poudre d'os frais.* Extraits secs de surrénale et de thymus. Rate. Foie.

PRÉSENTATION. — Granulé fondant.

PROP. THERAP. — L'addition de poudre d'os frais (aliments minéraux vitalisés) et de surrénale et de thymus (dont la déficience est une des causes déterminantes de la déminéralisation) aux sels de chaux, rendus assimilables selon la formule de Fournier, assure leur fixation rapide et définitive dans l'organisme.

INDICATIONS. — Tuberculose. Toutes les affections osseuses : troubles de la dentition, carie dentaire, rachitisme, consolidation de fractures. Retard de croissance. Grossesse. Surmenage. Débilité. Convalescences. Anémie. Neurasthénie. Lymphatisme. Blessés et Intoxiqués de guerre.

DOSES ET MODE D'EMPLOI. — Toujours au début des repas. Par jour : Adultes : 2 cuillères à café ; enfants : une cuillère à café.

LE GARREC, Pharmacien

74, Rue des Jacobins — AMIENS

ENERGÉTÈNES BYLA

Sucs purs de Plantes fraîches inaltérables,
Chimiquement dosés.

Physiologiquement titrés.

PRESCRIRE :

Valériane Byla, sédatif.

Marrons d'Inde Byla, toni-vasculaire.

Cassis Byla, antirhumatismal.

2 à 3 cuillerées à café par jour.

Aubépine Byla, régulateur cardiaque.

Genêt Byla, diurétique.

Gui Byla, vaso-dilatateur.

Muguet Byla, toni-cardiaque.

Sauge Byla, anhydrotique.

X à XXX gouttes 3 fois par jour

Colchique Byla, antigoutteux.

Digitale Byla, toni-cardiaque.

X à XXX gouttes par jour.

Les Etablissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire. Paris.

R. C. Seine 71895

ENÉSOL

Compos. — Salicylarsinate de mercure, à arsenic et mercure dissimulés. Renferme 33, 46 % de Hg métal, et 14 % de As sous forme dissimulée. Les solutions sont incolores et ne coagulent pas l'albumine.

Formes. — Ampoules de 3 cm³ et de 5 cm³ contenant 0 gr. 03 de salicylarsinate de mercure par cm³ correspondant à 0,0115 de Hg. métal et à 0,0043 de As métalloïde par cm³.

Prop. Thér. — Agent antisyphilitique (agissant à la fois par son arsenic et par son mercure). Action analeptique par l'arsenic.

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : Injection intra-musculaire d'une ampoule (cm³) par jour. Dose massive : Injection intra-musculaire ou intra-veineuse de 4 à 8 cm³ tous les 2 ou 3 jours.

Labaratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ENIODE LEFEBVRE

Composition. — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

Forme. — Comprimés kératinisés contenant chacun *Un Centigramme* d'iode en combinaison organique.

Prop. thérap. — L'*Eniode* possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'Iodisme.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour; *Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

Pharmacie GRIGNON

2, Rue Duphot — PARIS

ENTEROSEPTYL CLERAMBOURG

Composition :
 Phosphate de) Trinaphtyle P O — { $\begin{matrix} C^{10} H^7 O \\ C^{10} H^7 O \\ C^{10} H^7 O \end{matrix}$

Forme. — Comprimés.

Propriétés. — Poudre blanche, cristalline, inodore et sans saveur, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, fondant à 108°-110°.

Indic. thérap. — Toutes les fois que l'intestin est le siège de fermentations, qu'il s'agisse de *Diarrhée* ou de *Constipation*. Entéro colite muco-membraneuse. Entérite, Colite, Dyspepsie gastro intestinales. — Disparition des divers troubles provoqués par les autos-intoxications : ictère, Albuminurie hépatique, Eczéma et Dermatoses diverses. — Antiseptique de choix dans les localisations intestinales des diverses *Maladies infectieuses* : Fièvre typhoïde, Affections cholériformes.

Mode d'emploi — 2 à 4 comprimés par jour, à jeun ou 1 heure avant les repas.

Laboratoire CLÉRAMBOURG-DELONDRE

Fondé en 1898

4, Rue Tarbé — PARIS (17°)

ENTEROVACCIN LUMIÈRE

antitypho-colique polyvalent
contre les infections éberthiennes, coli-bacillaires
et paratyphiques.

Constitution. — Masse péruleuse constituée par des corps bacillaires (éberth, coli-bacille, paratyphique A et B) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants.

Indications. — L'Entérovacca antitypho-colique Lumière possède à la fois des propriétés immunisantes très actives, capables d'assurer une protection efficace contre les affections typhiques, paratyphiques et colibacillaires. Il agit également très efficacement comme vaccin curatif, en particulier chez les malades atteints de fièvre typhoïde. L'affection évolue alors très rapidement et de façon tout à fait anodine.

Mode d'emploi. — Administrer 4 pilules par jour, loin des repas.

Produits spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER, Pharmacien

9, cours de la Liberté — LYON

ENTÉROZONE

(Peroxydine) Voie buccale

Solution hydro-alcoolique (45° d'alcool) d'ozone stable à la température ordinaire (1/10 en vol.) à réaction très acide — Couleur ambrée — Saveur agréable.

Prop. théor. — Oxygène actif à l'état naissant. Double pouvoir : d'une part, Antiseptique intestinal et, partant, Antithermique ; d'autre part, Oxydant et Régénérateur des globules du sang.

Indic. théor. — Antisepsie des Voies digestives et des Voies respiratoires. Tous les états infectieux fébriles. Réconstituant. Régénération des globules sanguins.

Pesologie et dose. Adultes : 4 à 6 cuill. à café prises 2 par 2 dans un demi-verre d'eau sucrée, à température ordinaire, une demi-heure avant les repas. — Enfants : 1 à 3 cuill., suivant l'âge dans les mêmes conditions.

H. ROGIER

9, rue de la Terrasse — PARIS (17°)

EPARSÉNO

Préparation 132 du Docteur Pomaret

Base amino-arséno-phénol

Stabilisée en milieu organo-alcalin.

Traitement intra-musculaire de la Syphilis congénitale ou acquise, des Spirilloses et de la Lèpre.

Dosage spécial pour la médecine infantile.

Littérature franco sur demande

Les Établissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (3^e)

R. C. Paris 5386

EPIDOSINE GRÉMY

Association des stimulines animales et végétales et des substances endocriniennes qui déterminent et règlent la croissance : lobe antérieur de l'hypophyse, corps thyroïde, diastème testiculaire.

Rondelles de pâte de fruits.

Dose et mode d'emploi. — Une demi-rondelle à chaque repas.

Prop. thérap. — Régularise et stimule la croissance.

Indications. — Arrêts ou ralentissements de croissance, retard de l'intelligence, débilité motrice.

14, Rue de Clichy — PARIS (9^e)

ERANOL

Complexe colloïdal d'iode en solution isotonique.

L'Eranol ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caseine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode libre, non caustique, ni toxique, même aux doses thérapeutiques élevées.

Propriétés. — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente l'iode vitalisé, l'Eranol, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa faible teneur relative en iode (10 %_m) sa parfaite tolérance, son isotonie et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

Formes et Posologie. — 1^{re} Gouttes en flacons pour l'usage interne ;

2^{re} Ampoules de 1, de 2 et de 5 cc. pour injections intramusculaires ou intraveineuses.

Mode d'emploi. — **USAGE INTERNE :** *Gouttes.* Au moment des repas dans une boisson quelconque : eau, vin, etc.

Adultes : L gouttes jusqu'à C et plus, progressivement, par jour en deux fois.

Enfants : V gouttes par jour et par année d'âge.

Ampoules de 1, 2 et 5 cc. (non douloureuses). Une injection intra-musculaire tous les un, deux ou trois jours pendant 12 jours et repos 8 jours.

Usage externe. — En applications locales (ampoules de 5 cc.).

Laboratoire RATIÉ

45, Rue de l'Échiquier — PARIS

ERYTHROLUËS

du Docteur L. Lafay
adopté dans les Hôpitaux civils et milit.

Forme. — Ampoules de 1 et 2 cc.

Composition. — A base d'iodobismuthate de quinine bismuthé. De beaucoup la plus riche en métal.

L'ampoule de 2 cc contient:

Bismuth métal	0,16
Iode	0,16
Quinine alcaloïdique	0,10

Indications thérapeutiques :

Tous accidents syphilitiques.

Doses pour adultes :

Une ou deux injections intramusculaires par semaine.

Pharmacie L. LAFAY et F. FERRAND
54, Chaussée d'Antin, PARIS-IX^e

ESCULEOL

Composition. — Alcoolé concentré de Marron d'Inde frais et stabilisé.

Ind. et Prop. Action vaso-constrictive sur le système veineux périphérique et en particulier dans les cas d'hémorroïdes, varices, varicocèles, phlébites, stase veineuse, etc.

Supérieur aux préparat. médicinales parce que concentré, stable et d'action constante.

Mode d'emploi — Hémorroïdes: Administrer 2 fois p. j. dans l'intervalle des repas 15 gttes d'Esculéol dans un peu d'eau. Dans les cas rebelles, graduer la dose suivant l'intensité des douleurs, en augmentant de 5 gttes à chaque prise jusqu'à 40 à 50 gttes par jour. Varices, varicocèles, etc: toutes les fois que la médication devra être continuée pendant un certain temps administrer 15 gttes 2 fois p. j. dans l'intervalle des repas. 20 jours par mois.

Echantillons :

LABORATOIRE A. FOURIS
13, rue Lacharrière. — Paris-XI^e

EUCALCIUM

Reminéralisateur mangano-calcique.

Formule la plus active
de la médication récalcifiante

Forme. — Poudre, de goût agréable.

Composition. — Calcium, manganèse, magnésie, phosphate, silicate, fluorure.

Indications. — Débilité, Anémie, Tuberculoses, Grossesse, Allaitement, Rachitisme, Croissance, Scrofuleuse, Lymphatisme, Convalescence, Consolidation des fractures.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, à la fin des deux principaux repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café, de 5 à 10 ans; 1/4 de cuillerée à café au-dessous de 5 ans. Une pincée pour les tout petits enfants. Aucune contre-indication.

A. BASTIDE

Pharmacien de 1^{re} Classe.

50, boulevard de Paris — MARSEILLE

EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique Pulmonaire)

Composition. — Eucalyptol, 0,15 cgr.; Galaccol, 0,05 cgr.; Acide phénique, 0,02 cgr.; Camphre, 0,05 cg.; pour une ampoule de 1 cc le tout dans une décoction huileuse de plantes balsamiques calmantes, spécialement étudiée et rendant l'injection absolument indolore.

Formes. — Ampoules de 1 cc. — Capsules glutinisées.

Prop. thérap. — Antiseptique pulmonaire. Antioxygène. Antithermique. Sédatif de la toux. Diminue et facilite l'expectoration.

Indications. — Toutes les affections aiguës des voies respiratoires : Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculose, Gangrène pulmonaire. Maladies infectieuses.

Posologie et mode d'emploi. — Sous la forme capsules : 3 à 6 par jour 2 chaque repas. En injections sous-cutanées, Adultes : 1 à 3 ampoules de 1 cc. par jour. Enfants : de 5 à 12 ans $\frac{3}{4}$ de cc., 2 mois à 5 ans, $\frac{1}{2}$ de cc. Le flacon de 50 capsules : 6 francs. La boîte de 12 ampoules : 10 francs.

Laboratoire LEBRUN

5, Rue Hippolyte-Lebas, 5 — PARIS

EUCYTOL

Composition. — Combinaison d'extraits végétaux et de sels phospharsénieux organiques, 25 cc = 5 centigr. d'iode + 2 milligr. d'arsenic.

Forme. — Liquide à base de vins de liqueur.

Avantages et propriétés thérapeutiques. — Réminéralisateur et stimulant dans toutes les débâcles organiques.

Plus assimilable que l'huile de foie de morue et plus actif que les sirops iodotanniques.

Indications. — *Enfants* : Affections des os et de la nutrition. Affections des glandes et des voies respiratoires. États pré-tuberculeux et tuberculose sous toutes ses formes. Anémie et troubles nerveux.

Adultes : Convalescence de maladies infectieuses, affections des voies respiratoires, troubles de la circulation.

Fosologie — *Enfants* : de 2 à 5 ans, 2 cuillerées à soupe par jour; de 5 à 10 ans, 2 verres à liqueur par jour; de 10 à 15 ans, 3 à 4 verres à liqueur par jour.

Adultes : 1 à 2 verres à liqueur à chaque repas.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, Place Victor-Hugo — PARIS (16^e)

EUDYNOL

Médication dynamisante rationnelle

Compos. — Strychnine - Arsenic - Phosphore.

Formes therap. — Ampoules isotoniques-isovisqueuses.

Gouttes (solution titrée stabilisée).

Perlules, solubles dans l'intestin grêle.

L'Eudynol réunit les 3 éléments énergétiques : Strychnine, Arsenic, Phosphore, dans des proportions optima, déterminées par son efficacité sur le quotient respiratoire : $\frac{Co^2}{O^2}$

(Lire la Notice.)

Indic. therap. — Asthénies, Convalescences, Surmenages, Débilité, Anémies, etc.

Dépôt à LYON, 1, rue de la Martinière.

EUMICTINE

Indic. Thér. :

Antigonococcique, diurétique, antiseptique, etc.

Affections des voies urinaires :

Blennorrhagie, Urétrite, Cystite, Pyélite, Catarrhe, Prostatisme, etc.

Doses et Mode d'emploi :

Capsules enrobées au gluten pur, contenant chacune 0,20 Santalol, 0,05 Salol et 0,05 Hexaméthylène — Tétramine : 8 à 12 par jour aux repas, ce qui constitue un traitement complet des affections urogénitales et prostatiques.

Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

EUPHON

Sirop et Pastilles contre l'enrouement

Composition et forme. — Sirop à base d'extraits de plantes et de produits organiques : extrait fluide de coca I -|- Teinture rac. aconit 0.20 formiate sodique 5 -|- sirop écorce oranges amères 100.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

Indic. thér. et posol. — Entretien de la voix : 3 cuill. à café p. j. — Enrouements, picotements de la gorge : 3 cuill. à dess. p. j. — Aphonie, trachéite, laryngite (simple ou chronique) : 3 cuill. à potage p. j. — Ch. les enf. ne pas dépass. 3 cuill. à café p. j.

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo. — PARIS-XVI^e

EURONAL

Composition et Forme. — Comprimés.

Diéthylmalonylurée 0,15

Extrait de Valériane 0,10

Propriétés Thérap. — Analgésique et Antispasmodique, Hypnotique léger des surmenés et névropathes, Sédatif nerveux des excités et neurasthéniques.

Indications. — Insomnies rebelles et nerveuses, Epilepsie, Névralgies, Traumatismes, Toxicomanies.

Posologie. — *Dose sédatif* : Un comprimé avant chaque repas

Dose hypnotique : 2 ou 3 comprimés avant le repas du soir.

Laboratoires CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS 1er

EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée)

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Hypnotique, sédatif, antalgique.

Indications. — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation, Dyspepsie nerveuse.

Mode d'emploi et Dose :

Comme sédatif : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

Comme Hypnotique : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS

EUTENSYL GRÉMY

Traitement de l'hypertension artérielle

Formule. - Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

Corps thyroïde.....	0 gr. 02
Muscle cardiaque...	0 gr. 50
Parenchyme rénal..	0 gr. 50
Iodotyrosine	0 gr. 05
Scille.....	{ à à 0 gr. 05
Scammonée...	

pour une pilule.

Dose et mode d'emploi. - Deux à quatre pilules par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. - Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension. Athéromateux, Néphrite chronique hypertensive, Cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension mesurable au Sphygmomanomètre, et il compense cette hypotension en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

Le médecin peut associer à l'Eutensyl la digitale.

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e)


EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée
additionnée de glycérophosphates.

Indic. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques. Aliment des faibles, des délicats, des épuisés. Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes :* Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

 **Etablissements DÉJARDIN**
10, Rue Parent de Rosan — PARIS (16^e)

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

FACMINE LONGUET

Agent puissant et facilement maniable de Désinfection et désintoxication intestinales

Indications thérapeutiques. — Entérites glaireuses et muco-membraneuses; constipation chronique et toutes maladies et troubles fonctionnels reconnaissant pour cause

l'AUTO-INTOXICATION intestinale, principalement dans les maladies de la peau: Eczémas, Furunculoses, Acnés, Urticaires Herpès, etc...

Doses et mode d'emploi. — 3 à 4 comprimés après les repas du matin, de midi et du soir. Chaque comprimé correspond à 0 gr. 30 d'alumine lactique et 0 gr. 05 phosphate de chaux. Pour les enf.: $\frac{1}{2}$ dose.

Les comprimés peuvent être avalés à la façon d'une pilule ou délayés dans un peu d'eau.

LABORATOIRES P. LONGUET

34, rue Sedaine. — PARIS-XI*

FARINE LACTÉE HEUDEBERT

Compos. — La Farine Lactée HEUDEBERT est, à proprement parler, un composé homogène, où les matières grasses, les hydrates de carbone et les albuminoïdes se trouvent intimement associés.

Dose. — A partir de six mois, chez l'enfant normal, la dose moyenne est d'une cuillerée à soupe pour 150 gr. d'eau ou de lait. Dans les cas d'intolérance absolue du lait, elle peut être utilisée, dès les premiers mois, à raison d'une, puis de deux cuillerées à café par biberon.

Indicat. — A recommander aux enfants, aux mères qui allaitent, aux dyspeptiques affaiblis, aux convalescents et aux vieillards, seule ou additionnée de Nergine.

Ne pas faire, sans absolue nécessité, de la farine lactée, un aliment exclusif; varier l'alimentation avec toute la série des Farines de Céréales et de Légumineuses HEUDEBERT.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

FARINE Lactée SALVY

Composition. — *Produit français*, préparé en Normandie, le pays du bon lait, et contenant de la farine de céréales, du sucre et du lait.

Dose. — La dose moyenne pour un bébé de neuf mois est d'une cuillerée à soupe par tasse à café, d'eau ou de lait.

Propriétés. — Préparée spécialement pour les enfants. Facilement digestible et assimilable, même par les bébés les plus délicats.

Indications. — Alimentation parfaite des enfants pendant et après le sevrage. Egalement excellent aliment pour les malades, les convalescents et les vieillards.

Particularité. — La farine SALVY conserve indéfiniment toutes ses qualités.

SALVY & C^{ie}

20, Rue de Vienne — PARIS

FARINE de MALT HEUDEBERT

Compos. — La Farine de malt HEUDEBERT, produit de la mouture de l'orge germée, est à la fois riche en diastases et en vitamines.

Avantages. — Une bouillie bien maltée est à moitié digérée. La farine de malt doit être employée de préférence aux extraits liquides, pâteux ou secs, dont une partie importante des ferments est détruite pendant la fabrication.

Indicat. — Troubles de la nutrition et tous désordres du tube digestif amenant un ralentissement de l'assimilation des substances amylacées.

Mode d'emploi. — On peut en saupoudrer tous les aliments. Les bouillies ou purées, préparées avec une cuillerée à soupe de farine (de céréales ou de légumineuses), seront maltées, avec une cuillerée à café de farine de malt, 2 à 3 minutes après cuisson. Laisser un quart d'heure en contact et faire suivre d'une courte ébullition.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

FARINES MALTÉES JAMMET

Farines Maltées de céréales et de légumineuses, préparées avec des grains sélectionnés, moulus et blutés de manière à conserver l'intégralité des éléments minéraux combinés, céréalo-phosphates et vitamines.

Propriétés. — D'une digestibilité parfaite due aux diastases actives que la germination développe dans les grains, elles sont facilement assimilables, très nutritives et reconstituantes.

N'étant ni dextrinisées, ni torrifiées, ni stérilisées, elles conservent au maximum d'action leur pouvoir diastasique et leurs vitamines.

Leur diversité permet de varier l'alimentation de l'adulte astreint à un régime et d'offrir à l'enfant une alimentation rationnelle et progressive lui procurant tous les éléments nécessaires à son parfait développement.

Nomenclature. — D'après leur composition et leurs propriétés, on peut les classer en quatre catégories :

1° *Farines très légères* (enfants à partir du sixième mois).

Arrow-root, Crème de Sagose, Féculose, Rizine, Artisiose (à base de blé et d'avoine).

2° *Farines légères* (enfants à partir du onzième mois).

Cérémaltine (Arrow-root, blé, maïs, orge), *Cacaose, Orgéose, Gramenose* (avoine, blé, maïs, orge), *Bléose*.

3° *Farines plus substantielles* (enfants à partir du quinzième mois).

Avenose, Zéose, Castanose, Bananose, Seiglose.

4° *Farines très riches en matières azotées* (enfants à partir du dix-huitième mois).

Crème de pois, Aricose, Lentilose, Nucléose.

Indications. — Traitement diététique des malades convalescents, vieillards. Alimentation progressive et variée des enfants.

Mode d'emploi. — Elles se préparent au lait, au bouillon de céréales Jammet, de Légumocéréol, s'utilisent en bouillies, potages, purées, crèmes, gâteaux.

Etablissements JAMMET

POUILLARD et ses Fils

Docteurs en médecine et pharmaciens

47, rue de Miromesnil — PARIS (8°)

FELAMINE "SANDOZ"

Association de l'acide cholique cristallisé pur
et de l'Hexaméthylène-Tétramine

Forme. — Comprimés à 0 gr. 30.

Prop. thérap. — Opothérapie biliaire. Cholalogue, désinfectant des voies biliaires, dissolvant de la cholestérine.

Indications. — Cholélithiase et cholécystites, ictères, constipation par acholie.

Posologie. — Après les repas, avaler les tablettes sans les mâcher.

1° Cas aigus : 2 à 3 comprimés trois fois p. jour. — 2° Cas chroniques : 4 comprimés par jour.

Traitement : 15 jours par mois et pendant plusieurs mois de suite (cholélithiase).

Echantil. et Littér. : PRODUITS SANDOZ
3 et 5, rue de Metz. — Paris (10°)

Dépôt général et Vente :

USINE des PHARMACIENS de FRANCE
125, rue de Turenne. — Paris (3°)

FELARGENT

Argent colloïdal & Sels biliaires

12, 5 %.

87, 5 %.

Le FELARGENT associe heureusement l'effet bactéricide de l'argent colloïdal au pouvoir dissolvant et décapant des sels biliaires. Ces derniers étant de bons solvants des lipoides, du mucus et des produits organiques de toutes sortes, le FELARGENT constitue un antiseptique particulièrement recommandable en : OCULISTIQUE, GYNECOLOGIE, Traitement des blennorrhagies.

Non irritant, même en solutions très concentrées, le FELARGENT doit être préféré à tous les composés argentiques jusqu'alors employés.

Présentation. — Boîte de 5 tubes contenant chacun 0 gr. 50 de FELARGENT.

Flacon de 5 grammes.

Laboratoire des Produits
USINES DU RHONE

21, Rue Jean Goujon, 21 — PARIS (8°)

FERARSENYL Ch. GAUTIER

Comp. — Association de fer organique et arsène, sous forme de gouttes concentrées.

Prop. Thérap. — Préparation très stable, ne provoque jamais de constipation comme les préparations ferrugineuses habituelles. Possède toutes les propriétés thérapeutiques du fer et des arsènes.

Indications. — Chlorose-anémies essentielles, pernicieuse, palustre, post-hémorragique, des convalescents, etc...

Mode d'emploi. — *Adultes* : 15 gouttes dans un verre d'eau à chacun des principaux repas.

Enfants (de 3 à 15 ans) : 3 à 10 gouttes suivant l'âge.

Nourrissons (à partir de 4 mois) : 1 goutte par jour et par année d'âge.

Littérature et Echantillon :

Spécialités pharmaceutiques Ch. GAUTIER

13, rue Dorian - PARIS (12^e)

FER BRAVAIS

Oxychlorure de Fer liquide
en gouttes concentrées

Prop. thérap. — Attaqué par les acides du suc gastrique, passe dans le sang où il s'unit aux albuminoïdes pour former l'hémoglobine *naturelle* (véhicule de l'oxygène, ce grand nourricier de tous les tissus).

Dose. — X à XX gouttes (une goutte par année d'âge), à chaque repas, dans de l'eau sucrée.

Indications. — Appauvrissement du sang avec toutes ses conséquences : Anémie, chlorose, débilité, etc.

Prix : 11 fr. le grand flacon (1 mois environ).
7 fr. le 1/2 flacon (15 jours environ).

C^{te} René de GRAUWE 

Pharmacien de 1^{re} Classe

16, Rue de Rocroy — PARIS

FER LARCADE

Composition. — Combinaison d'hydrate ferrique et d'acide organique, associée aux principes toniques et aromatiques des oranges amères.

Forme. — Liqueur d'un goût agréable et d'une très faible teneur en alcool.

Action. — Favorise la formation des hématies, augmente leur richesse en hémoglobine.

Indications. — Spécifique de tous les états anémiques, des cachexies chroniques.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur (2 cuillérées à soupe) au commencement des deux repas.

Paul ROUX, 151, *Rue Lafayette* — PARIS

FER OVARINE VITALIS

Composition. — Pilules composées, à base d'extrait d'ovaire, de fer et de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Excitant de la sécrétion interne de l'ovaire déficient, régénérateur des globules rouges.

Indications. — Anémies, Puberté, Ménopause, Asthénie nerveuse, Obésité, Dysménorrhée.

*Echantillons et Notice documentaire
sur demande*

Laboratoire de la FER-OVARINE VITALIS,
38, *Boulevard de Charonne* — PARIS

BEAULIEU, pharmacien,
Ancien Interne des Hôpitaux

FÉROXAL BUISSON

Granulé de protoxalate de fer
(0 gr. 10 par cuillerée à café)
combiné à des phosphates alcalins.

Prop. thérap. — Hyperglobulise et minéralise.
Tolérance absolue par le tube digestif.
Action rapide et non constipante.

Indications. — Celles des ferrugineux et des phosphates : Anémies diverses, Prétuberculose, Chlorose, Anémie des jeunes enfants, Grossesse, Allaitement, Convalescence.

Dose. — Une à deux cuillerées à café à chaque repas.

Etablissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres — PARIS

R. C. Seine 147.023

FERROCODILE ET FERRICODILE

Caeodylate Ferreux - Cacodylate Ferrique

Indic. thérap. — Spécifiques de l'Anémie et de la Chlorose, Malaria, Anémie palustre, etc... Tous les avantages des sels ferreux et ceux de l'arsenic organique. Le Caeodylate Ferrique est le seul sel de fer agissant très bien en injections hypodermiques, qui, faites intra-musculaires, ne sont pas douloureuses.

Doses et Mode d'emploi. — *Ferrocodile* :
Pilules à 0.025 : 4 par jour aux repas.

Ferricodile : Ampoules à 0.01. Une injection par jour pendant huit jours; repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

Docteur M. LEPRINCE

62, rue de la Tour. — PARIS (16^e)

FERROCOL

Alginoïde de fer

Composition. — Complexe colloïdal de fer et d'acide alginoïde extrait de certaines variétés d'algues lamineuses des grands fonds marins.

Forme. — Comprimés dosés à 0 gr. 05 d'alginoïde de fer et 0 gr. 10 de Phosphates organo-calciques d'origine marine.

Propriétés thérap. — Supérieur à tous les ferrugineux connus grâce à sa parfaite assimilation même par les estomacs les plus faibles.

Le *Ferrocol* est le seul médicament ferrugineux qui ne constipe pas ; il maintient l'intestin en parfait équilibre fonctionnel. *Il ne noircit pas les dents.*

Indications. — Toutes les formes d'Anémie, la Chlorose, suite de Paludisme, etc.

Doses. — *Adultes* : Quatre comprimés dans la journée. *Enfants* : De un à quatre comprimés selon l'âge.

Pas de troubles gastro-intestinaux, aucune contre-indication.

Société Française d'Opothérapie

Laboratoires G. CHAMAGNE

58, rue Taitbout — PARIS

FERROPHYTINE CIBA

Phosphate de fer colloïdal

Sel ferrique neutre de l'acide inosito-phosphorique, contenant 7,50 % de fer et 6 % de phosphore, ces deux éléments sous forme très assimilable.

— Stimulant de l'hématopoïèse et excitant des fonctions cellulaires, la *Ferrophytine* est le médicament type des états anémiques et chloro-anémiques accompagnés de dénutrition.

Indic. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Sérofulose, Croissance défectueuse.

Médicament toujours bien toléré. (3 cachets, 2 cuillères granulés).

Doses. — *Adultes* : 1 gr. 50 par jour. *Enfants* : 0 gr. 25 à 1 gr. par jour.

La boîte de 30 cachets : 9 francs.

Le flacon de granulés : 11 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

FLORÉASES

POUDRES
GYNÉCOLOGIQUES
ANTISEPTIQUES

Les « FLORÉASES » répondent à sept formules différentes ; par leur emploi, on réalise, dans la pratique gynécologique, l'application de l'important principe de l'alternance des antiseptiques du professeur RICHET.

NE TACHENT PAS — N'IRRITENT PAS
ODEUR AGREABLE
DISSOLUTION RAPIDE ET COMPLETE

Echantillons gratuits

PHARMACIE RATIONNELLE

4, rue du Faubourg-Poissonnière. PARIS.

Si le " DICTIONNAIRE DE SPÉ-
CIALITÉS PHARMACEUTIQUES " vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialités à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

FLUDIOSE

à l'Iodure de Manganèse

Composition. — Iode; tanin, lactophosphate de chaux, fer, iodure de manganèse, méthylarsinate de soude, vanille et cacao.

Forme pharmaceutique. — Sirop de goût très agréable, infermentescible. Ne constipe pas.

Tous les enfants aiment la **FLUDIOSE**.

Indications. — Lymphatisme, Rachitisme, Prétuberculose, Scrofulose, Mal de Pott, Cyphose, Lordose, Scoliose, Chétivité, Troubles de la croissance, Paresse, Glandes, Ganglions, Impétigo, Engelures.

Mode d'emploi et doses. — En plus des autres éléments constitutifs, chaque cuillerée à café contient : 1 centig. 25 d'iodure de manganèse pur et 2 millig. de méthylarsinate de soude.

Enfants de 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

3 à 6 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

6 à 12 ans : 2 cuillerées à potage par jour.

12 à 16 ans : 3 cuillerées à potage par jour.

Se prend pure ou dans un peu d'eau, avant ou pendant les repas.

La **FLUDIOSE** est le plus puissant succédané de l'huile de foie de morue.

Par son iodure de manganèse, elle dépasse toutes les préparations iodotanniques.

Le flacon : 10 francs

Laboratoire de Médecine Expérimentale,
1 et 3, *Rue Malherbe* — BEAUVAIS (Oise)

FLUODYLE

Sérum fixo-tonie

Le Fluor est l'élément fixateur du phosphore pour la constitution du noyau cellulaire. (Arm. Gauthier.)

Forme. — Ampoules.

Composition. — Une ampoule renferme :

Fluorure de sodium	0,001
Hypophosphite de manganèse	0,001
Cacodylate de soude	0,15
Sulfate de strychnine	0,002
Sérum physiologique	2 cme

Indolore.

Indic. — Déminéralisation, convalescence, affections pulmonaires, anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, paludisme.

Mode d'emploi. — Pendant 10 jours consécutifs faire une injection sous-cutanée, se reposer pendant 10 jours et recommencer une nouvelle série de piqûres.

Etablissements SABATIER

A. EMPTOZ, Pharmacien

10, rue Pierre-Ducreux. — PARIS-XVI^e

FORCIVAL

Aliment complet nutritif et fortifiant

Composition. — Concentration des meilleurs aliments naturels : farines de céréales et de légumineuses maltées, lait, œufs, sucre, cacao. Aucun médicament surajouté.

Forme. — Farine d'un goût très agréable.

Mode d'emploi. — Bouillie délicieuse à l'eau ou au lait.

Propriétés. — Aliment léger et substantiel, reconstituant énergétique, reminéralisateur d'une grande digestibilité.

Indications. — Suralimentation chez les enfants, les adultes et les vieillards.

Préparateurs :

SALVY et C^{ie}

20, Rue du Vienne — PARIS

FORMADERMINE

(Ether méthylénique du Galacol)

Traitement spécifique des Plaies atones

Sous l'action de la FORMADERMINE, les plaies anciennes, grises, sans tendance à la cicatrisation, bourgeonnent rapidement et le processus de réparation se développe remarquablement.

La FORMADERMINE est, à la fois, un :
Antiseptique

Antiprurigineux

Analgésique

Epidermisant — Désodorisant

Principales indications. — Toutes plaies atones, brûlures, gelûres, ulcères variqueux, eschares sacrées, ulcérations par compression, dermatites fessières des nourrissons, etc...

(Thèse MALLEIN-GERIN, Paris 1923)

Présentée en flacons poudriers.

Laboratoires des Produits

USINES DU RHONE

21, rue Jean Goujon. — PARIS-VIII*

FORTOSSAN CIBA

Phytine spéciale pour les nourrissons

Sel sodique neutre de l'acide inosito-diphosphorique (principe phospho-organique végétal). Médicament phosphoré très assimilable, spécialement préparé pour la pratique infantile.

Indicat. — Rachitisme, ostéomalacie, retard du développement et de la dentition, scrofule et tuberculose infantile. Convalescence des maladies infectieuses, etc.

Doses. — Poudre s'administrant avec le lait du biberon ou les bouillies, à la dose de une à deux cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

La boîte 5 francs 50

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

FORMOCARBINE

Composition. — Association du *charbon animal pur*, ultra-divisé, *absolument privé de Cyanogène*, à la *Formine* (Hexaméthylène-tétramine cristallisée, urotropine).

Forme pharmaceutique. — *Granulé friable*, aromatisé, agréable au goût, avec ou sans addition de benzonaphtol :

Formocarbine simple.

Formocarbine naphtolée.

Les Granulés de **FORMOCARBINE** ne sont pas durs à la dent, fondent très bien dans la bouche, se désagrègent instantanément dans l'eau.

Indications thérapeutiques. — *Antiseptique interne de choix.*

Gastro-intestinal. — Dyspepsies, Fermentations, Entérites, Flatulences, Putréfactions intestinales, Stase intestinale, Auto-intoxication, Maladies infectieuses, Colibacillose.

Absorbe, en plein milieu intestinal, l'entérocoque, le colibacille.

Urinaire. — Toutes les Infections Urinaires, Rénales, Vésicales, Cystites, Pyélonéphrites, Urétérites, Prostatites.

Biliaire. — Désinfecte par la **Formine** la vésicule et les canaux en même temps que son charbon animal absorbe les bactéries intestinales montant au foie par la veine porte en ses diverses origines.

Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiase biliaire, Tuberculose des voies biliaires, Hépatisme.

Posologie. — 1 ou 2 cuillerées à café après les repas, à croquer ou délayer dans un peu d'eau.

Prescrire : Formocarbine simple ou Formocarbine naphtolée (1 flacon).

Laboratoire de Médecine Expérimentale,
BEAUVAIS (Oise)

*Echantillons et littérature
à la disposition de MM. les Docteurs*

FOSFOXYL CARRON

PHOSPHORE COLLOÏDAL

A l'état de térébentho phosphate sodique

Formes. — Fosfoxyl *liqueur* : Liquide opalin menthé, sans sucre ni alcool.

Fosfoxyl *sirop* : Sirop opalin anisé, goût agréable.

Fosfoxyl *pilules* : petits grains couleur de jade, très faciles à avaler.

Dosage. — 10 cm³ des formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en térébentho phosphate sodique et équivalent à un centigramme de phosphore blanc.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition et de l'assimilation. Apéritif, créateur d'énergie physique et mentale.

Indications. — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Dépressions nerveuses et mentales, Impuissance, Surmenage, Neurasthénie, Psychasthénies, Convalescence, Anémie, Tuberculose, Diabète, Rachitisme, Arthritisme, Rhumatisme, Maladies du système nerveux, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours. **Contre-indication** : Etat congestif aigu.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : une cuillerée à dessert (10 cm³) de liqueur ou sirop, étendu d'eau ou d'un liquide froid quelconque, ou 4 pilules, avant les deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la dose moyenne.

Prescrire FOSFOXYL CARRON

ou **SIROP DE FOSFOXYL CARRON**

ou **PILULES DE FOSFOXYL CARRON**

afin d'éviter les substitutions.

Laboratoire du FOSFOXYL

CARRON, Pharmacien de 1^{re} classe,

ancien Pharmacien de la Marine.

40, Rue Milton, PARIS (9^e)

FRANGULOSE FLACH

Traitement efficace de la Constipation.

Forme. — Comprimés à avaler.

Composition. — Principes actifs totaux du *Rhamnus Frangula* (Bourdaïne).

Indic. Thér. — Constipation, quelle qu'en soit la cause. — Sans contre-indication.

Mode d'emploi. — Au repas du soir.

Dose. — 1 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires FLACH

6, rue de la Cossonnerie, PARIS (1^{er})

FREINIX

Association Chlorh. de Papavérine et Adrénaline en solution isotonique (Ampoules de 1 cent. cube) pour injections sous-cutanées.

Propriétés thérap. — Freine le Pneumogastrique. Excite le Sympathique.

Indications. — Asthme, Emphysème, Rhume et Asthme des Foins. Spasmes viscéraux. Tous les phénomènes liés à l'hypervagotonie.

Mode d'emploi et Doses. — Une injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc. suffit à juguler une crise d'asthme en quelques minutes.

Le *Freinix* peut également être employé en pulvérisations nasales dans l'asthme des foins, en particulier.

Établissements Albert BUISSON
157, rue de Sèvres — PARIS (15^e)

R. C. Seine 147.023

FUCOBILINE

(comprimés)

le médicament du foie insuffisant

Composition. — Extrait biliaire dépigmenté et décholestériné, associé aux cholagogues végétaux et à l'agar-agar.

Forme. — Comprimés glutinisés et dragéifiés.

Posologie. — Avaler sans croquer 1 ou 2 comprimés à chaque repas (dose moyenne).

Indications. — Tous les cas d'insuffisance Hépatique et Biliaire, toutes les manifestations de l'Hépatisme.

LABORATOIRE L. PROTHIERE,
55, *Rue Auguste-Comte* — LYON

FUCOSINE

Traitement efficace de la Constipation habituelle

Compos. — Agar-agar, extrait de rhamnées.

Propriétés. — Mucilagineux, émollient, cholagogue; véritable aliment du constipé; innocuité absolue.

Formes et Posologie :

Paillettes. . . 1 à 3 cuillerées à café

Poudre. . . . 1 à 3 mesures

Cachets. . . . 1 à 3 cachets

à chaque repas régulièrement

Indications. — Constipation habituelle, quelle qu'en soit l'origine.

LABORATOIRE L. PROTHIERE,
55, *Rue Auguste-Comte* — LYON

FURONCULASE

Médication interne actuellement la plus efficace contre toutes les suppurations à staphylocoques dont elle empêche les récidives.

Composition. — Combinaison de chloro-lactate de potassium ferrique associée à une forte proportion de *coculus palmatus* (colombo). Pilules enrobées dans une mince enveloppe de gluten, de manière à assurer la désagrégation de la masse dans le milieu intestinal sans provoquer la moindre action irritante sur une portion quelconque du tube digestif.

Propriétés thérapeutiques. — Agit :
1° par une action spécifique sur le foie,
2° par son pouvoir oxygénant sur les globules en activant l'action phagocytaire. — 3° par une action nettement antiputride sur le tube digestif.

Indications. — Anthrax, Acnés, Orgelets, Abscess, Furoncles, Phlegmons, certaines Dermatoses, toutes les Staphylococcies et les diverses intoxications d'origine gastro-intestinale.

Posologie. — Dose journalière : Adultes, 6 pilules, 2 avant chaque repas; enfants, 2 à 3 pilules, 1 av. chaque rep.

Complément indispensable à la méthode des vaccins, la Furonculase ne présente aucune contre-indication : Elle ne contient ni sucre, ni alcool, ni produit toxique.

LABORATOIRE DALET

94, boulevard des Batignolles. Paris-17^e

GADEÏNOL LAFARGE

Composition. — Préparation liquide à base de bromo-gaiacolate de codéine.

Chaque capsule contient :

Codéine.	0 gr. 002
Bromoforme.	0 gr. 03
Camphr.	0 gr. 01
Gaiacol.	0 gr. 05
Terpinol.	0 gr. 03

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique. Spécifique des toux quinteuses. Antisepique de l'appareil respiratoire, Modificateur de la sécrétion bronchique.

Indications. — Catarrhe, bronchites, broncho-pneumonie et toutes les affections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — 6 à 8 capsules par jour, 2 avant chaque repas.

Le flacon : 6 francs.

Laboratoire LAFARGE

45, Boulevard Lefèvre. — PARIS

GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

Pastilles à l'Aldéhyde Formique

Prop. Thérap. — Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

Indications — 1° Prophylaxie des maladies infectieuses; 2° Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngites; 3° Hygiène de la voix.

Mode d'emploi. — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et, au besoin, toutes les heures ou 1/2 heures. La laisser fondre lentement dans la bouche.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

3, rue d'Edimbourg PARIS (8°)

124, Avenue Rogier, 124 BRUXELLES

GALYL

Spécifique de la Syphilis

Indications :

Syphilis, Fièvre récurrente, Pian, Maladie du sommeil.

Formes :

Ampoules p^r injections intraveineuses, injections intramusculaires et injections sous-cutanées.

Posologie :

Débuter avec 0 gr. 15 et passer progressivement à 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, suivant les malades.

Etablissements MOUNEYRAT

12, Rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

GAMBÉOL

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable, nouveau sel mercuriel.

Avantages. — Plus actif que tous les autres composés mercuriels, même que le calomel, beaucoup moins toxique ; toujours parfaitement toléré.

Par ses diverses présentations originales, répondant à toutes les voies d'introduction du mercure dans l'organisme, par l'absence de tout commentaire explicatif sur ses propriétés, permet les traitements dissimulés, d'épreuve ou d'entretien, en clientèle.

Est le produit curateur de choix des syphilis résiduelles de l'adulte, ainsi que des pathies, dystrophies, syndromes de l'enfance et de l'adolescence relevant d'une hérédo-spécificité ignorée ou méconnue.

Propriétés. — Se dissocie dès sa mise en contact avec les tissus, en mercure métallique et oxyde de mercure, à l'état colloïdal sans formation de sublimé, et s'élimine de façon parallèle, sans jamais donner lieu à des accidents d'intoxication par décharge brusque.

Indications. — a) Principales : Syphilis acquise ou héréditaire, de l'adulte et de l'enfant, à toutes les périodes, à tous les âges.
b) Secondaires : Toutes celles, internes et externes, du calomel à la vapeur.

Formes et posologie.

- | | |
|---|----------------|
| 1° Cachets à 1 centigr... | 2 ou 3 ch. j. |
| 2° Cartouches de pommade pour frictions à 50 % | 1 ch. jour. |
| 3° Suppositoires adultes à 10 cent.. | 1 ch. jour. |
| — enfants à 5 cent... | 1 ch. jour. |
| 4° Ampoules pour inject. intramusculaires à 5 cent. par cem.... | 1 cc. ch. sem. |

Laboratoires du GAMBÉOL

J. GAUTIER, , pharm. de 1re classe,

24, rue de Ponthieu. PARIS (8e)

R. C. Seine, 231.350. — Tél. Elysées 22-66,

GARDENAL

Phényl-éthyl-malonylurée

Poudre blanche, insipide, très peu soluble dans l'eau.

Indications. — Hypnotique et sédatif du système nerveux, spécialement indiqué dans l'*Épilepsie*, ainsi que dans la *Chorée*, les *Convulsions*, les états anxieux, certaines formes d'*asthme*, etc.

Mode d'emploi, Posologie. — Comprimés à 0 gr. 10, 0 gr. 05 et 0 gr. 01. Chez l'adulte, 1 à 4 comprimés à 0 gr. 10 par 24 heures. Chez l'enfant, doses réduites selon l'âge. Surveiller le traitement et éviter la suppression brusque du médicament.

Littérature sur demande.

Les Établissements POULENO Frères

86 et 92, rue Vieille-du-Temple — Paris (3^e)

R. C. Paris 5386

GASTROCALCINE

Forme. — Granulé.

Composition :

Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
Carbonate de magnésie....	0 gr. 20
Bi-carbonate de soude....	0 gr. 20
Sucre anisé, q. s. pour...	5 gr.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café, immédiatement après les principaux repas, ainsi qu'au moment des crises.

Indications. — Dyspepsies, Dilatations de l'estomac, Hyperchlorhydrie, Pyrosis.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} Classe de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

GASTRO-SODINE

Trois Formules — Trois Prescriptions

par C. à S.

1° Bicarb. de soude	2	{ chimiquement purs et desséchés
Phosph. de soude	1	
Sulfate de soude.	0.50	

Prescrire " GASTRO-SODINE "

2° Bicarb. de soude	2
Phosph. de soude	1
Sulfate de soude	0.50
Bromure de sodium.	0.25

Prescrire " GASTRO-SODINE " Formule B

3° Sulfate de soude	2	{ chimiquement purs et desséchés
Phosph. de soude	1	
Bicarb. de soude	0.50	

Prescrire " GASTRO-SODINE " Formule S

Forme unique. — Granulé soluble.

Dose. — 1 cuillerée à café, tous les matins à jeun dans un verre d'eau, de préférence chaude.

Indications. — Tous les états Gastro-Intestinaux et Hépatiques.

ODINOT, Pharmacien
21, rue Violet — PARIS

GAUROL

Nouveau sel phosphoré et calcique entièrement assimilable.

Formes. — Ampoules de 1 cc.

Comprimés solubles seulement dans l'intestin.

Prop. thérap. — Reconstituant, Recalcifiant intensif par autofixation dans les tissus du phosphate tricalcique naissant et colloïdal.

Indic. thérap. — Tous les états pathologiques médicaux et chirurgicaux, où l'amalgrissement et la déminéralisation très marqués demandent à être rapidement jugulés.

Mode d'emploi. — Une ampoule par jour, en injections sous-cutanées.

Suspendre le traitement pendant dix jours, après chaque série de douze injections.

Un à trois comprimés par jour, suivant l'âge.

Laboratoires PÉPIN & LEBOUCCQ

COURBEVOIE (Seine)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

Le " DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES " est devenu le pendant du " FORMULAIRE MAGISTRAL " sur le bureau du médecin.

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

GÉLOBARINE

(Sulfate de Baryum crémeux $\text{SO}_4 \text{Ba}$)

Produit destiné aux usages radiologiques.

L'absence absolue de toxicité de ce produit permet de l'employer en toute sécurité, soit par la méthode haute (repas ou bouillie), soit par la méthode basse (lavement).

La *Gélobarine* est délivrée sous notre cachet, en flacons contenant la dose nécessaire pour un examen.

Conditionnements spéciaux pour cabinets de radiologie.

Littérature sur demande.

Les Établissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

GÉLOGASTRINE

granulé ou comprimés

Granulé de gélose, gélatine et kaolin purifié.

Réalisation pratique de la thérapeutique par le *pansement gastrique*.

Dose moyenne. — 1/2 cuillerée à soupe ou 2 comprimés, une demi-heure avant les repas, le matin au lever, le soir au coucher, et, si nécessaire, au moment des crises douloureuses.

Hyperchlorhydrie, Ulcère de l'estomac.

LABORATOIRES LICARDY,

38, Boulevard Bourdon — PARIS-NEUILLY

GÉLOTANIN

Nature. — Tannate de gélatine. Poudre blanche inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, soluble dans l'intestin, en libérant progressivement du tanin et de la gélatine au cours de son cheminement.

Préparation. — Elle a fait l'objet d'une communication de M. Choay à la Société de Pharmacie de Paris (Séance du 6 juin 1917.)

Prop. therap. — Réunit les avantages des deux composants sans provoquer d'intolérance. (Professeur Marfan.)

Indications. — D'une façon générale, dans tous les cas de diarrhées.

Posologie. — 1° *Nourrissons et jeunes enfants* : Prescrire : Paquets de *Gélotanin*, une boîte. De 3 à 6 paquets de 0 g. 25 par jour, à répartir dans le lait ou dans aliments habituels. 2° *Adultes* : Prescrire Caquets de *Gélotanin*, une boîte. De 4 à 8 caquets de 0 gr. 50 par jour, à prendre aux repas.

Laboratoire CHOAY

48, Rue Théophile-Gautier — PARIS

Téléph. Anteuil 44-09

GENESERINE

Polonowski et Nitzberg. Salicylate de Gènesérine

Formes. — Granules et dragées au 1/2 mmg

Gouttes (Solution au millième), Ampoules.

Indications. — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Exaltant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

Mode d'emploi. — La dose moyenne est de six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses, contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours.

Laboratoires des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges

PARIS-IV^e

GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme et de Bergénite.
Non toxique — Goût agréable

Indications. — Spécifique contre la coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émétisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-bronchites, Pneumonie, Broncho-pneumonie. Gripes pulmonaires, etc., etc.

Propriétés. — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif. Combat efficacement l'infection.

Agit sur le symptôme Toux et sur l'affection qui le provoque. N'est pas toxique et n'a aucune action nuisible sur les fonctions digestives, propriétés précieuses qui permettent de prescrire directement la *Germose* aux nourrissons atteints de bronchites, de coqueluche, etc., etc., dans un peu de lait ou simplement dans de l'eau sucrée ou non.

Forme. — Gouttes concentrées : 1 gr. (46 gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé et 0 gr. 30 de Bergénite.

Doses habituelles dans les 24 heures. — Jusqu'à 1 an, 4 fois 10 gouttes ; de 1 à 3 ans, 8 fois 10 gouttes ; de 3 à 12 ans, 8 fois de 15 à 20 gouttes ; au-dessus, 8 fois de 25 à 30 gouttes. A prendre dans une ou deux cuillerées d'eau ordinaire ou sucrée ou un peu de tisane.

Nota. — Le médecin peut prescrire, sans inconvénient, la *Germose* à des doses plus élevées ; il doit même le faire si les résultats ne lui paraissent pas suffisamment rapides.

Dans tous les cas, les doses doivent être prises aussi régulièrement que possible, toutes les deux heures par exemple, sans tenir compte des accès de toux ou des quintes.

Aucune contre-indication

Laboratoire MOREAU

7, rue d'Hauteville, PARIS

GLOBUGENOL CHANAL

Médication

stimulante néophosphorée type

Composition. — Arrhénal, acide nucléique, vanadium, fluorure de calcium, glycéros, kola, sels de chaux assimilables, strychnine.

Formes. — Présenté sous quatre formes différentes (formules alternées).

Posologie.

Tubes	1	injection par jour	
Cachets	2	cachets	—
ELIXIR	2	gobelets	—
Granulé	2	mesures	—

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant énergétique, récalcifiant rationnel, rénovateur cytoplasmique, agent hématopoiétique puissant.

Indications. — Anémies, convalescence, états dépressifs, surmenage, asthénies diverses, neurasthénie, affections pulmonaires, chlorose, diabète, paludisme, phosphaturie, rachitisme, pré-tuberculose, suites opératoires obstétricales.

Observations. — Les cachets ne contenant pas d'arrhénal permettent une médication intercalaire récalcifiante et pratique, le cachet se déboitant facilement. Enfants : 1/2 dose.

Littérature et échantillons sur demande:

Laboratoires **COMTOS**

FESCHES LE CHATEL (Doubs)

GLOBULES FUMOUE

Iodure de Potassium.

Globules à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac, et à excipient résineux, graduellement soluble dans l'intestin, supprimant tous les phénomènes d'intolérance de l'estomac et de l'organisme.

Doses. — Les *Globules Fumoue* à l'iodure de potassium sont préparés sous deux formes :

Globules Fumoue KI, à 0 gr. 25 par globe.

Globules Fumoue KI, à 0 gr. 10 par globe.

Indications. — Les *Globules Fumoue* iodure de potassium sont prescrits dans toutes les maladies où l'emploi de l'iodure est indiqué.

Établissements FUMOUE

78, Faubourg Saint-Denis — PARIS

GLOBULES ROMON

Forme. — Globules glutinisées.

Compos. — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'Yohimbine et au phosphore de zinc pur.

Indications. — Traitement le plus rationnel de l'impuissance.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Observation. — La même formule existe également en ampoules : *Ampoules Romon*.

Laboratoires MONAL & C^{ie}

20, rue de Vienne — PARIS

GLYCÉROPHOSPHATE DALLOZ

Granulé dosé à 0,50 de Glycérophosphate de chaux, chimiquement pur, par cuillerée à café.

Indications. — Reconstituant minéralisateur. Tonique nervin. — Médicament des enfants; des mères pendant la période de l'allaitement; des déprimés.

Dose — 1 ou 2 cuillerées à café par jour, à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Laboratoire DALLOZ

13, Bd de la Chapelle — PARIS (10^e).

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,25 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,30 centigr. par cuillerée-mesure, Ampoules injections dosées à 0,10 centigr. par ampoule 1 c.c.

Doses et Mode d'emploi. — Granulé ou comprimés : 1 gr. par jour en 2 fois dans un peu d'eau; ampoules : 1 à 2 c. c. ou 3 fois par semaine.

Prop. Thér. — Réminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

Indications. — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

GLYCOBYL

Lavement à Base de Bile, amenant instantanément une selle.

Indications. — Constipation habituelle. Paresse et obstruction de l'intestin.

Dose et mode d'emploi. — Le *Glycobl* s'emploie en lavements à la dose de une ou deux cuillerées à soupe dans 150 grammes d'eau tiède pour adultes.

Une ou deux cuillerées à dessert dans 50 grammes d'eau pour les enfants.
Effet rapide et sans douleur.

Laboratoire des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, Place des Vosges — PARIS (iv^e)

GLYCO-LACTIMASE

Description. — Association symbiotique de bacille lactique Bulgare et de bacille glycobacter, en comprimés de 0 gr. 50, 40 comprimés par flacon.

Action Thér. — Le bacille glycobacter transforme les matières amylacées en sucres et fournit par conséquent un milieu de culture éminemment favorable au bacille lactique, dont l'activité se trouve ainsi considérablement renforcée.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour, dans les intoxications intestinales, diarrhées, entérites, affections du foie.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

GLYKOLAINE ROBIN

Association de la kola
aux glycérophosphates.

Granulé.

Dose et mode d'emploi :

1 à 2 cuill. à café par repas.

Indications :

Stimulant du système nerveux, Surmenage, Névralgies, Neurasthénie.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy

PARIS

GOBÉROL

Gobérol tarit Leucorrhées.

Présentat. — Poudre, comprimés et Ovule, chaq. comp. pèse 5 gr.

Compos. — Oxygène-Borate de soude mentholé pur (Perborate de soude, Biborate de soude, Menthol).

Prop. — Soluble instantanément dans l'eau chaude à 38°-40° en donnant une solution d'H² O² faible, mais à l'état naissant, alcaline et isotonique.

Avantages. — Pas d'intolérance. Ni toxique, ni corrosif, ni salissant, ni acide. Tous les avantages de l'H² O² sans en avoir les inconvénients. *Titre fixe, alcalinité, état naissant* qui donne une suractivité que le Professeur A. Robin évalue de 1 à 5.

Indic. — Injection alcaline, oxygénée, isotonique et analgésique. Toilette journalière, Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Vaginite, Prurit, etc.

Posologie. — Solution normale: une mesure ou un comprimé (pour un litre d'eau chaude à 38°-40°). — Solution forte: deux mesures ou deux comprimés (pour un litre d'eau chaude à 38°-40°).

A. CHARMAISON

Pharmacien de 1^{re} Classe de l'Université de Paris

35, Avenue de Royat — CLERMONT-FERRAND

GMET

(Produits Gmet)

Extraits végétaux, liquides concentrés
SANS ALCOOL, NI ACIDES, NI
ÉTHÉR, par un procédé spécial n'al-
térant pas la plante.

CORRESPONDENT tous à 2 gr. de
plante fraîche par cuillerée à café.

SE PRESCRIVENT tous : de 2 à 6
cuillerées à café par jour dans un
peu d'eau froide après ou entre les
repas.

BOLDO

COCA

COMPOSÉ

CONDURANGO

CRATÆGUS

FRÈNE

FUCUS

GUI

HAMAMELIS

HYDRASTIS

JUGLAND

KOLA

PISCIDIA

QUINQUINA

SAUGE

ULMAIRE

VALÉRIANE

VIBURNUM

EXTRAIT HAMYD
(HAMAMELIS-HYDRASTIS)

Littérature de chaque produit et échan-
tillon sur demande adressée à :

Laboratoires GMET

27, Faubourg Montmartre, PARIS (IX^e)

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens-Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques est devenu le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du médecin.

GOMENOL

Essence provenant d'une variété sélectionnée
de *Melaleuca viridiflora*.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, antientarrhal, désodorisant, hautement diffusible. Toxicité et causticité nulles.

Action thérapeutique et usages. — Préconisé, à l'intérieur, comme balsamique et antientarrhal. Convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires : Bronchites, bronchectasies, tuberculose. On le prescrit utilement dans l'urétrite et la cystite. — A l'extérieur, il est surtout employé en inhalations et pulvérisations dans le coryza, les laryngites, les bronchites, la coqueluche; en pansements chirurgicaux dans les cas de brûlures, plaies septiques, ulcères, furoncles, phlegmons; en pansements vaginaux dans les métrites. — L'OLÉO-GOMENOL à 3%, est un bon antiseptique nasal non irritant. — Sous forme d'OLÉO-GOMENOL, il est donné en injections intra-musculaires (tuberculose, infections généralisées) et intra-trachéales (laryngite tuberculeuse, bronchite fétide, tuberculose pulmonaire); en instillations intravésicales (cystites).

Laboratoire du GOMENOL

17, Rue Ambroise-Thomas — PARIS (9*)

GONACRINE

Chlorhydrate de diamino-méthyl-acridine

Pouvoir bactéricide remarquable, 600 fois
supérieur à celui du Protargol (Stowell).
Toxicité très faible.

Action profonde et persistante contre le
gonocoque. Injections vésicales et grands
lavages dans la blennorrhagie.

A été préconisé contre les séquelles de l'en-
céphalite léthargique, en injections intra-
veineuse (5 à 10 cc. d'une solution à 0.50 %).

Littérature sur demande.

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

GOSIERINE "DALLOZ"

Formule % :

Cocaïne	0,05
Menthol	0,40
Borate de soude...	4,00

Forme.

Dragées.

Propriétés. — Analgésiques, antiseptiques et antispasmodiques.

Action. — Antisepsie de la bouche et des voies respiratoires, soulagement immédiat et guérison des aphtes, gingivites, amygdalites, laryngites, angines, etc...

Doses. — 6 à 8 dragées par jour, pour les adultes.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle. Paris

GOUTTES FLUXINES

XX gouttes =

0,01 centigr. d'extraît de marron d'Inde.

IV gouttes d'alcoolat. concentré d'anémone.

IV gouttes de teinture de noix vomique.

en combinaison inaltérable.

Propriétés. — Vasoconstricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire, stimulant ovarien, sédatif utérin.

Indications. — Stases sanguines, inflammations de l'utérus et du bassin, inflammations veineuses : métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, hémorragies du retour d'âge, règles douloureuses, varices, hémorroïdes, phlébite, ulcères variqueux, etc.

Mode d'emploi. — Dix gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 2 à 3 fois par jour avant les repas.

J. BONTHOUX

pharmacien de 1^{re} classe

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône)

GOUTTES LIVONIENNES DE TROUETTE-PERRET

Capsules de goudron, créosote, baume de tolu.

Composition.— Chaque petite capsule renferme :

Créosote pure de bois de hêtre....	0 gr. 05
Goudron purifié de Norvège.....	0 gr. 075
Baume de tolu.....	0 gr. 075

Indications. — Rhumes, toux, bronchites, catarrhes, tuberculose, maladies des voies respiratoires, antiseptic des voies digestives.

Le meilleur moyen de faire tolérer la créosote.
Médicament préventif et curatif.

Dose et Mode d'emploi.— 4 à 8 Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret par jour au milieu des repas.

Bien spécifier : GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET, pour éviter les contrefaçons.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles-Industriels, 15
PARIS (11^e)

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

GOUTTES NICAN

(sans sucre)

Composition. — Bromoforme et codéine purs, Aconit, belladone, drosera, grindella, benzoate de soude, eau de laurier-cerise.
(4 gouttes = 1 goutte de Bromoforme stabilisé).

Caractéristiques. — Effet rapide et persistant, souvent surprenant. Tolérance parfaite. Pas de contre-indications.

Incompatibilité. — Tabac dont l'usage retarde la guérison.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif, décongestif, antispasmodique très puissant et fidèle.

Posologie. — A absorber loin des repas, dans de l'eau, du grog ou du lait tièdes qu'on agitera en y ajoutant les gouttes.

1° Toux des tuberculeux. — (Calme et repos immédiats).

Grippe. — Toux spasmodique, asthme, rhume des foins, etc. (Succès immédiat, jugulation complète en quelques jours, souvent en quelques heures).

Doses initiales. — Adultes, 240 gouttes.

Enfants, 24 gouttes par année.

A prendre en 4 fois dans les 24 heures.

Diminuer progressivement après effet.

2° Coqueluche. — (Amélioration immédiate, jugulation complète en moins de 15 jours).

Doses initiales. — Adultes, 120 gouttes.

Enfants, 12 gouttes par année.

A prendre en 4 fois, après une quinte. Augmenter progressivement tous les jours de 1 goutte par année, jusqu'à effet. (La dose initiale devra ainsi être doublée le 12^e jour au plus tard.)

N. B. — En cas de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, excessivement rares, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si c'est nécessaire.

Se méfier des contrefaçons

Echantillons et Littérature

Laboratoires CANTIN

PALaiseau (S.-et-O.) France

GOUTTES SCANDINAVES

à l'essence de sève de pin, au gaiacol,
au goudron pur, à la codéine

Forme. — En capsules gélatineuses
légères et très digestes. *Plus de
30 ans de pratique et de succès.*

Propriétés. — Antisepsie des voies
respiratoires par l'essence de sève
de pin.

Calmant idéal de la toux par la
Codéine.

Indications. — Toux, rhumes, bronchites à
toutes les périodes, catarrhes, emphysème,
tuberculose chronique.

Dose. — 6 à 8 capsules par jour, dont
3 à 4 avant chaque repas.

Laboratoire du D^r H. PHILIPPE

14, Rue du Palais-Grillet — LYON

GOUTTES DE SERÛ

Extrait total et concentré de galbules
de cupressus sempervirens.

Indications. — Vaso-constricteur et toni-
que puissant du système veineux. —
Spécifique *efficace sûr et constant* des
varices, ulcères variqueux, périphlé-
bites, hémorroïdes, varicocèles et des
troubles de la ménopause.

Dose moyenne. — 30 gouttes avant cha-
cun des deux principaux repas.

LETTRY

69, Rue de Sèvres — PARIS

GRAINS DE VALS

Podophyllin 0,015

Cascara et Bourdaine (extr.) aa 0,025

Dose et Mode d'emploi :

1 à 2 le soir au repas.

Prop. Thér. :

Laxatif, régulateur de l'intestin, ne donnant pas de coliques.

Indications :

Constipation, embarras gastrique.

Pas de contre-indications.

Laboratoire H. NOGUÈS

11, Rue Joseph-Bara — PARIS (6^e)

GRANULÉ CARESMEL

Produit contenant le phosphore sous forme végétale, saturé de chaux et de magnésie, associé au carbonate de chaux fluoré et à l'oxyde de magnésium dans les proportions les plus aptes et les plus utiles à la formation du squelette et à la constitution de la cellule nerveuse.

Propriétés thérapeutiques. - D'une assimilation parfaite, stimulant des échanges nutritifs c'est un puissant reconstituant et reminéralisateur indiqué dans tous les cas de faiblesse constitutionnelle, neurasthénie, névroses, etc. ou dans les maladies amenant l'épuisement: anémie, rachitisme, pré tuberculose, tuberculose, etc.

Doses : Adultes : 1 cuillerée à café à chaque repas.

Enfants : 1/2 — — —

Le flacon 10 francs

Echantillons :

Laboratoires CARESMEL

5 et 7, Rue Henry-Gréville — ANGERS

GRANULES MINERAL-SULFUREUX CROSNIER

*Au Monosulfure de Sodium inaltérable
et Goudron*

Commodité d'emploi, assimilation parfaite.

Indicat. therap. — Celles du **SIROP CROSNIER** et des Eaux sulfureuses; affec. subaig. ou chron. des voies respiratoires. Laryngites, Lymphatisme, Dermatoses, etc.

Posologie. — (2 granules, 1 cuil. à soupe de Sirop).

Adultes : 4 à 6 granules par jour.

Enfants de 7 à 14 ans : 1 à 4 gran. par jour.

LABORATOIRE CROSNIER

6, Rue Chanoinesse — PARIS

GRIPPOL

Vaccin buccal antigrippal

Principe actif. — Différentes souches de microbes isolés du sang d'un grand nombre de malades atteints de Grippe et Influenza. Les microbes sont soigneusement stérilisés et dégraissés par un procédé spécial breveté en France.

Indicat. — Refroidissements, Rhume, Coryza, Grippe, Influenza et leurs complications.

Forme. — Flacon de 30 pilules.

Dose. — 1 à 3 pilules toutes les 2 heures.

Propriétés therap. — Pris à temps, dès l'apparition des premiers symptômes, il empêche le développement de la maladie; plus tard, fait disparaître tous les symptômes de la maladie en quelques jours.

Echantillons sur demande

Institut de Microbiologie — Sarrebruck

GUIPSINE

Principes utiles du Gui

Indic. Thér. :

Régulateur du travail du cœur.

Médication hypotensive. — Hypertension, Artério-sclérose, Hémoptysie, Goutte, Troubles de la Ménopause, (Spécifique), Néphro-sclérose, Prostatisme.

Doses et Mode d'emploi :

Pilules à 0,05 : 4 à 10 par jour entre les repas.

Ampoules à 0,05 : 1 ou 2 injections par jour.

Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

GYNERGÈNE SANDOZ

Compos. — Tartrate de l'Ergotamine cristallisée ($C^{22} H^{21} N^2 O^5$), principal alcaloïde isolé de l'ergot de seigle et principe actif spécifique. Produit pur, exactement dosable.

Forme. — Ampoules : 1 cc de solution contenant 0gr.0005 de tartrate d'ergotamine, pour injection intramusculaire. Solution : 0,1 % p. usage interne. Comprimés : 1 mgr. de tartrate d'ergotamine.

Prop. thér. — Le Gynergène Sandoz est le plus puissant des hémostatiques utérins. Effets constants.

Indic. — Toutes hémorragies utérines. Atonie de l'utérus. *

Posol. — 1/2 à 1 amp. par jour et plus selon les nécessités. ; 15 à 20 gouttes ou 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

Echantil. et Littér. : **PRODUITS SANDOZ**
3 et 5, rue de Metz. — Paris (10^e)

Dépôt général et Vente :

USINE des PHARMACIENS de FRANCE
125, rue de Turenne. — Paris (3^e)

GYNOPAUSINE

Composition. — Association pluriglandulaire (thyroïde, hypophyse, ovaires) à un nouveau sel de Benzyle, le Sedobenzyl ($C_6H_5CH_2SO_3K$) antispasmodique et hypotenseur.

Propriétés Thérapeutiques. — Le Sedobenzyl ($C_6H_5CH_2SO_3K$) est un nouveau sel de benzyle, c'est un produit stable, très soluble dans l'eau, non toxique aux doses habituelles, qui s'élimine aisément et qui peut être employé sans danger pendant un temps prolongé. Il a surtout une action antispasmodique, aussi a-t-il une action sédatrice dans les règles douloureuses, les coliques utérines et les douleurs de la métrite aiguë ou chronique.

Indications. — Insuffisance ovarienne, troubles de la ménopause et de la puberté, coliques salpingiennes ou utérines, dysménorrhée.

Dose et Mode d'emploi — 2 cachets ou 4 comprimés par jour avant les repas. Il est possible de prescrire, dans certains cas, 3 et même 4 cachets par jour, avant les repas. Le traitement doit être suivi de préférence dans les 8 à 10 jours qui précèdent l'époque des règles.

Prix : 10 francs.

LABORATOIRE DE L'OPOCALCIUM

RANSON, DOCTEUR EN PHARMACIE

121, Avenue Gambetta, 121 - PARIS (20^e)

HAMAMELINE ROYA

Principe actif aromatique de l'Hamamélis virginica en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en dilution convenable (20 cgr. p. cuil. soupe) l'Huile Essentielle aromatique, véritable principe actif de la plante, à l'exclusion de l'extractif, inerte au point de vue vasculaire.

Propriétés. — Vasoconstricteur. Tonique des fibres lisses. Sédatif vasculaire. Stimulant circulatoire.

Indications. — Toutes les dilatations, congestions et inflammations veineuses : Varices, varicocèles, hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes. — Troubles circulatoires utérins : Ménorragies, Dysménorrhée, Accidents congestifs de la Ménopause.

Doses. — Par cuil. à soupe, 2 à 4 p. jour, aux repas ou en dehors des repas.

Pierre ALEXANDRE, pharmacien

41, rue de Rome, — Paris.

HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'Hamamelis virginica.

Indications. — Maladies du système vasculaire, Varices, Hémorroïdes, Troubles de la Ménopause.

1° **Gouttes concentrées** renfermant 0 gr. 04 d'iode métal. pour 1 goutte d'extrait représentant son propre poids de plante.

De XXX à XL gouttes par 24 heures.

2° **Elixir** (Préparation très agréable au goût). Deux à trois cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} Classe,
de l'Ecole Supérieure de Paris
17, rue Cadet — PARIS

HECTARGYRE

Spécifique de la Syphilis

Indications. — Syphilis, Paludisme.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes.* — 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou 40 gouttes par jour pendant les 4 premiers jours; ensuite 60 à 80 gouttes pendant 15 jours.
Enfants. — Moitié doses.

Etablissements MOUNEYRAT

12, Rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
: près Saint-Denis (Seine)

HECTINE

Spécifique de la Syphilis
et succédané du cacodylate de soude

Indicat. — Syphilis, Paludisme, Fièvre
des Foins, Tuberculose, Anémie.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B,
Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes* : 15 ampoules pour
une cure ou 2 pilules par jour pendant
15 jours, ou 60 gouttes par jour les 4
premiers jours, ensuite 80 gouttes
pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Etablissements MOUNEYRAT

12, Rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

HÉLITAL

Médication dynamisante et régénératrice

Composition :

Arrhénal.	{ chimiquement purs
Nucléinate disodique	
Excipient spécial	

Forme. — Dragées d'un goût exquis.

Propriétés. — Reconstituant énergique. Régéné-
rateur physiologique normal de la cellule orga-
nique.

Action. — Sûre et rapide et facilement réglable,
grâce à une posologie nettement déterminée,
qui donne immédiatement : *Appétit, Force,*
Poids.

Indications. — Anémie, Convalescence, Dépres-
sion, Surmenage, Toutes fatigues, Neurasthé-
nie, Tuberculose.

Doses. — de 2 à 6 dragées par jour aux adultes.
de 1 à 3 dragées par jour aux enfants.

Laboratoire de l'HÉLITAL

Directeur : L. SIMON, Docteur en Pharmacie
15-17, place Nationale — DIEPPE (S.-Inf.)

HEMAGÈNE TAILLEUR

EMMÉNAGOGUE

Composition.

Dragées à base de pétroséline (Extrait de pétrosélinum sativum) associée au menthol. Corps cristallisé, pur, bien défini.

Formes.

Petit flacon de 12 dragées : 4 fr. 50.

Grand flacon de 30 dragées : 7 fr. 50

Propriétés thérapeutiques.

Calme les douleurs les plus vives de la Dysménorrhée et les coliques post-partum.

Action rapide, sûre et durable.

Innocuité absolue.

Forme agréable.

Indications et Posologie.

DYSMENORRHÉE :

Deux dragées dès l'apparition des douleurs.

Deux autres 1/2 heure après. Maximum 10 dragées par jour, de demi-heure en demi-heure.

AMENORRHÉE :

Accidentelle : 2 dragées d'heure en h., jusqu'à 10 par jour.

De causes générales : 2 dragées le matin et 2 le soir pendant 8 jours aux époques présumées.

Ménopause : 4 dragées par jour (2 à chaque repas) au moment des douleurs.

Dystocie : 2 dragées d'h. en h. (4 à 6 calment la douleur).

Coliques post-partum : 2 dragées d'heure en heure jusqu'à cessation des douleurs (à renouveler au besoin).

LABORATOIRE SEVENET

55, Rue Pajol, 55

P A R I S - X V I I I °

HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsénicale
phosphorée-strychnique

Doses et mode d'emploi. — Doses ascendantes et descendantes indiquées sur chaque flacon.

Prop. théér. — Lymphatisme, Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences.

Tonique puissant, antiscrofuleux

Eugène PETIT

Pharmacien de 1^{re} Classe

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

HÉMO - CYTO - SÉRUM CORBIÈRE

Composition.

<i>Fer colloidal.</i>	<i>Un centigram.</i>
<i>Cocodiglate de soude chimiquement pur</i> . .	<i>Trente centigr.</i>
<i>Sulfate de strychnine</i>	<i>Un milligram.</i>
<i>Sérum chloruré isotonisant</i>	<i>Cinq centilab.</i>

Mode d'emploi. — Une injection intra-musculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, accroît la valeur globulaire et suractive les échanges nutritifs.

Indications. — Anémies de toute origine, consécutives aux hémorragies diverses. Convalescences. Chlorose. Ictères hémolytiques. Surmenage Troubles de la croissance et la puberté.

Présentation. — Hém-Cyto-Sérum pour adultes 12 ampoules de 5 centilabes.

Hém-Cyto-Sérum infantile 12 ampoules de 2 centilabes.

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes - PARIS - Tél.: Wagram 37-64

HEMODROME

(*Berberis vulgaris*. *Thlaspi*)

Forme.

Extrait fluide à prendre en gouttes.

Avantages.

Action supérieure à l'hamamelis et similaires. Assimilation plus rapide sous sa forme liquide que les produits présentés en pilules ou comprimés.

Indications.

Varices. Hémorroïdes. Troubles de la ménopause. Règles irrégulières. Phlébite.

Posologie.

15 à 20 gouttes trois ou quatre fois par jour dans un peu d'eau.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III. — PARIS

HEMODUCTYL

Pilules ou Solution

Hamamélis, cupressus, marron d'Inde, gui et aubépine, associés au boldo et condurango.

Dose moyenne. — *Pilules* : 2, matin et soir, avant les repas.

Solution : 3 cuillerées à café par jour.

Indications. — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension.

LABORATOIRES LICARDY,

38, Boulevard Bourdon — PARIS-NEUILLY

HÉMOFIXINE BRANCHU

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Nueléinate de manganèse, Lécithine de l'œuf, Oxyhémoglobine, Méthylarsinate de soude, Quassine, Zymases.

Propriétés therap. — Reconstituant, Régénérateur des globules sanguins et des éléments protoplasmiques.

Indications. — Etats anémiques, Chlorose, Convalescences, Surmenage intellectuel et physique, Neurasthénie, Phosphaturie, Diabète, Bacilliose.

Posologie :

Adolescents	{	1 comprimé à midi	}	au milieu des repas.
		1 — le soir		
Adultes	{	2 comprimés à midi	}	
		2 — le soir		

Pendant 20 jours par mois. Se reposer 10 jours avant de reprendre le traitement.

Laboratoires BRANCHU

4, rue Beaurepaire — PARIS (10*)

Le " DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES " est devenu le pendant du " FORMULAIRE MAGISTRAL " sur le bureau du médecin.

HEMOGLOBINE DESCHIENS

OPOTHERAPIE HEMATIQUE TOTALE

Médication rationnelle des
syndrômes anémiques

Nature. — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine contient :

- 1^o Une hémoglobine vivante, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
- 2^o Les substances minimales globulaires intactes ;
- 3^o Les substances minimales du plasma (Hémopoïétines, cytopoïétines) non altérées.

Ces éléments sont incorporés à un excipient dosé avec soin, sorte de sérum aseptique où leur vitalité persiste.

Action.

- 1^o Apport d'hémoglobine vivante (fer globulaire).
- 2^o Stimulation prudente des organes hémopoïétiques (Hémocytopoïétines).
- 3^o Puissante action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmatiques.

Indications.

Anémies.
Chlorose.
Déchéances organiques,
Tuberculose.
Convalescences.
Grossesses.
Suites de couches.
Paludisme.

Posologie.

Une cuillerée à potage au début ou à la fin
des 2 principaux repas.
Doublér dans les cas graves.
Pas de contre-indications.

Littérature. Echantillons

DESCHIENS

Docteur en Pharmacie

9, rue Paul-Baudry PARIS-VIII^e

HÉMOSTYL du D^r ROUSSEL

Agent d'hématopoïèse

(Voir en outre page suivante 196)

Sérum *hémopoïétique* frais de cheval, c'est-à-dire recueilli sur un animal mis, par une saignée préalable, en pleine crise de régénération hémattique.

Action. — 1° Hématopoïétique spécifique (Prof. Carnot, Acad. des Sciences 1906); 2° Tous les autres emplois du sérum de cheval : Hémostatique, Hyperleucocytaire général et local.

Formes pharm. — 1° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. de sérum pur; 2° Boîte de 45 comprimés de Sang hémopoïétique total desséché; 3° Flacon de trois cents grammes de Sirop de Sang hémopoïétique total liquide. 4° Ovules.

Prix en France : 11 fr. 50 (Ampoules)
10 fr. 50 (Sirop, Comprimés et Ovules)

Indications et posologie dans les Anémies. — Toutes les Anémies, quelle qu'en soit la nature : Convalescences, Tuberculose, Paludisme, Suites opératoires et Obstétricales, etc.

Mode d'emploi. — Un ou deux flacons-ampoules de 10 cc. par jour, en ingestion ou lavement, ou 6 à 8 comprimés, ou 2 à 3 cuillerées à potage de Sirop.

Littérature et Echantillons :

Laboratoire de l'HÉMOSTYL

21, Rue d'Aumale — PARIS (IX^e)

Téléphone : Trudaine 66-41

HÉMOSTYL du D^r ROUSSEL

Agent d'hémostase

(Voir en outre page 196)

Sérum frais, hémopoïétique de cheval.

Action :

Hémostatique et Hyperleucocytaire général et local. Hémopoïétique.

Formes pharmaceutiques :

1^o Boîte de six flacons-ampoules.

2^o Boîte de quarante-cinq comprimés.

3^o Flacon de sirop.

4^o Ovules : usage gynécologique.

Prix en France 11 fr. 50 (Ampoules).

10 fr. 50 autres formes

Le sérum liquide (flac.-ampoules), seul, est hémostatique.

Indications :

Syndrômes toxi-hémorragiques, hémophilie. Hémorragies (hémoptysies; entérorragies, métrorragies, etc.). Plaies saignantes.

Posologie dans les hémorragies :

Dans les cas aigus : injection de 30 cc. (technique du sérum antidiphtérique).

Dans tous les autres cas : ingestion ou mieux lavement de trois flac.-ampoules. Utiliser, en outre, si possible, l'application locale : tamponnements (métrorragies, épistaxis, etc.).

Littérature et Echantillons :

Laboratoire de l'HÉMOSTYL

21, Rue d'Aumale — PARIS (IX^e)

(Téléphone : Trudaine 66-41)

HEMYPNAL

Analgésique obstétrical

Trichloro-butylalcool-diallylmalonylurate d'éthylmorphine. Composé possédant des propriétés analgésiques le rendant particulièrement propre à atténuer considérablement les douleurs de l'accouchement, sans aucun danger ni pour la mère ni pour l'enfant. Utilisable également pour les petites interventions gynécologiques ou urologiques.

Indic. — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonic utérine). Curettages, cystoscopies, cathétérismes, prostatectomies.

Doses. — Pour un accouchement : 5 à 8 cachets, 2 à 4 suppositoires. Interventions : 1 à 2 cachets ou suppositoires dans l'heure qui précède, 2 à 4 suppositoires par 24 heures après l'opération.

Le tube de 10 cachets : 15 francs.

La boîte de 4 suppositoires : 15 francs.

LABORATOIRES CIBA.-O. ROLLAND

1, place Morand. — LYON

HÉPATO-BYL

Opothérapies entérique, hépatique et biliaire
en ovoïdes glutinés

Dose. — 4 à 8 ovoïdes par jour, en trois fois, dix minutes avant les repas (avec un demi-verre d'eau destiné à faire pression sur le pylore et à entraîner le tout dans l'intestin) ou le soir, la dose complète en une seule fois avant de se coucher.

Propriétés. — L'extract biliaire seul est thérapeutiquement insuffisant. Aussi le Corps Médical prescrit de préférence l'extract total de la glande hépatique (bile et foie) additionné d'extract intestinal, dans la Constipation, l'Entérocolite et toutes les Affections du foie.

Médication sans similaires

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, rue de la Source, PARIS (16°)—Tél. Ant.06-6

HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

Composition. — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine; Santalol pur et gluten.

Avantages. — Stabilisation de l'urotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogénèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

Emploi et doses. — *Cas aigus* : 6-12-15 globules par jour, à doses flécs.

Cas chroniques : 6-8-10 globules par jour.

Indications. — Cystites. Prostatites. Gonococcies. Bacteriuries. Pyélites. Pyélonéphrites. Colibacilloses, etc. Phosphaturies. Urines ammoniacales. Coliques hépatiques et néphrétiques. Cholécystites. Diathèse urique. — Echantillons. Littérature.

Dépôt — Paris: **Pharmacie P. LOISEAU**

7, Rue du Rocher — PARIS

Laboratoires **CAMUSET, ABLON** (Seine-et-Oise.)

HIPPOSARCINE ROY

Suc musculaire total exprimé à froid

Provenant du cheval vigoureux et reposé

Supérieur au suc musculaire des bovidés

Par sa plus grande richesse en Azote, en Glycogène, en Hémoglobine, en Phosphate et en Fer ;

Par l'absence totale de Bacilles tuberculeux, de Cysticerques du Ténia.

Assimilation parfaite

Aucun inconvénient digestif

Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades qui en retirent toujours grand profit.

Tuberculoses pulmonaires et chirurgicales. Tout état d'affaiblissement et de Consommation. Maladies de l'estomac et des intestins.

GIVAUDAN-LAVIROTTE

55, chemin de Combe-Blanche — LYON

HISTOGÉNOL

Puissant reconstituant général

Indications. — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc...

Formes. — Elixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

Posologie. — *Adultes* : Une cuillerée élixir ou une mesure de granulé avant chaque repas ou un comprimé matin et soir ou une ampoule par jour.
Enfants : Moitié doses.

Etablissements MOUNEYRAT

12, Rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

HOLOS

Opothérapie osseuse

Nature. — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

Indications. — Réminéralisation du terrain tuberculeux : Pré-tuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une prompte reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

Posologie. — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants se contenter d'une 1/2 mesure.

Littérature — Echantillons

DESCHIENS, Docteur en Pharmacie

9, rue Paul-Baudry — PARIS

HOPOGAN BOCQUILLON

Composé organo-minéral, à base de Peroxyde de Magnésium retraité pour l'emploi thérapeutique (interne).

Les Sels d'HOPOGAN-BOCQUILLON se désagrègent, entrent en réaction et agissent à volonté (suivant formes médicamenteuses), soit dans l'estomac, soit dans l'intestin, dont ils recouvrent et « tapissent » la paroi, à l'exemple d'un véritable pansement interne chargé d'absorber les ferments et les acides gastro-intestinaux qu'ils transforment par réaction lente en Oxygène-Naissant.

La présence de ce dernier assure : la désinfection la plus complète, la désintoxication et la vivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires normales.

Formes. — Estomac : comprimés, cachets, granulés. — Intestin : pilules kératinisées, gélucapsules, prise-bébé. — Arthristisme : Hopenase

Laborat. des Peroxydes médicaux
12-18, rue Lamartine — PARIS

HORMOLAXINE

Opothérapie intestinale.

Composition. — Rééducateur physiologique de l'intestin, à base d'HORMONES CŒCALES.

Indications. — L'Hormolaxine est le remède spécifique de la CONSTIPATION et de l'insuffisance d'évacuation intestinale, dont la cause est un fonctionnement défectueux du cœcum « *Spasmes du cœcum, atonie du cœcum, inflammation chronique du cœcum, Typhlïte, Pérityphlïte, Appendicite chronique.* »

Propriétés. — Régulateur de la fonction intestinale à laquelle il rend son énergie naturelle.

Doses et Mode d'emploi. — Une à trois cuillerées à café avant le repas du soir, dans un demi-verre d'eau froide.

DARRASSE Frères

13, rue Pavée — PARIS

HUILAXINE " GILLOT "

Composition. — Huile de Paraffine bi-rectifiée, absolument sans goût et sans odeur. Viscosité maxima.

Indications. — Constipation opiniâtre, Appendicite, Colites, Hémorroïdes.

Propriétés. — Lubrifiant de l'intestin. Action mécanique.

Dose. — 1 cuill. à bouche le matin, avant le petit déjeuner; 1 cuill. le soir en se couchant.

Laboratoire GILLOT

59, Rue de Châteaudun — PARIS

HUILE CROLAS

de Ricin, chimiquement pure

Obtenue par des procédés purement mécaniques, sans l'intervention d'aucun produit chimique.

Absolument sans saveur et sans odeur, ne contient cependant que de l'huile de Ricin.

Le purgatif par excellence des enfants et des personnes délicates.

En flacons spéciaux à bouchage hermétique de 30, 45, 60 grammes et flacon provision de 250 grammes.

GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, Chemin de Combe-Blanche — LYON

HYDRALIN

Antiseptique gynécologique

Composition. — Perborate de Soude, Borate de Soude, Bicarbonate de Soude, Fluorure de Sodium, essences aromatiques.

Propriétés. — Est une source d'Oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

Indications. — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

Présentation. — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

Mode d'emploi. — Prescrire, pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 Sachets : 7 francs

Laboratoires CALLAUD

25, rue Drouot — PARIS

Téléphone : Central 59-92

HYPODERMOZONE

(Peroxydine injectable)

Ampoules de 2 cc. d'ozone stable à la température ordinaire. (*Voir fiche Entérozone*) pour usage hypodermique.

Prop. thér. — Bactéricide puissant. Antiseptique intestinal. Antithermique. Oxydant et régénérateur des globules sanguins. Cicatrisation rapide des plaies rebelles.

Posologie et dose. — Doit être employée dans les cas graves à raison d'une injection de 2 cc. chaque matin. Il est bon de faire boire en même temps au malade de l'*Entérozone* pour compléter le traitement.

H. ROGIER

9, rue de la Terrasse — PARIS (17^e)

HYPOPHOSPHITES CHURCHILL

Sels de phosphore complètement assimilables, parce que non oxydés.

Siraps et Ampoules. — (Voir la fiche Ampoules Churchill).

Limol Churchill. — Sirop d'hypophosphite de chaux 0 gr. 20 par dose, dans Phosphaturie, Tuberculose, Asthénie, Diabète, Rachitisme, Dentition, Bronchites.

Sorol Churchill. — Sirop d'hypophosphite de soude : 0 gr. 20 par dose, mêmes indications mais en cas d'hypertension artérielle et d'âge avancé.

Iroal Churchill. — Sirop d'hypophosphite de fer 0 gr. 10 par dose, dans Anémie, Chlorose, Aménorrhée, Dysménorrhée.

Poliol Churchill. — Sirop d'hypophosphites composé dans la proportion des bases minérales de l'organisme avec méthylarsinate de strychnine : 1 mgr. par dose. Neurasthénie et dans tous les cas exigeant un reconstituant énergique.

Et tous autres sels : Manganèse, potasse, magnésie, ammoniaque, etc.

Dose pour adultes — Une à deux cuillerées à soupe dans un peu d'eau après les deux principaux repas.

Le flacon... 9 francs

(Prix réglementé)

Exiger la signature Churchill et la marque de fabrique de la

Pharmacie SWANN

12, Rue Castiglione — PARIS

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

IMMUNIZOLS Grémy

Les Immunizols sont des vaccins microbiens : les uns sont monomicrobiens à staphylocoques, à streptocoques, à pneumocoques, les autres sont polymicrobiens, c'est-à-dire renferment dans leur formule plusieurs espèces microbiennes.

Les Immunizols sont des stocks-vaccins ; les souches microbiennes qui servent à les fabriquer sont soigneusement sélectionnées ; ainsi un staphylocoque de furoncle entre dans la composition de l'Immunizol anti-furonculeux ; un colibacille de cystite sert à fabriquer l'Immunizol destiné à traiter les infections urinaires.

Le terme "Immunizols" désigne l'ensemble de ces stocks vaccins ; on distingue en effet :

- les Immunizols bouillon-vaccins pour pansements vaccinants,
- les Immunizols en comprimés pour vaccination par voie buccale,
- les Immunizols injectables pour vaccination sous-cutanée.

Chacun de ces Immunizols porte un numéro d'ordre avec le nom de la maladie pour laquelle il est plus communément désigné, sans que cette désignation soit exclusive.

Immunizols Grémy bouillon-vaccins pour pansements vaccinants (I. B. V. Grémy)

Ce sont des bouillons de culture dans lesquels sont nées, ont vécu et sont mortes des générations de microbes de souches variées.

Ces bouillons, rendus inoffensifs et privés de leur corps microbiens, paralysent la culture ultérieure dans leur milieu des microbes de même espèce. Ils constituent des bouillons dits "vaccinés".

Ces bouillons possèdent des propriétés vaccinantes énergiques, des propriétés inhibantes pour le développement des mêmes espèces microbiennes, et des propriétés cytophylactiques à l'égard des cellules de la plaie.

Les I. B. V. Grémy ont une couleur jaune ambrée ; ils sont très légèrement opalescents et ils possèdent une odeur sui generis qui varie avec les espèces microbiennes qui ont servi à les fabriquer.

Toute ampoule ne possédant pas ces propriétés doit être rejetée. Les I. B. V. Grémy s'appliquent *localement* sur le foyer d'infection soit à l'aide de compresses imbibées, posées à plat sur la plaie, soit à l'aide de mèches imbibées également, avec lesquelles on bourre la plaie, soit par instillations dans les plaies anfractueuses et dans les trajets fistuleux.

On peut encore appliquer les I. B. V. sur les muqueuses, les instiller dans les cavités naturelles et même les vaporiser.

Leurs effets se font sentir du jour au lendemain. Quand on enlève le premier pansement, on découvre une plaie propre, bourgeonnante, en voie de cicatrisation.

Aucune réaction n'est à redouter.

Immunizols Grémy en comprimés pour la vaccination par voie buccale.

Ils se présentent sous forme de comprimés lenticulaires, qui renferment des milliards de corps microbiens, incorporés à du phosphate de chaux.

Ils sont enfermés dans un flacon à double ouverture.

Par l'une on fait sortir les comprimés lenticulaires de vaccin, par l'autre des pilules sphériques de bile.

L'ingestion préalable de bile rend la muqueuse intestinale plus réceptive à l'action du vaccin. Aussi prend-t-on le matin à jeun 2 pilules de bile, et dans la journée, dans l'intervalle et loin des repas, en plusieurs prises, de 8 à 10 comprimés lenticulaires de vaccin.

La vaccination par voie buccale est le complément de la vaccination locale avec les I. B. V.

Immunizols Grémy injectables pour la vaccination sous-cutanée.

Ce sont des émulsions en eau physiologique de corps microbiens tués et rendus atoxiques (voir liste pages suivantes).

Le dosage des Immunizols en corps microbiens a été étudié de façon à introduire dans l'organisme le minimum de corps microbiens nécessaire pour obtenir un maximum d'effet avec un minimum de réactions.

Les Immunizols s'injectent sous la peau à la dose initiale de 1/2 cm³. Les injections suivantes se font tous les 3 jours à doses progressivement croissantes, en augmentant la dose précédente d'un 1/2 cm³, jusqu'à ce que soit atteinte la dose limite de 2 cm³, que l'on répète.

Une cure vaccinale comporte de 10 à 12 injections.

En général on n'observe aucune réaction importante.

Rarement on note des réactions : réaction locale, thermique et locale.

Exceptionnellement les réactions sont marquées.

On peut chez un même malade associer les vaccinations locales, buccales et sous-cutanées.

Laboratoires G. GRÉMY

14, Rue de Clichy — PARIS (9^e)

IMMUNIZOL GRÉMY

Bouillon-Vaccin

pour Pansements-Vaccinants

N° 10 - Furunculose et toutes Staphylococcies
(I. B.-V. GRÉMY N° 10)

Indicat. — Furunculose - Anthrax - Impetigo -
Sycosis de la barbe - Ostéomyélite opérée
- Abscess tubéreux de l'aisselle - Abscess et
plaies suppurés à staphylocoques.

Mode d'Emploi. — Imbiber d'I. B.-V. les
compresses et les mèches destinées au
pansement. - Faire un pansement occlusif
en le complétant avec du coton cardé et
du taffetas gommé.

Un pansement tous les jours.

14, Rue de Clichy - PARIS (9^e)

IMMUNIZOL GRÉMY

Bouillon-Vaccin

pour Pansements-Vaccinants

N° 24 " Toutes Streptococcies "

(I. B.-V. GRÉMY N° 24)

Indications. - Erysipèle, lymphangite, infection
puerpérale - Pleurésie purulente, arthrites à
streptocoques - Fistules à l'anus - Néoplasmes
infectés.

Mode d'emploi. — Imbiber d'I. B.-V. les com-
presses ou les mèches destinées au pansement.
Dans l'infection puerpérale, imbiber d'I. B.-V.
des mèches serrées introduites dans la cavité
utérine délivrée - Un pansement tous les jours -
Instillations dans les fistules de l'anus - Injec-
tions dans la cavité pleurale vidée par thora-
centhèse.

14, rue de Clichy - PARIS (9^e)

IMMUNIZOL GRÉMY

Bouillon-Vaccin

pour Pansements-Vaccinants

N° 25 " Toutes Pneumococcies "

(I. B.-V. GRÉMY N° 25)

Indications. — Ulcères de la cornée - Dacryocystites - Pleurésies purulentes, péritonites et arthrites à pneumocoques - Abscesses et plaies à pneumocoques.

Mode d'emploi. — En instillations dans l'œil, ou dans le sac lacrymal.

En injections dans la plèvre, dans le péritoine ou dans les articulations, après évacuation du pus par ponction ou par opération.

En pansements sur les plaies et abscesses.

14, rue de Clichy - PARIS (9°)

IMMUNIZOL GRÉMY

Bouillon-Vaccin

pour Pansements-Vaccinants

N° 31. " Abscesses et toutes plaies infectées "

(I. B.-V. GRÉMY N° 31)

Indications. — Abscesses - Phlegmons - Plaies par accidents du travail - Panaris - Fractures compliquées - Suppurations post-opératoires - Abscesses du sein - etc.

Mode d'Emploi. — Imbibler d'I. B.-V. les compresses ou les mèches destinées au pansement.

Ou bien instiller l'I. B.-V. dans les plaies et dans les trajets fistuleux.

Faire un pansement occlusif avec du coton cardé et du taffetas gommé.

Un pansement tous les jours.

14, rue de Clichy - PARIS (9°)

IMMUNIZOL GRÉMY

Bouillon-Vaccin

pour Pansements - Vaccinants

N° 35 "Ulcères variqueux"

(I. B.-V. GRÉMY N° 35)

Indications. — Ulcères variqueux, ulcérations, escharres de décubitus et des convalescents.

Mode d'emploi. — Imbibcr les compresses avec de l'I. B.-V. - en recouvrir les régions à soigner - faire un pansement occlusif avec coton cardé et taffetas gommé pour éviter la dessiccation des compresses.

Un pansement tous les jours.

14, rue de Clichy - PARIS (9^e)

IMMUNIZOL GRÉMY

Bouillon-Vaccin

pour Pansements - Vaccinants

N° 36 "Brûlures infectées"

(I. B.-V. GRÉMY N° 36)

Indications. — Toutes les brûlures infectées.

Mode d'emploi. — Bien nettoyer les plaies - vider les phlyctènes - recouvrir les brûlures de compresses imbibées d'I. B.-V.

Faire un pansement occlusif avec coton cardé et taffetas gommé, pour éviter la dessiccation des compresses.

14, rue de Clichy - PARIS (9^e)

IMMUNIZOL GRÉMY

**Bouillon-Vaccin
pour Pansements-Vaccinants**

N° 41 "Métrites"
(I. B.-V. GRÉMY N° 41)

Indications. — Métrites du col - Métrites du corps - Vaginites - Bartholinites.

Mode d'emploi. — Tampons vaginaux imbibés de I. B.-V.

Mèches imbibées d'I. B.-V. introduites dans le col ou dans les cavités abscessées des glandes de Bartholin. Instillations dans la cavité utérine à la dose de 2 cm³ très lentement.

14, Rue de Clichy - PARIS (9^e)

IMMUNIZOL GRÉMY

**Bouillon-Vaccin
pour Pansements-Vaccinants**

N° 50.
"Otites, Sinusites, Mastoïdites opérées"
(I. B.-V. GRÉMY N° 50)

Indicat. — Otites moyennes suppurées opérées - Sinusites opérées - Mastoïdites opérées - Rhino-pharyngites.

Mode d'Emploi. — Mèches imbibées d'I. B.-V. introduites dans les plaies opératoires.

Instillations dans les plaies, dans l'oreille, dans le nez. Lavage de sinus. Vaporisations dans le pharynx.

14, rue de Clichy - PARIS (9^e)

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)

Composition. — Principes actifs d'Hamamelis, marron d'Inde, condurango, viburnum, anémone, sénégon, piscidia. (Alcaloïdes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisée).

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la circulation générale. Décongestif par vaso-constriction périphérique. Analgésique par action sur les terminaisons nerveuses sensitives. Toni-vasculaire et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues.

Indications. — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorroïdes.

Mode d'emploi. — 20 à 30 gttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours p. mois)

LABORATOIRES A. LEJEUNE

12, rue Emilio-Castelar. — Paris-XIIe

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

(Médications végétale et
opothérapique associées)

Composition.

Principes végétaux de l'Indhaméline Lejeune simple associés aux sucs glandulaires de :
Hypophyse, ovaire, surrénale et thyroïde.

Indications.

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus particulièrement indiquée dans les troubles de la ménopause et de la puberté, dans les métrites, salpingites non suppurées, ovarites chroniques, sclérose utérine, etc.

Mode d'emploi.

20 à 30 gttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 j. par mois).

LABORATOIRES A. LEJEUNE

12, rue Emilio-Castelar. — Paris-XIIe

INOTYOL du Dr DEBAT

Principes actifs. — Sulfo-schistol. Lithol. Extrait distillé d'Hamamélis frais.

Indications. — Eczémas. Ulcères. Brûlures. Prurits et toutes lésions ou irritations de la peau.

FORMES. — Pommade : 3 grandeurs :

Tube de 50 gr. 6 fr. 80

1/2 tube de 25 gr. 3 - 90

Quadruple tube 200 gr. 19 - 20

Sauf indications spéciales, les pharmaciens délivrent le tube de 50 gr.

Poudre : Complète l'action de la pommade ; calme les érythèmes légers ; indiquée pour la toilette des nouveaux-nés. La boîte poudreuse 2.80

Savon : Traitement de la Séborrhée, le pain, prix : 3.50

LABORATOIRES du Dr DEBAT

35, rue des Petits-Champs, — Paris

INSULINE BYLA

Autorisée par l'Académie de Médecine

Adoptée dans les hôpitaux

Purifiée débarrassée de ses toxalbumines et de ses sels.

Présentée sous forme d'une poudre stérile, immédiatement soluble dans l'eau.

Purification parfaite

Stabilité indéfinie

Constance absolue de l'action thérapeutique

Chaque ampoule d'INSULINE BYLA contient 15 unités cliniques et est accompagnée d'une ampoule, de 2 cc. sérum physiologique dans laquelle on la fait dissoudre au moment de l'injection.

Indications. — Traitement du Diabète et de toutes ses manifestations.

Posologie. — 1 à 5 ampoules par jour, suivant la gravité du malade et suivant traitement prescrit par le médecin.

Les Etablissements BYLA

26, Avenue de l'Observatoire — PARIS

R. C. Seine 71895

INSULINE FORNET

Seule insuline buccale.

Principe actif. — Extrait des îlots de Langerhans du Pancréas.

Indications. — Le Diabète léger.

Forme. — Boîte de 30 pilules.

Dose. — 1 à 3 pilules trois fois par jour, une demi-heure avant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Abaisse la glucosurie, diminue la polydipsie et la polyphagie, augmente la vitalité du diabétique.

Echantillon sur demande.

INSTITUT DE MICROBIOLOGIE SARREBRUCK

INSULINÈ ROGIER

Principe actif des îlots endocrines du pancréas isolé et purifié.

Forme et titre. — Poudre soluble inaltérable conservée en ampoules stériles.

Chaque boîte renferme 8 ampoules divisées en 2 séries, les unes contenant la poudre d'Insuline, les autres 2 cc. de solution isotonique pour dissoudre la poudre.

Chaque ampoule d'Insuline contient une dose équivalente à 30 unités. Chaque cc. de la solution obtenue contient donc 15 unités.

Indications. — Diabète et ses manifestations.

Posologie. — Doses variables selon les cas.

En moyenne 15 à 60 unités par jour. Dans le coma 200 à 300 unités et plus.

NOTA BENE. — Voir "Levulose Rogier" et "Vitamine Rogier".

Littérature sur demande.

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie
19, Avenue de Villiers. — PARIS

INSULYL DU DOCTEUR ROUSSEL

Produit de la sécrétion interne du pancréas (Îlots de Langerhans).

Action :

Abaisse la glycémie, permet l'utilisation des hydrates de carbone ingérés.

Indications :

Le diabète et ses complications : Coma, anthrax.

Forme :

Boîte de 10 ampoules

Chaque ampoule renferme 20 unités cliniques.

Doses :

Une ampoule en injection intra-musculaire avant chaque repas.

Il est nécessaire d'associer la cure diététique à la cure d'Insulyl.

LABORATOIRE DES PROXYTASES

21, rue d'Aumale. — PARIS IX^e

Téléph. Trud. 46-07

IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant cinq centig. Iode par centim. cube. Première combinaison directe de l'Iode avec la peptone. Communication au XIII^e Congrès international de médecine de Paris (1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications internes sans iodisme.

Arthritisme. — Goutte. — Rhumatisme. — Artério-sclérose. — Maladies du cœur et des vaisseaux. — Affections glandulaires. — Rachitisme. — Goutte. — Fibrome. — Syphilis. — Obésité.

Pour les adultes : 20 à 60 gouttes par jour.

Pour les enfants : 5 à 20 gouttes par jour.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (4^e).

IODAMELIS LOGEAI

Véritable combinaison définie, en gouttes concentrées, d'*Hamamelidine* et d'*Iodo-Iodure de Potassium*, découverte par M. Logeais et exaltant par cette association l'activité pharmacodynamique du produit.

Propriétés. — Par son *Hamamelidine*, spécifique veineux chez les hypertendus veineux, cyanotiques variqueux, par son *Iodo-Iodure de K*, spécifique cardio-artériel chez les artério-scléreux uricémiques, hypervisqueux, l'*Iodamelis* est le plus puissant modificateur de la circulation et domine toute la thérapeutique cardio-vasculaire.

Indications. — Affections cardio-vasculaires et à point de départ circulatoire, troubles de la puberté et de la ménopause.

Posologie. — En se rappelant que :

(0,20 Hamamelidine.

1 gr. — L. gttas — (0,08 Iode

(0,25 Iodure de K.

on prescrira de X à XXV gouttes 2 fois par jour, avant les repas, dans un peu d'eau de Vichy.

Demi-dose pour les enfants.

Tolérance parfaite. Pas d'iodisme.

Laboratoires LOGEAI

22^{bis}, rue de Silly. — BOULOGNE-s/SEINE, près PARIS.

IODARSENIC GUIRAUD OU GOUTTES PAIDOPHILES

du Docteur GUIRAUD

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux

Formule. — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

Indications. — Lymphatisme, Rachitisme, Scrofuleuse, Emphysème, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo, Psoriasis, Urticaire...) Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

Posologie. — Enf. de 6 mois à 2 ans 2 à 10 gouttes par jour
— 2 ans à 8 ans 4 à 20 —
— 8 ans à 15 ans 4 à 20 —
Adultes 10 à 40 —

à prendre en se conformant à la notice, dans un peu d'eau ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

Présentation. — Flacon compte-gouttes 45 gr.

Laboratoire

60, cours d'Aquitaine — BORDEAUX

IODASELLE DELAMARRE

Combinaison iodo-phosphatée avec l'extrait de noyer.
d'un goût exquis et parfaitement tolérée.

Indic. thérap. — Lymphatisme, Lympho-sérofalose, Tuberculoses externes, Engorgements ganglionnaires, Rachitisme, toutes maladies par carence, Anémie, Chloro-anémie, Amenorrhée, Affections chroniques du système nerveux, Myélites, Tabès, Chorée.

Mention iodée ne provoquant pas d'accidents d'iodisme.

Doses et mode d'emploi. — L'Iodaselle se prend pure ou avec un peu d'eau, à la fin des repas.

Doses moyennes :

De 2 à 4 ans : 2 cuillers à café par jour.

De 4 à 10 ans : 3 cuillers à café par jour.

De 10 à 15 ans : 2 cuillers à dessert par jour.

Au-dessus de 15 ans : 2 cuillers à soupe par jour.

Laboratoires du COLARSÉ

49, Rue Thiers — BOULOGNE-sur-MER

IODASEPTINE CORTIAL

Composition. — Iodobenzométhylformine, corps cristallisé, contenant 42 % d'iode, très soluble dans l'eau, dialysable, injectable sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

Prop. Thérap. — Dérivées de la nature de ses composants ; Iode et antiseptiques (Formol de l'Urotropine et groupe Phényl des corps benzoylés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires : Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hémoptysies), Adénopathies, Paludisme, Spirillose.

Prép. Pharm. Posol. — Ampoules : Solution à 1/10 : A, 2 cc., B, 5 cc., C, 10 cc., par voie intraveineuse ou intra-musculaire à doses progressives, Tuberculose 2 à 5 cc., Rhumatismes chroniques 5 à 20 et même 35 cc. pro-die. Gouttes : 1 cgt. d'Iodaseptine par goutte, XX à C par jour (Enfants X à XXX.) *Comprimés* : A, 20 cgt. - B, 0,50 cgt. (1 à 4 par jour).

Laboratoires CORTIAL

10, Rue Béranger — PARIS

IODE ORGANIQUE BOISSY

(C⁶ H¹² N⁴ - C² H⁵ I)

Comprimés solubles de 10 centigrs.

Propriétés. - *L'Iode organique Boissy* (Iodéthyl-hexaméthylènetétraminé) est un corps cristallisé, d'un blanc pur, renfermant 43 % d'iode. Très soluble dans l'eau, il donne des solutions neutres, incolores, légèrement amères. N'exerce aucune action sur l'estomac et ne provoque jamais d'iodisme. Se dissocie dans l'organisme avec mise en liberté d'iode naissant, puissamment antioxygène et antiseptique. Abaisse la tension artérielle et provoque une diurèse surtout manifeste au début de son emploi.

Indications. - Plus actif que l'iode et les iodures, les remplace avec avantage. Particulièrement efficace contre Hypertension, Angine de Poitrine, Artériosclérose, Asthme, Emphysème, Rhumatisme, Goutte, Syphilis tertiaire, Maladies infectieuses : Grippe, etc.

Doses moyennes. - 1 à 8 comprimés par jour.

Laboratoires BOISSY

32 bis, boul. d'Argenson, NEUILLY-sur-SEINE

IODÉINE MONTAGU

(Bi-iodure de Codéine)

Propriétés. - Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique ; facilite l'expectoration.

Indications. - Toux, Emphysème, Asthme.

Formes Pharmaceutiques :

Sirop. - 0,04 cgr. d'Iodéine par cuill. à soupe.

Dose : 1 à 3 cuill. par jour.

Gouttes. - X gouttes = 0,01 cgr. d'Iodéine crist.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Pilules. - 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

Ampoules (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour.

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

IODEYL FOURNIER

Combinaison iodo-organique d'iode
et peptone pure

Forme. — Globules : 0,01 cgr. iode
métalloïdique combiné par globule.

Dose. — 3 à 6 globules par jour; à
prendre aux repas.

Indications. — Celles de l'iode et des
iodures : Adénopathies chroniques,
Emphysème, Asthme, Artério-Sclé-
rose, Syphilis.

En flacon de 60 globules : 6 fr. 50 le flac.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

IDO-BISMUTH ERCÉ

(Iodo-bismuthate de quinine)

Formes. — Ampoules-seringues auto-
injectables, pour injections intra-mus-
culaires,

Avantages sur les préparations

analogues.

Trois fois moins d'excipient à injecter.

Suspension stable permettant d'éviter
une agitation longue et pénible.

Suppression du transvasement toujours
difficile d'une suspension huileuse.

Indications.

Syphilis à toutes ses périodes.

LABORATOIRES

ROBERT et CARRIERE

37, rue de Bourgogne, Paris

Téléph.: Ségur 29-49. Fleurus 13-09

R. C. 176. 249 Seine

IODO-BISMUTHATE DE QUININE FRAISSE

Composition :

Iodo-Bismuthate de Quinine :
0 gr. 30 ; huile d'olives : 3 cm³.

Indications :

Dans toutes les formes de la syphilis. Traitement ordinaire : 15 à 20 ampoules, dont une tous les trois jours.

Prix de la boîte de 6 ampoules :
11 francs

Laboratoires FRAISSE

8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

IODOGÉNOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale

Gouttes titrées. Supérieur à tous les produits similaires, aux iodures métalliques et aux vins et sirops iodés.

S'en différencie par : 1° L'absence d'acide iodhydrique libre ; 2° La grande stabilité des iodures organiques et la nature de leurs bases ; 3° La très grande proportion d'iode substitué (25 % de l'iode total au lieu de 0 à 8 %) ; 4° La très grande activité pharmacodynamique de l'iode sous cette forme.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Les études clinique et physico-chimique montrent que c'est la meilleure forme d'administration de l'iode et des iodures.

Posologie. — Enfants : 10 à 30 gouttes par jour ; adultes : 40 à 60 gouttes par jour, dans un peu d'eau, aux repas, en 2 fois. (Syphilis : 100 à 120 gouttes par jour.)

Laboratoires PÉPIN & LEBOUCC
à COURBEVOIE (Seine)

IODOMÉTINE

Solution concentrée et titrée d'iodhydrate d'héxaméthylène tétraamine.

Combinaison organique d'iode soluble et assimilable, 5 gouttes représentent un centigramme d'iode; 20 gouttes agissent comme un gramme d'iodure alcalin.

Doses et mode d'emploi. — Vingt gouttes en deux ou trois fois dans la journée, dans un peu d'eau pure ou sucrée.

Prop. thér. — Élimine l'acide urique et les toxines du sang. Active la sécrétion des bronches. Produit une suractivité leucocytaire et un réveil des fonctions glandulaires. Agit comme diurétique, tonique et dépuratif. Spécifique puissant contre la grippe.

Indications. — Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, Asthme, Emphysème, Grippe, Auto-intoxication, etc.

E. HAUTDIDIER

37, Rue Galilée — PARIS

IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone de viande de bœuf.

Gouttes dont 20 = 1 gr. d'iodure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — 10 à 40 gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson.

Prop. thér. — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

Indications. — Maladies par ralentissement de la nutrition; artério-sclérose; obésité; polysarcie; dégénérescence grasseuse; intoxications chroniques; asthme; emphysème; rhumatisme; arthritisme; goutte; tertiarisme.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

IODOSTARINE " ROCHE "

Acide diiodo 6-7 élaïdique ou taririque diiodé du Professeur Arnaud (Communication à l'Académie des Sciences, Paris, CXLIX, page 220), 47,56 % d'iode organique complètement assimilé, sans aucune saveur. Absorbé seulement dans l'intestin.

Indic. Thér. :

Remplace KI aux mêmes doses.

Posologie et Mode d'emploi :

Iodostarine " Roche " cachets, dosés à 0,25 cgr. Adultes : 1 à 4 par jour, selon les cas.

Iodostarine " Roche " comprimés, dosés à 0,125 mgr. Adultes : 2 à 8 par jour, selon les cas; enfants : 1 à 4 par jour, selon l'âge. Les comprimés peuvent être absorbés très facilement avec un peu de liquide (eau, vin, thé ou café), au choix du malade.

Iodostarine " Roche " granulé, dosé à 0,25 cgr. par mesure (intérieur de la capsule en aluminium). Adultes : 1 à 4 mesures par jour, selon les cas; enfants : 1/2 à 2 mesures par jour, selon l'âge.

Toutes ces préparations sont d'une blancheur immaculée.

N. B. — On prend l'Iodostarine " Roche " de préférence à la fin des repas.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

iodo-THYROÏDINE CATILLON

Forme :

Tablettes de Catillon à 0, 25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

Indications :

Obésité, Goitre, Myxœdème, Dermatoses.

Doses :

1 à 2 contre Myxœdème; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

Laboratoire CATILLON

3, Boulevard Saint-Martin — PARIS

IODURASE

Description. — Capsules kératinisées contenant :

Iodure de potassium pur...	0 gr. 50
Levurine extractive.....	0 gr. 10

Action thérapeutique. — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

Indications. — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goitre, l'obésité, le saturnisme.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

IODURE PHILIPPE

Forme. — En pilules *kératinisées* ; elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — Plus de 20 ans de pratique et de succès.

Prière de prescrire :

Pilules Philippe à l'iodure de potassium (à 0,50
(à 0,20
(à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les Pilules Philippe à 0,20 centigr. d'iodure qui sont déléguées.

Pilules Philippe à l'iodure de sodium à 0,20

Indications. — Artério-sclérose, Adénopathies, Tension artérielle, Goitre, Obésité, Syphilis, etc.

Dose. — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour, en deux ou trois fois.

Littérature et Echantillons

Laboratoire du Docteur H. PHILIPPE

11, rue Palais Grillet — LYON

Si le " DICTIONNAIRE DE SPÉ-
CIALITÉS PHARMACEUTIQUES " vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

JÉCOL

ASSOCIATION MÉDICAMENTEUSE des 3 stimulateurs végétaux de la cellule hépatique

Composition. — Combretum (extrait spécialisé de Kinkélibah).
Boido (extrait aqueux).
Evonymus (extrait titré).
Lactose, boido, réglisse pulv.

Forme. — Petits cachets composés de 0 gr. 25 conservés dans des tubes de verre.

Indications — *Dès qu'il est nécessaire de stimuler la cellule déficiente du foie, afin d'en régulariser sans à coup le délicat fonctionnement.*
Toutes les Affections primitives du foie et toutes celles corrélatives à un mauvais fonctionnement de cet organe lequel engendre les troubles les plus divers des fonctions essentielles de la Nutrition.

INSUFFISANCE ET CONGESTION DU FOIE
GASTRO ENTÉRITE - ENTÉRITE MUCOMENBRANÉUSE - AUTO INTOXICATION - IRRÉGULARITÉS DU TRANSIT INTESTINAL - AFFECTIONS HÉPATIQUES LARVÉES - FOIE COLONIAL

Prescription. — L'Action du Jécol est progressive, parceque, à dessein, très douce et l'expérience recommande de prescrire une cure qui peut varier de 3 à 6 semaines suivant les sujets, à raison de 2 à 4 cachets par jour à la fin des repas. Cette dose peut être augmentée ou diminuée chaque semaine suivant les résultats constatés chez le malade.

S'il s'agit de développer rapidement le pouvoir antitoxique du foie prescrire 4, 6 et même 8 cachets en une seule fois par 24 heures.

Pour les enfants, les femmes en couche, les opérés réduire la dose à 1 cachet par jour ou tous les 2 jours.

Contre indications — Néant.

Prescrire 1 boîte de Jécol (30 cachets)

Echantillon médical et littérature sur demande adressée au:

Laboratoire du JÉCOL

3, Rue Watteau — COURBEVOIE (Seine)

JECOMALT WANDER

(Huile de foie de morue maltée)

Composition. — Huile de foie de morue 30 %,
Extrait de malt 60 %, Essences aromatiques
Q. S.

Indications. — Le jecomalt réalise la médication à l'huile de foie de morue renforcée des éléments nutritifs et digestifs (diastases) de l'Extrait de malt, Anémie en général, Croissance des enfants.

Doses. — Enfants jusqu'à deux ans : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants plus âgés, adolescents et adultes : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas tel que (il fond rapidement dans la bouche), ou dilué dans du lait tiède ou infusion.

ÉTABLISSEMENTS WANDER

58, Rue de Charonne — PARIS (XI^e)

JUGLANDINE FERROUILLAT

(Juglans — Glans Jovis — Régia)

Composition. — Principes actifs du *noyer* et *amers francs*, combinés chimiquement avec *Iode*, *Fer lacté* et *Glycérophosphate de chaux*.

Propriétés. — Médicament de Réparation et de Reconstitution physiologiques.

Formes et Posologie :

Liquide : un verre à liqueur,

Granulés : une cuillerée à café,

Gouttes : 30 gouttes,

Dragées : 3 dragées,

à chacun des principaux repas.

PHARMACIE DU CHATELET

35, rue de Rivoli, à PARIS

JUGLANE

Composition. — Principe actif du noyer sauvage.

Indications. — Toutes les formes du diabète et ses complications : acidose, acétonémie, en particulier les diabètes gras, arthritiques, hépatiques. Aucune contre-indication, tolérance parfaite, innocuité absolue, aucune incompatibilité.

Mode d'emploi. — Trois pilules avant chacun des trois repas. Cette dose peut être doublée sans inconvénient. Continuer le traitement jusqu'à complète disparition du sucre dans les urines.

Ferme et prix. — 8 francs l'épui de 150 pilules.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES

C. CONS, Anc. Int. des Hôpitaux de Lyon
Rue des Ecoles — CHAMBÉRY (Savoie)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

KAOLINASE

Pour pansements gastriques.

(Kaolin purifié, en poudre fine très adhésive, livré en boîtes de 20 paquets de 10 gr.

Doses et mode d'emploi. — 1 ou 2 paquets le matin à jeun (mode d'emploi sur prospectus).

Prop. thérap. — La KAOLINASE constitue le médicament de choix pour le *plâtrage* de l'estomac (Prof. Hayem, A. M., 13-5-1920.)

Indications. — Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Ulcères et ulcérations de l'estomac, Colites, Fermentations gastro-intestinales, etc., etc.

Échantillons gratuits.

PHARMACIE RATIONNELLE

4, rue Faubourg-Poissonnière — PARIS (10^e)

KERLOL

Expérimenté avec succès dans les hôpitaux, analysé par le Docteur BARRAL, prof. à la Faculté de Médecine de Lyon.

Composition. — Polyphénate sodique de fer chloré.

Forme. — Liquide, Poudre, Pommade, Suppositoires.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, astringent, hémostatique.

Doses et mode d'emploi :

Ulcères, Varices, Plaies : Compresse au KERLOL liquide dilué au tiers.

Hémorroïdes internes : Un suppositoire au KERLOL matin et soir.

Hémorroïdes externes : Pommade au KERLOL n° 3.

Indications. — Varices, Ulcères, Plaies, Hémorroïdes.

LERCK

pharmacien à SAINT-ETIENNE (Loire)

KINECTINE

Spécifique de la Fièvre des Foins
et du Coryza aigu

Indications :

Fièvre des Foins, Coryza aigu.

Forme :

Comprimés.

Posologie :

Adultes. — 3 comprimés par jour.

Enfants. — Moitié dose.

Etablissements MOUNEYRAT

12, Rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

KIPSOL

(en pilules)

Cacao pulv. et tannates actifs d'alcaloïdes.
(Avantages curatifs des préparations belladonées et opiacées, à l'exclusion de leurs inconvénients.)

Dose et Mode d'emploi. — 2 à 7 pilules par jour, espacées au moins de deux heures.
— Ces pilules, très petites, s'avalent facilement avec une gorgée d'eau et même sans aucun véhicule liquide.

Prop. Thér. — Spécifique des Coryzas accidentels ou chroniques, des toux, bronchites, coryza des iodures, grippe, etc.

Indications. — Préservatif et curatif des rhumes.

BERTAUT-BLANCARD Frères

64, Rue de La Rochefoucauld — PARIS

KOLA GRANULÉE ASTIER

Composition. — Extrait de Kola granulé contenant tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tanno-caféiniques, rouge de Kola et tanins actifs.

Prop. thér. — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

Indications. — Neurasthénie, Dépression mentale, Adynamie cardiaque, Troubles fonctionnels cardiaques, Grippe, Convalescence des maladies infectieuses et maladies graves, Asthénie, Surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix : 7 fr. 45 (Impôt compris)

Laboratoires P. ASTIER

41 à 47, Rue du Docteur-Blanche — PARIS (16^e)

KOLARSINE

Composition :

Sel de Pearson.....	0,001
Noix vomique pulvérisée.....	0,025
Extrait titré de quinquina...	0,05
— — — kola.....	0,10

Action. — Hématopoïétique puissant (arsenic), stimulant du système nerveux (strychnine,) favorisant les échanges nutritifs (kola et quinquina).

Indications. — Surmenage, Neurasthénie, Convalescences, Grippe, Paludisme, Anémie, Syphilis.

Posologie. — 4 à 6 pilules par jour.

L. PAUTAUBERGE,

10, Rue de Constantinople — PARIS (VIII^e)

Les KOLATINÉS

A la Noix fraîche de Kola (*Kolatine inaltérée*) pris dans les aliments liquides chauds (*Synergie assimilatrice*) :

Présentent tous les avantages de l'amande mâchée vivante ;

Contiennent intact le principe actif renfermant la totalité de la caféine à l'état de combinaison avec la kolatine, ce qui élimine tout inconvénient caféique.

Action :

Tonique régulateur non excitant du système nerveux et glandulaire (*endo et exocrinien*), des organes hématopoïétiques et du système cardio-vasculaire.

Noosthénique constant : stimule les fonctions intellectuelles sans suractivité ni dépression consécutive et sans trace d'acoutumance dans ses effets. Fait disparaître l'insomnie et l'irritabilité.

Indications :

Asthénies. — Asthénie gastrique - Dépressions, neurasthénie, maladies infectieuses adynamiques (pneumonie, grippe), convalescences, Traitement post-opératoire, suites de couches. *Insuffisances fonctionnelles et troubles miopragiques.* — Troubles de la nutrition, athrepsie - dyspepsie atonique et nervo-motrice - entéro-névroses sécrétoires et motrices - grossesse, lactation.

Anémie, chlorose, chloro-lymphatisme, ménorragies, glycosurie alimentaire, diabète.

Forme, Posologie, Mode d'emploi :

Poudre soluble à prendre dans les boissons, infusions et aliments liquides chauds : potages, bouillies lactées ; ou cacao, café au lait, etc., suivant régime.

Correspond à 5 fois environ son poids de kola vivante.

Présentée en sachets de 2 gr., conditionnés en étuis de 10 sachets.

Adultes : 1 à 3 sachets par jour, selon quantité reconnue suffisante pour produire l'effet désiré.

Enfants : 1/2 à 1 sachet - *Nourrissons* : 1/4 sachet en plusieurs fractions, dans le lait tiède.

Dépositaires pour pharmaciens ; O.C.P. et C.N.P.F.

SIÈGE SOCIAL :

Ets CHALGO, 12, rue du Helder, PARIS (9^e)

KYMOSINE ROGIER

(Anciennement Pegnine)

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

Dose. — Une cuillerée-mesure dans 200 cm³ de lait tiède à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon, 10 fr.

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie

19, Avenue de Villiers — PARIS

LAB LACTO FERMENT MIALHE

Digestion du lait.

Indications. — Diarrhées vertes des nourrissons et dans tous les cas de mauvaise digestion du lait, troubles gastro-intestinaux, régime lacté où le malade doit absorber une forte quantité de lait.

Dose. — Pour adultes et enfants : une cuillère-mesure par verre de lait. Nourrissons : une demi-cuillère-mesure par biberon ou par tétée.

Mode d'emploi. — Mettre la dose indiquée dans une à deux cuillerées d'eau, puis ajouter le lait, froid ou tiède.

Pharmacie du D^r MIALHE

8, rue Favart — PARIS

LACTIMASE

Description. — Comprimés de ferment lactique de 0 gr. 50 ; par flacon de 40 comprimés.

Action thérapeutique. — La *lactimase* détruit les microbes pathogènes de l'intestin par accaparement du milieu, action renforcée par la symbiose du bacille Bulgare et d'une levure spéciale.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans les intoxications intestinales, diarrhées, diarrhées vertes de nourrissons, constipation, dysenteries, entérites.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

Compos. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phtaléine.

Forme. — Comprimés.

Prop. thér. — Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin sans la moindre irritation.

Doses. — 2 à 3 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau sucrée.

Enfants, un comprimé suffit.

Se vend par boîtes de six tubes de six comprimés

Prix au public : 7 fr.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, Rue de La Motte-Picquet — PARIS (15^e)

LANSOYL

HUILE DE PARAFFINE ROBERTS

Deux Formes. — Liquide et Gelée.

Liquide : Huile de paraffine chimiquement pure, très visqueuse et de densité très élevée. Sans goût ni odeur.

Gelée : Contient 90 0/0 de Lansoyl liquide et 10 0/0 de sucs de fruits et d'Agar Agar. Goût, odeur et aspect agréables. Partait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

Propriétés thérapeutiques. — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

Indications. — Constipation chronique, Inflammations, Entéro-Colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Doses. — *Adultes :* Une cuillerée à soupe le matin et le soir.

Enfants : Une cuillerée à café trois fois par jour.

Nourrissons : Une demi-cuillerée à café trois fois par jour.

ROBERTS & C^e, Pharmaciens

5, Rue de la Paix — PARIS

LANTOL

(Procédé André LANCIEN)

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium à 0 gr. 20 par litre en ampoules de 3 cc., par boîtes de 4 ampoules, et en capsules kératinisées pour la voie gastrique en flacons de 60 capsules.

Action thér. — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une hyperleucocytose considérable, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

Indications. — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux. Les capsules servent à compléter et achever le traitement tout le temps nécessaire.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, désodorisant; ni toxique, ni caustique.

Indications. — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène, médecine générale.

Mode d'emploi. — Pansements, injections vaginales.

Puissance antiseptique absolue (solution 3 %)

Dose. — Suivant les indications.

Formes actives. — SAVON LAURENOL (antiseptie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURENOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURENOL (affections de la peau).

LAURENOL n° 2, désinfectant, sans odeur ni mercure.

Laboratoires BELIERES

19, Rue Drouot — PARIS

LAXAMALT

Combinaison à parties égales d'huile de paraffine et d'extrait de Malt.

Poudre cristalline d'un goût très agréable

Dose moyenne. — Une cuillerée à café pour les *nourrissons*, deux cuillerées à soupe pour les *enfants*, quatre pour les *adultes*, réparties dans le courant de la journée.

Le LAXAMALT, pris le soir, est particulièrement efficace.

Indications. — Constipation en général.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entériques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

LABORATOIRES LICARDY,

38, Boulevard Bourdon — PARIS-NEUILLY

LAXAMER

(*laxatif amer*)

Composition. — Extrait fluide sucré à base de : Cascara sagrada, noix vomique - badiane, gentiane fraîche, écorces fraîches d'oranges amères.

Propriétés therap. — Celles des amers et des laxatifs doux n'irritant pas l'intestin - cholagogue énergique - s'emploie dans la constipation - peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices car il n'a pas de contre-indication.

Mode d'emploi. — Une à deux cuillerées à café par jour, avant le repas.

Laboratoire du Dr C. LEFÈVRE

52, rue Decamps - PARIS (16^e)

LAXATIF AU MALT WANDER

"CRISTOLAX"

Composition. — Paraffine pure { a a
Extrait de malt sec { =

Eccoprotique doux, d'une action mécanique sur les matières et protectrice sur les muqueuses.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Constipation en général. Tout particulièrement constipation des nourrissons, des enfants, des affaiblis et des personnes âgées. Constipation post-opératoire.

Très agréable au goût, ne crée pas d'accoutumance.

Doses. — Nourrissons: 1 cuillerée à café 3-4 fois par jour dans le lait ou la bouillie. Enfants: 2 cuillerées à café 3-4 fois par jour. Adultes: 1 cuillerée à soupe 3-4 fois par jour aux repas, tel que ou dissous dans un liquide.

Le résultat atteint, continuer un traitement à faible dose. 1 cuillerée à soupe aux repas principaux.

Etablissements WANDER

58, Rue de Charonne — PARIS (XI^e)

LÉCITHOSINE ROBIN

Lécithine naturelle ex-ovo

Granulé. — Pilules

Dose et mode d'emploi :

Granulé 1 à 3 cuillers-mesure.

Pilules 2 à 3 par jour.

Indications :

Neurasthénie, Phosphaturie, Tuberculose, Rachitisme, Diabète.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy

PARIS

LENIFORME

Huile antiseptique nouvelle, contenant des Variétés d'Essences, capables de détruire les Variétés Microbiennes qu'on rencontre dans les maladies

du **Nez**,
du **Pharynx**,
de la **Trachée**,
des **Bronches**

et de toutes cavités ouvertes dans ceux-ci. Se vend en flacons et en rhino-capsules dosés à 5 et 10 % d'essences.

Echantillons :

LABORATOIRE du LENIFORME

26, rue Pétrelle — PARIS

LEUCAGINE

Médication radioactive et bactéricide des infections utérines aigües et chroniques.

Pansements utérins, 2 formes :

1^o — CRAYONS

Présentation. — Crayons stérilisés à base d'organate d'argent et de bromure de radium, dosés à 4, 5 et 10 micros.

Indications. — Métrites, Affections du col et du corps. — 2 applications par semaine (Consulter la notice).

N.-B. — Utiliser pour l'application notre appareil "Porté-pansement" spécial.

2^o — OVULES

Indications. — Tous les cas d'infections des voies génitales. Un ovule tous les 3, 4 ou 5 jours.

Demander renseignements et littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE

Docteur en Pharmacie. — Lauréat de l'Institut.

22, Rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

LEVULOSE ROGIER

Aliment hydrocarboné assimilable par le diabétique. Remplace le sucre ordinaire dans ses emplois.

Indications. — Diabète.

Forme et Dose. — Solution 2 à 4 cuillerées à dessert par 24 heures.

L'influence passagère de l'insuline peut être prolongée par un régime équilibré.

D'autre part, l'adjonction à ce régime, soit de Vitamine B, soit de Lévulose ou du mélange de ces deux corps, permet d'espacer les injections d'insuline et de rendre mieux opérante une même dose de cette substance.

(Communication faite à l'Académie des Sciences, séance du 22 Octobre 1923).

Littérature et échantillon sur demande.

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie.

49, Avenue de Villiers. — PARIS

LEVURINE EXTRACTIVE

Description. — Comprimés de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

Action Thérapeutique. — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme poisons vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 12 comprimés par jour dans les cas d'abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

LIENTINE GRÉMY

LAXATIF-VACCIN

Formule. — Principes actifs totaux et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais :

Corps thyroïde	0 g. 05
Muqueuse intestinale..	1 g.

Sels biliaires	0 g. 10
Evonymine	0 g. 003
Extraits de cascara et de bourdaine..	ââ 0 g. 005

Bactérium coli .	} ââ 150 millions
Enterocoques . .	
Bacillus proteus	
Staphylocoques	

pour 1 pilule.

Doses et Mode d'emploi. — Quatre pilules par jour : deux avant chaque repas.

Indications. — Constipation par atonie intestinale, par hypertonie intestinale, par insuffisance sécrétoire de l'intestin; entéro-colite muco-membraneuse.

LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de cervelle de mouton

Ampoules de 2 cc. contenant 0,20 d'extrait.
Dragées dosées à 0 gr. 05 d'extrait.

Propriétés therap. — Agit par lipoides phosphorés qu'elle contient : cholestérine, lécithine, etc..

Antitoxique, sédative, anticonvulsivante et tonique.

Indications. — Etats dépressifs, Neurasthénie, Mélancolie, Epilepsie, Hystérie, Paralysie générale.

Doses. — Une injection tous les jours pendant 10 à 12 jours ou deux dragées avant chaque principal repas. Dans les cas graves, doubler les doses.

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE

52, Rue La Bruyère — PARIS

Télégramme : Chevreematte, Paris

LIPOCYTOL GRÉMY

Modification du terrain tuberculeux dans l'intervalle des poussées évolutives.

Thérapeutique de restauration organique destinée à rétablir l'équilibre lipoidique et à restaurer la déminéralisation de l'organisme. Thérapeutique polyglandulaire, hépatique, splénique, surrénale, pulmonaire, thyroïdienne, parathyroïdienne, et fluor organique.

Doses et mode d'emploi. — Huit à dix pilules par jour en plusieurs fois dans la journée, en dehors des repas.

Indications. — Prétuberculose, scrofule, lymphatisme, tuberculose ganglionnaire, tuberculoses osseuses, tuberculose pulmonaire chronique, en dehors des poussées évolutives

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

LIPOFÉINE

Médicament eupnéique.

Ethyl-diiodo-brassidate d'éthyle-caféine.

Active le travail du cœur, abaisse la tension artérielle, fluidifie les sécrétions bronchiques, facilite l'expectoration, dissipe la dyspnée et régularise le rythme respiratoire.

Indic. — Etats dyspnéiques en général, plus particulièrement asthme et emphysème, catarrhes, bronchites et laryngites chroniq.

Doses. — 1 à 4 comprimés par jour. Chaque comprimé contient 0 gr. 12 d'iode et 0 gr. 05 de caféine. Périodes de traitement de 15 à 25 jours.

Le tube de 15 comprimés : 10 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

LIPOGYRE CIBA

(Lipiodine-Hg)

Médicament iodo-mercuriel

Combinaison iodo-mercurielle de l'éther éthyl-diiodobrassidique (lipiodine), réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure avec exaltation de l'activité thérapeutique de chacun de ses composants.

Indicat. — La syphilis dans ses diverses manifestations et particulièrement dans ses accidents tertiaires et secundo-tertiaires. (Cures d'entretien et de sécurité.)

Doses. — 1 à 5 comprimés par jour aux repas. Chaque comprimé contient 0 gr. 15 d'iode et 0 gr. 02 d'Hg.

Le tube de 20 comprimés : 9 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

LIPOÏDES ISCOVESCO

Lipophosphatides de tous les organes

Formes :

- 1° Ampoules huileuses pour injections hypodermiques.
- 2° Pilules kératinisés.

Adrénol Cortex, Adrénol Total,
Androcrinol, Cardiocrinol,
Cérébrocrinol, Entérocrinol,
Gastrocrinol, Gynocrinol, Gynolutéol,
Hémocrinol, Hépatocrinol, Hypophysol,
Mammol, Néphrocrinol, Pancréol,
Placentocrinol, Prostatocrinol,
Pulmocrinol, Splénocrinol,
Thymocrinol, Thyrol A.

Indications :

Chaque lipoïde constitue un aliment et un excitant, spécifique de l'organe dont il provient.

LIPOÏDES ASSOCIÉS

Polycrinol : Thyrol — Adrénol total et Hypophysol.

Andro-Polycrinol : Androcrinol — Thyrol — Adrénol total et Hypophysol.

Gyno-Polycrinol : Gynocrinol — Thyrol — Adrénol total et Hypophysol.

POSOLOGIE

1 injection hypodermique ou 4 à 8 pilules par jour.

AFATYL

Médication iodée sensibilisée.

Association d'iode et de lipoïde thyroïdien).
 (Arthritisme, Obésité thyroïdienne, Rhumatisme chronique, Artériosclérose).

Laboratoire Isoovesco

PARIS (XVII^e) — 107, Rue des Dames

Téléphone : Marcadet 59-28

Adresse télégraphique : Lipoïdes - PARIS

LIPIODINE CIBA

Iode organique assimilable

Diiode-brassidate d'éthyle, 41,1 % d'iode. D'une élimination plus lente que les iodures de potassium et de sodium, la lipiodine remplace avantageusement ces deux médicaments à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

Indicat. — Celles de l'iode et des iodures : Artério-Sclérose, hypertension artérielle. Angine de poitrine. Affections des voies respiratoires. Rhumatisme chronique, Obésité, Goitre, Sérofulc, Adénopathies, Syphilis, etc.

Doses. — Adultes : 1 à 7 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. Enfants : $\frac{1}{2}$ à 3 comprimés (aux repas principaux).

Le tube de 20 comprimés : 9 francs.

La boîte de 6 ampoules : 15 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

LISERONINE DAVYSONN

Traitement végétal des Affections rhumatismales

Indications. — Goutte, Gravelle, Rhumatismes goutteux.

Mode d'emploi. — Le matin, à jeun, 2 à 3 cuillerées à soupe dans un demi-verre d'une infusion. Toutes les 48 heures en cas de persistance de l'accès.

Autres formes : Baume Davysonn antigoutteux.

Mode d'emploi. — Onctions légères sur les parties endolories.

Pilules préventives du Dr Davysonn. Complément du traitement par la *Liseronine*.

Mode d'emploi. — Pendant un mois, au printemps et un mois à l'automne, deux pilules avant le déjeuner et deux avant le dîner.

Poudre alcaline antidyspeptique.

Mode d'emploi. — Un paquet par jour, dans un litre d'eau.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS

LISTOSE VICARIO

Huile de paraffine chimiquement pure
Spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale.

(La première en date en France.)

MANQUAT, Académie de Médecine, 27 janvier 1914.
(*Paris-Médical*, 25 avril 1914.)

VICARIO, Nouvel emploi pour usage interne. (*Journal
de Pharm. et de Chim.*, 14 février 1914.)

Laxatif mécanique, doux, inoffensif, non assimila-
ble, non fermentescible.

La LISTOSE se présente sous deux formes :

LIQUIDE (légèrement aromatisée)

GELÉE (consistante et sucrée)

Mode d'emploi. — Liquide : Une cuillerée à soupe
matin et soir. — Gelée : Une cuillerée à café
matin et soir.

Indications. — Constipation, Entérites, Colites
etc. Pendant la grossesse et après les opérations
intestinales.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (9^e)

LUATOL

Tartro-bismuthate de sodium

et de potassium soluble

Thérapeutique bismuthique de la
syphilis par la voie intramusculaire,
préconisée chez les malades arséno
et mercuro-résistants.

Délivré en ampoules de 1 cm³ conte-
nant 0 gr. 10 de produit actif.

Littérature franco sur demande

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (3^e)

R. C. Paris 5386

LUSOFORME

(Formol saponiné)

1 cuillère à café ou 5 gr. = 1 gr. de Formol à 40 %.

Lusoforme médical. — Antiseptique général de 1/2 à 1 %.

Lusoforme brut. — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 %.

Le Lusoforme est un savon légèrement alcalin liquide contenant 20 % de formol et stérilisé à l'autoclave.

Laboratoires CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

MAGNÉSIE LOURDE de DUREL

Magnésie anglaise calcinée .

Cette Magnésie présente les avantages suivants :
Elle ne possède aucun goût et se mêle facilement à tous les liquides.

Elle est éminemment active et ne provoque jamais de coliques.

Elle agit, suivant la dose, comme un simple laxatif ou comme un purgatif énergique.

Elle ne provoque pas l'accoutumance ni la paresse consécutive intestinale, de sorte qu'elle peut être employée indéfiniment.

Cette qualité la rend précieuse dans toutes les affections hépatiques où son emploi journalier permet l'élimination régulière de la bile.

Posologie. — Une cuillerée à café, le soir.

Laboratoire DUREL

7, boulevard Denain — PARIS

MALT BARLEY

Bière de santé, non alcoolisée, tonique, digestive, pasteurisée, phosphatée.

Dose et mode d'emploi. — Se consomme comme toute boisson ordinaire.

Indications. — Maladies de l'estomac et de l'intestin, anémies, convalescence, maigreur, rachitisme, suralimentation des nourrices.

Dépôt général :

BRASSERIE FANTA

6, rue Guyot. — Paris.

MALT PAILLETÉ PROGIL

Extrait de Malt cristallin garanti pur

Préparé par évaporation dans le vide des liqueurs extractives du Malt. Renferme la totalité de la diastase, du maltose, des phosphates naturels, de la leïcithine, des peptones et des vitamines.

Lactogène. — Produit sans alcool, sans risque d'intoxication, convient à tous les cas d'hypogalactie, augmente la quantité et la qualité du lait.

Reconstituant. — Aliment très concentré, de digestibilité parfaite et de goût très agréable. Fatigue, surmenage, convalescences retardées, anémie des nourrices.

Il s'associe très bien aux "DIASES PROGIL", farines fraîches diastasées (voir page 115) et cet ensemble constitue alors une suralimentation idéale.

PROGIL, Sté Anonyme au Capital de 50.000.000 de fr.

PARIS (X^e) - 6, boulevard de Strasbourg.

LYON (IV^e) - 10, quai de Serin.

MALT WANDER OU GLOMA

Extrait de Malt avo

Composition. — Matières azotées 5, 87 %, Hydrates de Carbone (maltose et dextrine) 89, 17 %, Substances minérales 1, 56 %, Eau 3, 40 %, (Acide phosphorique en pour cent des substances minérales 9 %.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Aliment végétal, nutritif et digestif. Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérocélite chronique par insuffisance amylolytique. Scorbut et maladies par avitaminose. Permet la préparation des bouillies maltées.

Malt Wander (glom) à l'Iodure de Fer

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0, 12 grs. de proto-iodure de fer.

Indications. — Répond aux indications du fer et de l'iodure. Chez les lymphatiques, les chloro-anémiques, les adénocéphes dans le traitement interne des dermatoses—remplace avec avantage et agréablement l'huile de foie de morue. L'extrait de malt évite les inconvénients de la médication ferrugineuse et de l'iodurisme.

Malt Wander (glom) au Pyrophosphate de Fer

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0, 40 grs de pyrophosphate de fer.

Indications. — Réunit les propriétés nutritives et digestives du malt aux propriétés du fer sur le sang et du phosphore sur les nerfs. Le malt facilite l'assimilation de ces derniers; son action légèrement laxative, corrige, en outre celle, un peu constipante du fer.

Anémie, surmenage intellectuel et physique, convalescence.

Malt Wander (glom) à l'Hémoglobine

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 3 grs. de sang pore intégral.

Indications. — Augmente la richesse du sang en fer, et son pouvoir de fixation de l'oxygène. Très soluble, aisément assimilable, ne constipe pas et n'irrite pas les voies digestives.

Malt Wander (gloma) au Carbonate de Galacol

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0,35 grs. de Carbonate de galacol.

Indications. — Médication des bronchites et pneumopathies diverses, en particulier de la tuberculose. Répond aux nombreuses indications de la créosote, sans en avoir ni sur les voies digestives, ni sur la circulation pulmonaire, les inconvénients redoutés.

Malt Wander (gloma) aux Glycérophosphates

Composition. — 1 cuillerée = 0,40 grs. de Glycérophosphates combinés, de chaux, de soude, de fer, de magnésie.

Indications. — Convalescence des maladies aiguës (grippe, bronchites, typhoïdes, etc.) Surmenage, déminéralisation anémie, tuberculose. L'extrait de malt facilite la digestion et favorise l'assimilation des médicaments qui lui sont, ici, associés.

Malt Wander (gloma) au Phosphate de Chaux

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0,15 grs. de chlorhydrophosphates de chaux.

Indications. — Contribue par son phosphore à la nutrition du système nerveux, par sa chaux à celle des tissus osseux (rachitisme, scrofule, etc.) Permet la cure de récalcification dans la tuberculose. Utile aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Doses. — *Enfants*: 1-3 cuillerées à café 3-4 fois par jour.
Adultes: 1-3 — soupe 3-4 — —

Au début des repas pur ou dissous dans de l'eau ou du lait

Etablissements WANDER

58, Rue de Charonne — PARIS (XI^e)

“ MALTASE FANTA ”

Extrait sec de malt, préparé à froid d. le vide. Aliment-ferment. Toni nutritif. Digestif. Nervin. Minéralisateur. Renfermant la totalité des ferments et des substances solubles de l'orge germé. Entièrement soluble dans l'eau.

Composition

Humidité	2.000	%
Cendres	0.900	»
Matières albuminoïdes	3.325	»
Acidité ou acide phosphorique...	0.500	»
Maltose	60.730	»
Saccharose	10.605	»
Dextrine	21.940	»

Mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café ou plus suivant le cas.

Indications thérapeutiques. — Dyspepsies. Entérites muco-membraneuses. Sevrage des nourrissons. Nourriture des enfants en croissance. Augmentation de la sécrétion lactée chez les nourrices. Suralimentation des malades et convalescents.

BRASSERIE FANTA. — 6, r. Guyot. PARIS

MALTOSAN

Soupe maltée en poudre

Composition. — Maltose 30 %, Dextrines 25 %, Céréales 40 %, Sels minéraux 2 %, H₂O 3 %, Diastases.

Indications. — Affections gastro-intestinales de la première et seconde enfance : diarrhée estivale, dyspepsies diverses, etc. Réussit dans les cas les plus rebelles. Rend aisé le sevrage et en évite les périls.

Doses. — 2 cuillerées à café par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 cuillerée nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer. Retirer du feu avant le premier bouillon.

Etablissements WANDER

58, Rue de Charonne — PARIS (XI^e)

MANGAÏNE

Peroxyde de Manganèse,
chimiquement pur.

Forme et Dose :

Tablettes 0,10 de Peroxyde de Manganèse.

Propriétés therap. :

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

Indicat. therap. :

Dyspepsies gastro intestinales, Anémies

Dose :

4 à 6 tablettes par jour.

Pharmacie SCHMIT

71, Rue Sainte-Anne — PARIS

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques est devenu le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du médecin.

MANGANO PHOSPHAL Julien

(GOUTTES)

Composition :

Acide phosphorique.....	1000
Glycérophosphate de soude.....	1000
— de potasse .. .	500
— de chaux.....	250
— de magnésie...	100
— de manganèse	150
Nucléinate de Manganèse à satur.	

XX gouttes contiennent :

Glycérophosphates divers	0 gr. 90
Acide phosphorique.....	0 gr. 50
Sels de manganèse .. .	0 gr. 10

En solution sans alcool et sans sucre.

Propriétés et indications. — Puissant reconstituant. Sans aucun toxique convenant à tous.

Médication Mangano-phosphorée intensive.

Enfants. — Manque d'appétit. Retards de la dentition et de la marche. Rachitisme. Insuffisance du poids et de la taille. Trouble de la nutrition.

Adultes. — Anémie, faiblesse, neurasthénie, surmenage intellectuel et physique. Convalescence. Carie dentaire. Phosphaturie. grossesse, allaitement.

Vieillards. — Dépression, faiblesse. Troubles nerveux, fatigue avec hypertension.

Posologie. — *Enfants.* — 2 gouttes par jour, par année d'âge dans un peu d'eau sucrée.

Adultes. — 20 gouttes à chacun des repas de midi et du soir dans 1/3 verre de liquide.

Aucune contre-indication.

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris
105, rue de Rennes (angle de la rue d'Assas)
PARIS (6^e)

MANGANXYL

Composition. — Cassinate de Manganèse, produit organique défini, obtenu par un procédé personnel.

Action. — Le plus hydrolisable des composés de manganèse - vitaliseur puissant et inoffensif - augmente l'intensité des oxydations organiques - renforce l'action des diastases intracellulaires et des vitamines alimentaires - antitoxique et énergétique.

Indications. — Vitalité ralentie des enfants - asthénie - convalescence - auto-intoxications et surtout *Basedow* et *Tuberculose*.

Forme et Mode d'emploi. — *Adultes* : cachets à 0 gr.50 (10 fr. la boîte), 3 cachets par jour.

Enfants : granulé aromatisé à la framboise dosé à 0 gr.25 par cuillerée à café - 1 à 3 cuillerées à café.

Laboratoires du Docteur FIALIP

23, Avenue de la Motte-Picquet - PARIS

MARINOL

Reconstituant Marin inaltérable, de Goût Agréable.

Compos. — Eau de mer captée au large, stérilisée à froid ; Iodalgol (iode organique) ; Phosphates calciques en solution organique ; Algues marines iodifères avec leurs nucléines azotées ; Méthylarsinate disodique.

Ni alcool, ni huile. Pas d'intolérance. Pas d'iodisme. Entièrement assimilable en été comme en hiver. Convient à tous les âges. Médication de durée illimitée. Goût très agréable. Meilleur succédané de l'huile de foie de morue dont il a la même origine marine.

Propriétés. — Reconstituant, Tonique, Dépurateur.

Indications. — Toutes manifestations de l'Anémie, du Lymphatisme, du Rachitisme et de la Scrofule. Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire et osseuse. Mal de Pott. Bronchites. Asthme. Convalescences. Neurasthénie. Maladies consomptives. Dyscrasies. Troubles de la croissance, etc.

Mode d'emploi et Doses. — Avant ou après les repas, pur ou dans un peu d'eau. Grandes personnes: 2 à 3 cuill. à soupe. Enfants: 2 à 3 cuill. à dessert. Nourissons: 1 à 3 cuill. à café.

Prix réglementé : 10 fr. le flacon (sans impôt)

Remises sur commandes médicales

Préparé par les Laboratoires " LA BIOMARINE "
à DIEPPE (Seine-Inférieure)

MENOVARINE

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

Deux indications :

Maladies veineuses ; troubles congestifs de la fonction ovarienne.

Posologie :

Deux dragées à chaque principal repas.

Laboratoires MONDOLAN

11, Place des Vosges — PARIS (IV^e)

MÉSOFORME

BACTÉRICIDE PUISSANT

DÉSODORISANT - ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

non caustique — non irritant — non toxique

(Ne tache pas le linge.)

Composition. — Solution saponifiée de thymol et de paraldéhyde, avec adjonction de sels alcalins, supprimant toute causticité.

Indications. — *Gynécologie* : Hygiène de la femme ; Leucorrhée. Nétrite. Salpingite. *Accouchements*. — *Laryngologie* : Angines. Amygdalites. Abcès. — *Stomatologie* : Gingivites, Carie.

Mode d'emploi. — *Action prophylactique* : 1 cuill. à dessert pour 2 litres d'eau bouillie, chaude. — *Accouchements et Gynécologie* : 1 ou 2 cuill. à dessert pour 2 litres d'eau bouillie chaude. — *Laryngologie* : 2 cuill. à dessert pour 1 litre d'eau bouillie, chaude. *Stomatologie* : 30 gouttes dans un verre d'eau.

Littérature et Echantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Laboratoires DORANTOWICZ

17, Avenue Parmentier. — PARIS.

MESOTHORIUM BUISSON

Solution de Bromure de Mésothorium pour injections hypodermiques, intra-veineuses ou interstitielles.

1^{re} *Solution faible (concentration A)* : dosée à 1/4 de microgramme par c. c. Injecter de 1 à 3 c. c. par jour pendant une à deux semaines. Indications : artério-sclérose, états asthéniques et anémiques, pré-tuberculeuse.

2^e *Solution moyenne (concentration B)* : dosée à un microgramme par c. c. Indications : Rhumatismes, goutte, manifestations blennorrhagiques (orchite, rhumatisme), sciatiques, anémies graves, leucémie, cancers. Injecter de 1 à 3 cc. par jour pendant 10 à 12 jours.

3^e *Solution forte (concentration C)* : dosée à 2 microgrammes par c. c. S'emploie en injections interstitielles dans les cancers accessibles.

Stimulation puissante de l'organisme et de l'hématopoïèse. Décharges d'acide urique. Antinfectieux. Action analgésique.

Etablissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres — PARIS

R. C. Seine 147.023

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

METARSENOBENZOL SACA

(914 Français)

*Fournisseur de l'Etat et
de l'Assistance Publique***INJECTIONS INTRAVEINEUSES**

parfaitement tolérées
même aux doses les plus élevées
de 0 gr. 10 à 1 gr. 05.

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES

en solution directement injectable
indolore
de 0 gr. 01 à 0 gr. 50.

CONCESSIONNAIRE :**A. M I L L E T**

5, Rue Ambroise-Thomas — PARIS (9^e)
Télép. Bergère 58-43

Echantillons sur simple demande.

MÉTRITOLS

Comprimés effervescents, alcalins, astringents
antiseptiques

Composition.

Acide picrique, thymol, bicarbonate et
borate de soude, formaldéhyde. Parfum
agréable des essences alpestres.

Propriétés thérapeutiques.

Donnent des résultats merveilleux dans
les leucorrhées de toute nature.

Mode d'emploi.

Injectons vaginales. Un comprimé dans
un litre d'eau bouillie chaude 40 à 45°. Posi-
tion couchée, hoch très bas.

Laboratoire LEES

PARIS — 124, Rue du Bac, 124 — PARIS

MIALBAÏNE

Solution d'ouabaïne à 1/1000, XXV à C
gouttes par 24 heures.

Pharmacie du docteur MIALHE

8, rue Favart — PARIS

MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication leucogène organique phospho-ferro-iodo arsénisée (entièrement assimilable)

Forme. — Sirop (saveur agréable sans action nocive, ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

Compos. — Iode physiologique stable et inaltérable; fer organique d'origine protéique, entièrement assimilable; sel sodique de l'acide phospho-glycérique; méthylarsinate disodique; rhumex frangula.

Action physiol. — Stimulant des organes lymphoïdes et des sécrues; modificateur vaso-moteur; excitant des organes hématopoïétiques; reminéralisateur puissant; tonique général; excitant de la nutrition.

Indicat. — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoïdes, impétigo). Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (humatisme chronique, artériosclérose, rachitisme, infantillisme). Convalescences de toutes les maladies.

Fosologie. — de 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour; de 5 à 10 ans 2 à 3 cuillerées à dessert par jour; de 10 à 18 ans, 2 cuillerées à potage par jour; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour. (Avant les repas dans un peu d'eau).

(Échantillons et Littérature)

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, Avenue Parmentier, 17 bis
Paris (XI^e) — Téléphone : Roquette 14-12

MORRHUETINE JUNGKEN

Forme et Composition. — Liqueur à base de glycérine pure contenant : iode métallique 0,015 mgr. Hypophosphites composés (NaO, CaO, Manganèse, en tout 0,15 cgr. par cuiller à soupe. Phosphate de soude : 0,15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable ; pas d'irritation des muqueuses ; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

Propriétés. — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

Indications. — Anémie, lymphatisme, tuberculose convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

Doses et Mode d'emploi. — *Enfants* : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — *Adultes* : 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau au début des principaux repas.

BRACQUEMOND & C^e

Anciens Laboratoires J. DUHÈME
105, Rue de Normandie — COURBEVOIE (S.)

R. C. Paris 265.267 B

MORRHUOL

Composition. — Principes actifs de l'huile de foie de morue isolés de la matière grasse.

Chaque capsule correspond à 5 grammes d'huile de foie de morue dont le **Morrhuel** supprime le goût désagréable et la mauvaise digestibilité.

Indications. — Lymphatisme, débilité, scrofule, rachitisme, affections chroniques de l'appareil respiratoire sous toutes ses formes.

Action. — Reprise rapide de l'appétit et des forces, augmentation du poids, diminution de l'expectoration et de la toux.

Mode d'Emploi. — *Adultes* : 4 à 8 capsules par jour, à prendre au début des 2 principaux repas. — *Enfants* : 2 à 4 capsules par jour.

LABORATOIRES DU DOCTEUR CHAPELLE,
8, Rue Vivienne — PARIS

MORUCALCIUM

Composition. — Poudre d'os frais 0,70. Extrait lipodique d'huile de foie de morue 0,05.

La boîte de 42 cachets : 10 francs

Action. — Utilise la propriété antirachitique de l'huile de foie de morue pour fixer le calcium sur l'organisme.

Succédané de l'huile de foie de morue — n'a pas son mauvais goût et ne fatigue jamais l'estomac.

Indications. — Tuberculose, Rachitisme, Basedow, Allaitement, Fractures, Mauvaise dentition.

Mode d'Emploi. — *Adultes* : 1 cachet après chacun des 3 repas.

Enfants : Ouvrir un cachet, verser le contenu dans un peu de confiture — à faire prendre en 3 fois.

LABORATOIRES DU DOCTEUR FIALIP
23, Avenue de la Motte-Picquet — PARIS

MUCINUM (*Comprimés de*)

Composition. — Association de nombreux produits végétaux ou organiques (à l'exclusion de tout drastique), dont chacun à la dose utilisée serait sans action, mais dont l'ensemble réalise une véritable synergie laxative.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

Forme. — Petits comprimés très friables, sans saveur, pouvant être croqués ou avalés.

Posologie. — 1/2 à deux comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

Prix : 4 fr. la boîte (de 40 comprimés environ)

LABORATOIRE R. CHANTEREAU

8, rue de Constantinople - PARIS

MUCOSODINE

Antisepsie des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

Composition. — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

Propriétés. — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, Rhinites Rhume des Foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Oites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale. Gargarismes. Bains de bouche, irrigation.

Le Flacon : 6 francs

Laboratoires CAILLAUD

25, rue Drouot — PARIS

Téléph. : Cent. 50-92

MUSCULARGYRE

Compos. — Chaque ampoule contient 1 cgr. d'oxycyanure de Hg dans un sérum spécial.

Avertis. Ce produit ne s'injecte que par voie intra-musculaire (région fessière, au niveau de la zone rayée du schéma qui est joint à chaque boîte du produit). Grâce à sa composition, il ne détermine qu'un léger endolorissement local qui disparaît rapidement.

Indications. — Traitement de la spécificité à toutes ses périodes. A employer, en raison de sa grande activité, à la place du Veinar-gyre, lorsque celui-ci ne peut être utilisé parce que les veines sont trop petites ou oblitérées.

Posologie. — Injections tous les 2 ou 3 jours. Rapprocher ou espacer les injections selon les indications cliniques. Suspendre quelques jours en cas d'intolérance (stomacale, intestinale, etc.)

Labor. RAFFY. R. FEIGNOUX, phar. 1^{re} cl, 29, rue des Jardiniers. Montreuil (Seine)

MUSCULOSINE BYLA

Jus de Viande Crue hyperactivé par les oxydases globulaires, les hormones spléniques, le manganol et les vitamines cardio-hépatomusculaires.

Prop. thérap. — Antibacillaire, Toni-nutritif, Excitant physiologique.

Indications. — Convalescence, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à bouche aux repas, dans la boisson préférée, toujours froide ou tiède, gazeuse de préférence. (Voir page 481).

ZOMO-MUSCULOSINE BYLA

(Musculosine concentrée)

Les Etablissements BYLA

26, Avenue de l'Observatoire — PARIS

R. G. Seine 71.893

MUTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère porphyrisé

Indications.

Syphilis à toutes ses périodes.

Dose normale.

Ampoule de 2 cc. renfermant 13 cg. de Bismuth métal.

Pour enfants: ampoules de 1 cc. renfermant 2 cg. 6 de Bismuth métal.

Mode d'emploi.

Une ampoule tous les deux jours ou 2 ampoules tous les 5 jours. Dans les cas rebelles : 2 ampoules tous les 2 jours.

Traitement de sécurité.

Suppositoires Muthanol.

La bte de 10 ampoules (dose normale) 25 fr.

Littérature sur demande

Laboratoire du MUTHANOL : G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg. — Paris-Xe

R. C. Seine 143.281

MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN

Solution colloïdale phagogène polyvalente. —

Provoque la phagocytose. — Prévient et guérit la plupart des maladies infectieuses de l'homme.

Formes et doses :

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuill. par jour.

Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuill. par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

Indications. — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc...

P. LEBEAULT & C^{ie}

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (3^e)

NAIODINE

Nal injectable, stabilisé par procédé spécial, en ampoules de 2 cc. et de 5 cc. contenant 0,61 cgr de sel hyperactif par cc.

Prépr. — Inaltérable, absolument indolore, immédiatement assimilable, la NAIODINE réalise l'analgésie atoxique continue, modificatrice et curative de toute douleur spasmodique, névralgique et inflammatoire par imprégnation iodique de la cellule nerveuse. Elle permet ainsi de supprimer l'usage des stupéfiants dans le traitement des algies rebelles et dans le morphinisme.

Indic. — Tout syndrome douloureux aigu ou chronique, dyspnées, emphysème, bourdonnements, zona, lumbago, sciatique, névralgies faciales et intercostales, lésions, névrites, rhumatisme articulaire aigu, arthrites chroniques, toxicomanies, rhumatisme déformant, etc.

Posologie. — Injection intramusculaire ou sous-cutanée profonde, indolore à distance ou mieux loco dolenti :

Traitement d'attaque : 2 à 4 amp. de 5 cc par jour.

Traitement d'entretien : 2 à 4 amp. de 2 cc par jour, en une ou plusieurs piqûres.

Ne pas craindre d'agir vite et énergiquement. Aucune incompatibilité ni contre-indication, selon l'âge ou l'état du malade. Aucune réaction. Ni iodisme, ni accumulation.

Laboratoires LOGEIS

23^{me}, rue de Silly. — BOULOGNE-s/SEINE, près PARIS.

NARCYL Grémy

Médicament spécifique de la Toux.

Laryngites, Bronchites, Coqueluche

En particulier : *Toux de la Tuberculose.*

Sirop dosé à 0 gr. 03 ctg. de Narcyl (chlorhydrate d'éthyl narcéine synthétique).

Doses :

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour.

ENFANTS : 2 à 4 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour.

— 4 à 7 ans : 4 à 5 cuill. à café par jour.

— 7 à 15 ans : 1 à 2 cuill. à bouche par jour.

Laboratoires P. LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (11^e)

NARSÉNOL

Comprimés de Novarsénobenzol à 0 gr. 10 pour l'administration par la voie buccale.

Un enrobage spécial assure la bonne conservation du produit.

Dose moyenne : 1 à 4 comprimés par jour, qu'on avale comme des pilules, soit en entier soit en 3 ou 4 fragments.

Principales applications. — Grippe, amibiase, spirochétose, angine de Vincent, diarrhées, paludisme, pian, traitement d'entretien de la syphilis.

Littérature sur demande.

Les Etablissements POULENC Frères
et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

NATIBAÏNE

Seule association de la DIGITALINE
NATIVELLE et de l'OUABAÏNE ARNAUD

Formes. — Solution glycéro-alcoolique au millième renfermant 1/3 de Digitaline Nativelle et 2/3 d'Ouabaïne Arnaud.

Indications. — Myocardites av. tachycardie. Hypertendus en voie d'arythmie complète avec diminution manifeste du tonus myocardique.

Doses. — Petites doses prolongées : X à XX gites par 24 heures. Doses moyennes : XX à XXX gites par 24 h.

Echantillons et Littérature :

LABORATOIRE NATIVELLE
49, Boulevard de Port-Royal. — Paris

NEO-ARSYCODILE

Méthylarsinate disodique
(Syn. Arrhénal)

Indic. thér. — Tous les avantages de l'arsenic organique. Plus particulièrement destiné à l'usage interne par la voie gastrique.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0.01 : 4 à 5 ou plus par jour aux repas, pendant 12 jours, repos 8 jours et reprise.

Ampoules à 0,05, même usage que pour l'ARSYCODILE et spécialement dans le paludisme.

Docteur M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

NÉO-DMÉGON

(Vaccin antigonococcique curatif)

Injections sous-cutanées ou intramusculaires, tous les deux jours, à toutes les périodes de la blennorrhagie; efficace contre tous les accidents dus au gonocoque : orchites, rhumatisme blennorrhagique, conjonctivite purulente, vulvo-vaginite des petites filles, *affections gynécologiques*, localisations viscérales.

Peut s'associer au Néo-Dmesta dans certaines Métrites et Salpingites à flore microbienne complexe (gonocoques, staphylocoques, etc.)

(Voir vaccins atoxiques stabilisés).

Littérature sur demande.

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

NÉO-DMESTA

(Vaccin antistaphylococcique curatif)

Utilisé avec succès dans toutes les affections dues au staphylocoque : furoncles, anthrax, acné, sycosis, ostéomyélite, etc.

Il s'associe au Néo-Dmègon dans certaines métrites et salpingites.

Injections sous-cutanées ou intramusculaires, tous les deux jours.

Aucune contre-indication ; ne provoque pas de réaction.

(Voir vaccins atoxiques stabilisés)

Littérature sur demande.

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 53286

NÉO-DMÉTYS

Vaccin curatif et préventif
de la coqueluche

Résultats très favorables, tant dans la prophylaxie des sujets sains que dans le traitement des malades dont il fait disparaître les quintes et améliore l'état général ; ne provoque aucune réaction.

Injections sous-cutanées ou intramusculaires, tous les jours ou tous les deux jours, jusqu'à 8 injections et davantage.

Deux ou trois injections, à 48 heures d'intervalle, assurent la prophylaxie.

(Voir Vaccins atoxiques stabilisés)

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

NÉO-LAXATIF CHAPOTOT

L A X A T I F

Composition. — Suc d'orange et manne.

Forme. — Sirop.

Indications. — Laxatif agréable pour les enfants, les dames et les personnes âgées ou affaiblies.

NE RENFERME
NI PRODUITS CHIMIQUES,
NI PHTALEINE DU PHENOL
NI DRASTIQUES,
NI STUPEFIANTS

Peut être donné aux enfants,
même nouveau-nés.

Posologie. —

Enfants du premier âge: 1/3 à une cuillerée à café.

Enfants de 3 à 5 ans: une à deux cuillerées à café.

Enfants de 6 à 14 ans: une à deux cuillerées à entremets.

Adultes: une à deux cuillerées à soupe.

S'il y a lieu, augmenter les doses jusqu'à effet actif, pour revenir ensuite à des doses moindres mais suffisantes.

LABORATOIRES CHAPOTOT

56, boulevard Ornano

18 et 21, rue Championnet

PARIS-XVIII^e

Registre du Commerce Paris 29.019

Agent Général pour la Belgique :

A. CHOCAT, 86, rue du Méridien — BRUXELLES

NEO-RHOMNOL

Rhomnol Strychno-Arsénié
(Nucléinate de Strychnine défini
et Cacodylate de Soude)

Indic. Thér. — Neurasthénies, Grippe, Convalescences, Intoxications, Dépressions nerveuses, Etats cachectiques, Suites d'infections, etc.
(Spécificité.)

Mode d'emploi. — Tous les jours une ampoule, deux dans les cas graves. Habituellement, la boîte de 12 étant terminée, on institue un repos d'une semaine, suivi de la reprise des piqûres, si c'est nécessaire.

Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

NÉO-RIODINE .

$C^7 H^8 O^4 I S Na$

Composition. — Dérivé sodique à 44 % d'iode organique en solution aqueuse injectable.

Né contenant pas de potassium.

Forme. — 10 ampoules de 5 cm³.

Propriétés physiologiques. — Action immédiate et intensive. Résorption certaine et rapide facilitant les injections intraveineuses. Sans iodisme.

Indications. — Affections cardio-vasculaires. Artéria-sclérose, cardio-sclérose, myocardites chroniques, hypertension, etc. Affections respiratoires chroniques; Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc. Affections diverses: Obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication Iodée ou Iodurée est indiquée.

Doses. — En injections intraveineuses ou intramusculaires de 1, 2, 3 à 5, ce suivant les cas.

Prix : 13 fr. 50 la boîte (sans impôt)

Laboratoires P. ASTIER

41 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (16^e)

NÉO-TRÉPOL

Traitement de la syphilis par le Bismuth. Médication intra-musculaire en ampoules stérilisées.

Spirillicide à base de bismuth précipité dosé à environ 96 % de Bi, en milieu isotonique.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'Hygiène.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation,

Demandez renseignements et littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDÉ

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut

22, Rue de la Sorbonne — PARIS (V)

NÉOBY

Hg TROUETTE-PERRET

Cure d'entretien de la syphilis

Médication « per os ». — Pilules glutinisées et vernissées d'iodobismuthate vanadique et calomel.

Indications. — Syphilis nerveuse (tabès) Epilepsie et paludisme quinio-résistants.

Posologie. — Une pilule avant les deux principaux repas.

NÉOBY TROUETTE-PERRET

Iodo bismuthate-vanadique

Traitement d'attaque de la Syphilis.

En ampoules de 2 cc contenant 0 gr. 16 de sel actif par cc, en suspension huileuse stérilisée à 20 % de Bi-métal.

Spirillicide très puissant et reconstituant globulaire sanguin.

Littérature spéciale et échantillons sur demande adressée aux :

LABORATOIRES TROUETTE-PERRET

15, r. Immeubles-Industriels. PARIS-XI*

NÉOL

Constitution. — Préparation aqueuse peroxy-sulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Ozone naissant.

Propriétés. — Aucune toxicité, antiseptique-cicatrisant, essentiellement cytophylactique, kératoplastique et décongestif.

Indications. — Brûlures par le feu, le radium ou le froid, Ulcérations cutanées et muqueuses. Plaies phagédéniques, Métrites, Angines, Pharyngites.

Mode d'emploi. — L'eau néolée (*Néol 1 partie, eau 4 parties*) remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications — Attouchements, badigeonnages (Angines, Stomatites, Laryngites, Métrite et Endométrite) : *Néol pur*. — Pansements (Brûlures, Plaies diverses) : *Eau néolée*. — Gargarismes : *Deux cuill. à soupe par verre d'eau*. — Injections, grands lavages : *Quatre cuill. à soupe par injection de deux litres d'eau*.

Prix : le grand flacon de 375 gr. 6 fr. 50 (impôt compris).
— le petit flacon de 200 gr. 4 fr. —

NÉOLIDES

Compos. — Néolides = Néol solide; se différencient du produit liquide par leur réaction alcaline spécialement adaptée à l'antisepsie gynécologique, ce qui en limite l'emploi aux lavages et injections vaginales exclusivement.

Propriétés. — Par leur constitution percarbonatée source d'oxygène naissant, ils ne peuvent être irritants ou toxiques comme les produits à base de formol, alun, etc. Ils remplacent économiquement le Néol liquide, et ont toutes les indications et qualités du Permanganate de Potasse sans tacher. Discrètement parfumés, leur emploi est pratique et agréable. Pour le médecin, c'est l'antiseptique scientifique et rationnel.

Prescrire pour soins intimes et hygiéniques 1 Néolide par litre; pour Métrite, Leucorrhées, etc. : 2 Néolides par litre. Bien recommander de dissoudre d'abord le comprimé dans une petite quantité d'eau, mais bouillante ou très chaude.

Prix : la boîte de 60 comprimés 7 fr. 50 net.

Laboratoires BOTTU

Anciens Laboratoires du Néol

35, Rue Pergolèse — PARIS (16^e).

NÉOLYSE et NÉOLYSE RADIOACTIVE

Préparation à base de sels silico-magnésiens

Indic. therap. — Traitement des affections cancéreuses par les composés magnésiens insolubles.

Observ. — L'instruction profane est rédigée de manière à dissimuler la nature exacte de l'affection: le mot « cancer » ne s'y rencontre pas.

Propr. therap. — « La Néolyse » est établie d'après les observations du Prof. Robin et les arguments cliniques Richey, Delbet et J. Regnault (Acad. Médéc., avril 1918).

Formes usuelles.

Cachets (en boîte de 60)

Ampoules (en boîte de 4).

Compresses (en boîte de 10).

Néolyse radio-active (en ampoules).

Laboratoire de la NÉOLYSE: G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg. — (PARIS) X^e

NÉOPLALYSINES du D^r RIQUOIR

Néoplalysine n° 1. — (Sublimé, trypsine, arrhéнал fixés sur du bleu de méthylène.)

Cancer de la peau, Sarcome, Ulcère de l'estomac.

Néoplalysine n° 2. — (Sublimé, trypsine, arrhéнал, extrait mammaire fixés sur du bleu de méthylène.)

Hémorragies des fibromes, Cancers du sein et de l'utérus.

Néoplalysine n° 3. — (Sublimé, trypsine, arrhéнал, extrait thyroïdien fixés sur du bleu de méthylène.)

Cancer du rectum.

Prix de la boîte de 12 ampoules: 16,80 (impôt compris)

Prix de la boîte de 18 cachets: 16,80 (impôt compris)

SOCIÉTÉ DES COMPLEXES COLLOIDIAUX DU DOCTEUR RIQUOIR

MERMINOD & C^{ie}

49, Rue de Paradis — PARIS (9^e)

NERGINE HEUDEBERT

Composition. — La Nergine apporte le phosphore organique, les éléments minéraux combinés et les vitamines du germe de blé naturel et constitue un reminéralisant précieux et un stimulant des sécrétions glandulaires.

Indications. — A recommander aux enfants en voie de croissance et dans tous les troubles de la nutrition accompagnant les affections aiguës ou chroniques ; neurasthénie, anémie, tuberculose, typhoïde, surmenage et convalescence.

Excellent complément des farines lactées préparées à l'eau.

Mode d'emploi. — Pour le nourrisson, délayer dans un peu de lait, à la dose d'une à deux cuillerées à café par jour.

Pour les adultes, à prendre en plusieurs fois 4 à 6 fortes cuillerées à café par jour, dans une infusion tiède ou mélangées aux aliments habituels.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

NERVOCITHINE TISSOT

Composition et Formes. — Ampoules et Dragées.

Ampoules :

Fluorure de sodium	0,001
Nucléinate de fer	0,02
Méthylarsinate de soude.....	0,03
Glyco-phosph. de soude	0,07
Sulf. de strychnine	0,001

Dragées :

Même composition avec addition de 0 gr. 05 de Nte de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Sérum histogénique. Traitement reconstituant intensif le plus puissant.

Indications thérapeutiques. — Toutes fatigues. Toutes anémies.

Doses. — 1 ou 2 amp. par jour; 1 ou 2 dragées à chaque repas.

Laboratoire du Docteur TISSOT
34, boulevard de Clichy, Paris

NEURÈNE

En 1904 et 1905, les Prof. Pouchet et Chevalier montrèrent que l'acide valériannique et ses sels sont physiologiquement inactifs. En 1906, le Prof. Brissonnnet découvre l'éther de bornyl (dit Bornéol soluble ou Neurène)

Principe actif de la Valériane. Sans odeur

Solution contenant 0 gr. 10 de Bornéol soluble par cuill. à café. Une cuill. à café de Neurène contient la partie active de 150 gr. de racine sèche de Valériane.

Doses. — Adultes : 3 à 5 cuill. à café par jour. — Enfants : 1 à 3 cuill. à café par jour, selon l'âge.

Mode d'emploi. — Chaque cuill. à café dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide et aromatisée à la fleur d'oranger.

Prop. Thér. — Régulateur et tonique des centres nerveux.

Indications. — Toutes les Affections nerveuses, Neurasthénie, Hystérie, Spasmes, Insomnies nerveuses...

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, Rue de la Source — PARIS (16^e). — Tél. Aut. : 06-62

NEUREOL LAFARGE

Composition. — Combinaison liquide de Véronal et de Pyramidon solubilisés.

Chaque cuillerée à café contient :

Véronal.	0 gr. 35
Pyramidon	0 gr. 07
Extrait de valériane fraîche.	0 gr. 20

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif et hypnogène. Le Neuréol modère l'activité nerveuse, calme la douleur, donne un sommeil naturel avec réveil agréable.

Le Neuréol, en raison de sa composition et de son état liquide, ne donne jamais d'accoutumance, ni d'accumulation, ni d'accidents toxiques.

Indications. — Insomnie, nervosisme.

Posologie. — Hypnotique : 4 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, le soir en se couchant.

Sédatif : 1/2 cuillerée à café, matin et soir.

Le flacon 8 francs.

Laboratoire LAFARGE

45, Boulevard Lefèvre — PARIS

NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche et de Véronal pur solubilisé. Renferme 0 gr. 15 de Véronal par comprimé ou cuill. à café de solution.

A) **Dose et Mode d'emploi.** — 1° Sédatif : 1 cuill. à café ou 1 comprimé matin et soir dans de l'eau sucrée. — 2° Hypnotique : De 1 à 4 cuill. à café le soir au coucher. Enfants : 1/2 dose.

B) **Prop. Thér.** — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Epilepsie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladies de Basedow, Tics, Délires toxiques, Palpitations, Surmenage, Prurit, etc.

Contre-indication : Néant.

Prix : Solution : 8 fr. — Comprimés : 6 fr.

Laboratoire A. GENEVRIER

2, Rue du Débarcadère — PARIS

NEUROPLASMA FORT

Composition. — Ampoules de 1 cc
Cacodylate de soude.....

— de magnésie ... } aa 0.025

Glycérophos. de soude.....

Caféine 0.01

Cacodylate de strychnine... 0.0005

Indications. — Neurasthénie. Dépression physique. Convalescences. Asthénie. Faiblesse circulatoire..

Avantages. — Piqure indolore. Synergie pharmacologique.

Doses. — Une ampoule tous les deux jours.

Emploi. — Injection sous-cutanée ou, de préférence, intra-musculaire.

Echantillons :

Laboratoires A. FOURIS

13, rue Lacharrière. — PARIS-XI^e

NEUROLIPASE

Composition. — Ensemble des lipoides cérébraux.

Trois formes : Dragées dosées à 5 cgr., granulé chocolaté et ampoules injectables de 2 centim. cubes.

Propriétés thérapeut. — Le suc de substance cérébrale a été expérimenté pour la première fois par Constantin Paul en 1892, mais ce n'est qu'au cours de ces dernières années qu'on a reconnu que l'action antitoxique marquée des extraits cérébraux était due exclusivement aux lipoides.

L'action de ces substances semble être la même si on les administre « per os », ou en injections huileuses dans le tissu musculaire,

Indicat. thérapeut. — Neurasthénie, épilepsie, mélancolie, convalescence des maladies infectieuses, rachitisme, pré-tuberculose, etc...

Dose et mode d'emploi. — Adultes : 2 à 6 dragées par jour aux repas ou 1 à 3 cuillerées à café de granulé, ou 1 à 2 ampoules injectables de 2 cc pendant 15 jours par mois avec repos de 15 jours. Enfants jusqu'à 16 ans : 1 à 3 dragées ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé, ou $\frac{1}{2}$ à 1 cc d'huile injectable par 24 heures.

— Société Alsacienne de Laboratoires —

23, rue d'Ouessant, Paris-XV^e

NEUROPLASMA MASSIF

Composition. — *Ampoules de 5 cc* contenant : Cacodylate de soude, 0.25 ; cacodylate de magnésie, 0.05 ; glycérophosphate de soude, 0.10 ; Caféine, 0.01 ; cacodylate de strychnine, 1/2 milligr.

Indications. — Etats cachectiques, convalescences, tuberculose et prétuberculose, anémie, etc...

Avantages. — Piqûre indolore. Tonique immédiat, relèvement rapide du malade.

Doses. — Une ampoule tous les 2 jours ; après un repos de huit jours une nouvelle série de 12 ampoules.

Emploi. — Injection intramusculaire.

Echantillons :

Laboratoires A. FOURIS

13, rue Lacharrière. — PARIS-XI^e

NEUROPLASMINE FORT

Composition. — Pour une ampoule de 1 cc : Méthylarsinate de fer, 0.0125 ; cacodylate de soude, 0.025 ; Glycérophosphate de soude, 0.05.

Indications. — Chloro-anémie. Névroses et insomnies nerveuses. Surmenage. Entraînement sportif. Suites opératoires et anémies post-hémorragiques. Troubles de la formation.

Doses. — Une ampoule tous les jours pendant les 6 premiers jours, puis une tous les deux jours pour la fin de la série.

Emploi. — Injection intramusculaire de préférence.

Echantillons :

Laboratoires A. FOURIS

13, rue Lacharrière. — PARIS-XI^e

NEUROSINE PRUNIER

(Phospho Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier)

Prop. Thér. — Reconstituant du système nerveux.

Mode de Présentation. — La "Neurosine Prunier" est présentée sous trois formes: granulé, cachets, sirop.

Indications. — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, etc.

Posologie. — 2 à 3 cuill. à café par jour de granulé; 2 à 3 cachets par jour; 2 à 3 cuill. à bouche par jour de sirop. Chaque cuill. à café de granulé, chaque cachet et chaque cuill. à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de Chaux (Procédé G. Prunier).

G. PRUNIER & C^{ie}, (Maison Chassaing)

6, Rue de la Tâcherie — PARIS

R. C. Paris 56.718

NEUROTROPHOL BYLA

Elixir ou Granulé

A base d'extrait total de glande orchéique et interstitielle, de Nucléinate de soude, de Méthylarsinate disodique, et de Glycérophosphate de soude.

Doses et Mode d'emploi. — *Elixir* : 1 verre à liqueur après chaque repas, pour les adultes; 1 cuillerée à dessert ou à café pour les enfants. *Granulé* : 1 cuillerée à bouche avant chaque repas, pour les adultes; 1 cuillerée à café pour les enfants.

Prop. thérap. — Tonique neuro-musculaire. Excitant de la nutrition.

Indications. — Neurasthénie, Surmenage, Dépression, Sénilité, Asthénie musculaire, Insuffisances génitales.

Les Etablissements BYLA

26, Avenue de l'Observatoire — PARIS

R. C. Seine 71.895

NEVORAL RAFEY

Le NEVORAL est parfaitement toléré par les estomacs délicats; c'est en même temps un fortifiant, un tonique et un fébrifuge. Il ne contient aucun composé ou dérivé de l'opium, ni aucun hypnotique. Les actions des divers produits pharmaceutiques qui le composent se multipliant l'une par l'autre lui donnent un pouvoir thérapeutique considérable, quelles que soient l'origine et la cause de la douleur.

Indications thérapeutiques. — Névralgies, Rhumatismes, Migraines, Maux de tête et de dents, Courbatures, Fièvre grippale, Sciatique, Lumbago, Zona.

Le NEVORAL supprime la douleur, tandis que d'autres médicaments ne font que l'endormir.

Dose et mode d'emploi. — Adultes, 1, 2 ou 3 cach. p. j. Si 1 cach. n'a pas suffi, en prendre un sec. 1 h. après le prem.

Enfants, le $\frac{1}{4}$, le $\frac{1}{3}$ ou le $\frac{1}{2}$ du contenu d'un cachet à prendre dans un liquide sucré, de la confiture ou du miel.

Dépôt général : *

LABORATOIRES RAFEY

Raoul FEIGNOUX, pharm. 1^{re} classe
29, rue des Jardiniers. Montreuil (Seine)

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates alcalins. Ne contient ni chaux, ni sucre, ni alcool.

Forme. — Gouttes concentrées, 20 gouttes contiennent 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie.

Dose. — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle même des Tissus nerveux.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc.

Aucune contre-indication.

Laboratoire FREYSSINGE

6, Rue Abel — PARIS

NIGÉRINE VINCENT

Noir animal pur polyvalent
Fixateur par excellence des toxines
et alcaloïdes

Forme. — Poudre noire sans odeur ni saveur.

Indications. — Diarrhées, gastro-entérites aiguës et chroniques, intoxications d'origine gastro-intestinale, empoisonnements.

Doses. — 3 cuillerées à café p. jour, entre les repas dans un peu d'eau. — Dans les empoisonnements, 3 fortes cuillers à soupe en une ou plusieurs fois.

VINCENT, pharmacien,
14, avenue Mac-Mahon. — PARIS.

NISAMELINE de TROUETTE-PERRET

Préparation à base d'extrait de Guaco ; doit être employé "INTUS & EXTRA" — action physiologique à l'intérieur, sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale à l'extérieur ; sur les terminaisons des nerfs de la sensibilité générale.

Indications. — Prurit, Dermatoses, Névralgies.

Traitement interne :

Pilules Nisaméline "TROUETTE-PERRET" (0 gr. 10 Extrait de Guaco).

2 à 5 pilules à chacun des deux repas.

Sirop Nisaméline "TROUETTE-PERRET" (0 gr. 20 Extrait de Guaco).

1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux repas.

Traitement externe :

Poudre Nisaméline "TROUETTE-PERRET".

1/2 flacon ou 1 flacon, pour un grand bain. — 1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède, pour lotions, compresses, etc.

Pommade Nisaméline "TROUETTE-PERRET".

En onctions pour prurits et dermatoses localisés.

Savon Nisaméliné "TROUETTE-PERRET".

Pour lavages et soins hygiéniques.

Bien spécifier : NISAMÉLINE "TROUETTE-PERRET" pour avoir le véritable Guaco.

Laboratoire TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles-Industriels - PARIS (11^e)

NITIUM BUISSON

Bromure de radium suractivé
enrichi en rayonnement alpha

Crayon.

Traitement des métrites chroniques.
Curettage médical.

Ovules.

Vaginites.

Pommade.

Dermatoses. Bartholinites. Chancre
mou. Lupus érythémateux.

Chaque crayon, ovule ou tube de
pommade contient 6 microgrammes de
bromure de radium suractivé.

Etablissements **Albert BUISSON**

157, rue de Sèvres. — PARIS.

R. C. Seine 147.023

NITROÏL LEYSIN

En cachets

Dissolvant physiologique et éliminateur
réel de l'acide urique et de ses composés.

Indications. — Rhumatismes aigus et chroniques,
articulaires et musculaires.

Propriétés. — Solubilise les concrétions, dissout
et élimine les urates.

Posologie. — Un cachet avant chacun des trois
repas du matin, de midi et du soir, avec un
demi-verre d'eau ordinaire.

Supprimer les eaux minérales.

Prix : 22 fr. 40 — Au Corps Médical : 16 fr. 50

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e)

Téléphone : Auteuil 14-73.

NITROÏL LEYSIN INJECTABLE

Composition. — Sels de Terres rares.

Présentation. — Ampoules stérilisées.

Indications. — Rhumatismes aigus, chroniques, déformants, articulaires, musculaires. Limitations des mouvements articulaires, ankyloses, arthrites, sciatiques, lumbagos, névralgies faciales, douleurs intercostales.

Propriétés. — Provoque une disparition extrêmement rapide des phénomènes morbides et une liberté relative presque immédiate des mouvements, dans les cas de limitation de ces derniers. Les névralgies faciales rebelles cèdent ordinairement en une vingtaine d'applications.

Posologie. — En général, proportionner le nombre d'injections, d'une ampoule chacune, au volume de l'articulation ; suivant le mode d'emploi.

Prix sans engagements.

Prix 56 frs. — Au corps Médical 41 frs.

Pyro-Nitroïl (conservation moins longue)

Prix: 33,60 — Au corps Médical: 25,60

Formuler: 1 boîte *Ampoules Nitroïl Leysin* (ou *Pyro-Nitroïl Leysin*) injectable.

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e)

Téléphone: Auteuil 14-73

NOPIRINE VICARIO

Aspirine Phénédine caféinée

Action antinévralgique plus rapide et plus durable que l'Aspirine.

Mode d'emploi :

Comprimés : 2 à 3 par jour.

Granulés : 2 à 3 cuill. à café par jour.

Indications. — Névralgies rhumatismales. Migraines arthritiques. Céphalées des neurasthéniques. Grippe, etc.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (9^e)

NOVARGYRE

(Ampoules Guillaumin
à l'oxycyanure d'hydrargyre indolore)

Compos. — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 centigr. ; Stovalne : 1 centigr. ; Eau distillée : 1 cm cube.

Propriétés. — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

Indications. — Accidents syphilitiques.

Mode d'emploi. — Injections intra-musculaires tous les deux jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire huit à douze injections et laisser reposer le malade pendant une ou deux semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

NOVARSÉNOBENZOL

Dioxydiaminoarsénobenzol-méthylène
sulfoxyate de soude

Médicament d'assaut des spirilloses et principalement de la syphilis, en injections intra-veineuses, à doses progressives de 0 gr. 15 à 1 gr. 20. Soluble dans l'eau distillée, sans alcalinisation.

Peut également être utilisé en injections intramusculaires, en lavements et comme topique local (Angine de Vincent, etc.).

Littérature sur demande

Les Etablissements POULENC Frères
86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5286

NUCLEARITOL ROBIN

Association de la combinaison végétale nucléophosphatée avec le méthylarsinate
Nucléophosphate de chaux et de soude
méthylarsiné.

Comprimés. — Ampoules injectables.

Doses et Mode d'emploi. — Adultes :
4 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections
hypodermiques par 24 heures.

Prop. Thér. — Antituberculeux, Reconstituant puissant.

Indications. — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme,

Laboratoires M. ROBIN
13, Rue de Poissy — PARIS

NUCLEATOL ROBIN

Combinaison de Nucléophosphates
d'origine végétale

Granulé : Nucléophosphate de chaux et de soude.

Injectable : Nucléophosphate de soude pur.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 4 à 6 cuillerées-mesures de granulé aux repas, ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

Prop. thér. — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou les colloïdes.

Indications. — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies; provoque la défervescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysipèles, typhoïdes, etc.; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS

NUJOL

Huile de Vaseline

Description. — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

Indications. — Le NUJOL est spécialement indiqué pour le traitement de la constipation. Il est particulièrement recommandé pendant la grossesse et la période d'allaitement. Le NUJOL peut être administré en toute confiance à tous les âges et dans toutes conditions de santé.

Doses. — Pour les adultes : Une cuillerée à bouche soir et matin, à jeun.

Pour les enfants : D'une demi-cuillerée à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Préparé par les

Laboratoires du NUJOL

Standard Oil Co.,

(New Jersey)

Chez tous les Pharmaciens ou directement chez
l'Agent de vente : Pour la France, A. W. B. SCOTT
38, Rue du Mont-Tabor — PARIS

NUTROMALT

Composition. — Maltose 30 %, Dextrines 67 %, Chlorure de Sodium 1 %, H_2O 2 %.

Sucre nutritif ne fermentant pas dans l'intestin. Complément indispensable du lait de vache dans l'allaitement artificiel.

Forme. — Poudre.

Indications. — Affections gastro-intestinales, selles acides et diarrhétiques des nourrissons et des enfants.

Doses. — Nourrissons de 1 mois: 4 cuillerées à café et demi par 2-3 décilitres de lait. Doses variables suivant l'âge.

Etablissements WANDER

58, Rue de Charonne — PARIS (XI^e)

Si le " DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES " vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

OCRÉINE GRÉMY

L'apothérapie ovarienne ne se discute plus avec les travaux de Fremant, de Rouin et Ancel, de Franckel, etc... Mais si, pendant longtemps, on n'a pas obtenu les résultats que l'on devait en attendre, c'est qu'on utilisait, sous le nom d'extraits d'ovaires ou poudre d'ovaires des produits dépourvus d'activité.

De jour où est apparue l'Ocréine, on peut dire que l'apothérapie ovarienne est entrée dans le domaine de la réalité. Plus de quinze années d'existence permettent de l'affirmer. Elle est devenue le traitement " pierre de touche ". Tant qu'on n'a pas utilisé l'Ocréine, on ne peut pas dire que l'apothérapie a échoué.

Troubles Menstruels (1)	CAUSES	TRAITEMENT
<i>Règles rares.....</i>	Insuffisance ovarienne	OCRÉINE GRÉMY Deux à cinq pilules tous les jours pendant les huit jours qui précèdent les règles et pendant tout le temps qui dure l'écoulement sanguin. Gouttes d'Ocréine. Dix gouttes correspondent à une pilule.
<i>Règles peu abondantes.....</i>	Id.	
<i>Règles douloureuses</i>	Id.	
<i>Accès d'oppression, palpitations, bouffées de chaleur.....</i>	Id.	
<i>Règles fréquentes..</i>	Insuffisance thyroïdienne	THYRÉNINE GRÉMY Une pilule par jour pendant deux jours, puis alternativement une et deux, puis deux pilules par jour. Le traitement commencera huit jours après la fin des dernières règles et se prolongera jusqu'à la fin de la période menstruelle suivante. Recommencer huit jours après jusqu'à cessation des troubles. (Tablettes - doses doubles).
<i>Règles abondantes.</i>	Id.	
<i>Règles de trop longue durée.....</i>	Id.	
<i>Migraines, vertiges transitoires, frissons, douleurs rhumatoïdales.....</i>	Id.	
<i>Aménorrhée Myxœdème fruste Obésité, Rhumatisme chronique</i>	Insuffisance ovarienne et insuffisance thyroïdienne associées.	THYROCRÉINE GRÉMY - Deux à six pilules par jour pendant vingt jours par mois; y associer suivant les cas deux à quatre pilules d'Ocréine, ou une à deux pilules de Thyréine.

(1) Nous ne comprenons sous cette dénomination que les troubles de la période cataméniale en dehors de tout état pathologique, c'est-à-dire en exceptant tous les cas où une tumeur ou une infection en sont la cause première.

ŒNOPHOS

Acides hydro-éthylène-phosphoriques
Reminéralisation phospho-dolomiflique
 Méthode des Professeurs BURARD et VOISENET, de Dijon.

Prop. thér. — Neurotonique. Reconstituant énergétique ; *fixateur électif* de la magnésie et de la chaux (*voir fiche DOLOMA*). Médication phosphorique rationnelle.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, *cancers, tuberculose*.

Doses et mode d'emploi. — A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'*Elixir* ou 2 cuill. à café de *Granulé*.

Pour la eurereminéralisante, *voir 'DOLOMA'*.

Granulé : le flacon, 11 fr. (impôt compris).

Elixir : le flacon, 15 fr. (impôt compris).

Laboratoire d'Etudes Biologiques

29, Place Bossuet — DIJON

Téléphone : 16-42

OLEO-IODE DUBOIS

Huile iodée à 50 %

Composition. — Un centimètre cube d'OLEO-IODE contient 50 centigr. d'iode, sous forme d'éthers gras iodés.

Indications. — Par sa forte teneur en iode et sa mise en liberté lente et progressive, l'OLEO-IODE permet une action continue, et la constitution d'une réserve médicamenteuse qui n'est assimilée que peu à peu.

Il convient tout particulièrement dans les rhumatismes déformants et articulaires, l'artério-sclérose, la syphilis tertiaire et toutes ses manifestations, la tuberculose, etc., où l'action thérapeutique est incomparable.

Pesologie. — Capsules : 2 à 5 par jour aux repas. — Ampoules : 1, 2 et 5 cc. ; tolérance parfaite de doses répétées.

Laboratoires BOTTU

(Laboratoire du Néel et Laboratoire Dubois réunis)

35, Rue Pergolèse — PARIS (16^e)

OLÉO-BI " ROCHE "

Pour injections intramusculaires

L'Oléo-Bi « Roche » est une suspension huileuse renfermant à l'état ultra divisé un oléate de Bismuth $(C_{17}H_{33}COO)_2Bi$. Cette suspension ne dépose pratiquement pas, même après de longs mois et peut être facilement réhomogénéisée instantanément par simple agitation de l'ampoule.

Avantages.

Pas d'action irritante ; injections indolores (sauf sensibilité individuelle), administration commode, sans interrompre les occupations du malade ; effet thérapeutique certain et tolérance parfaite.

Indications.

Toutes les formes de la syphilis primaire, secondaire ou tertiaire, surtout chez les mercreo et arséno-résistants, chez les malades qui ne supportent pas As ou Hg, ou chez lesquels on veut appliquer des cures mixtes et combinées avec As ou Hg.

Traitement.

Le Traitement consiste en séries de 12 à 20 injections de 2 cc. à raison de 1 ou 2 ampoules (2-4 cc.) tous les 4 jours par exemple ; laisser un mois de repos entre chaque série d'injections.

Technique.

Faire l'injection intramusculaire profonde dans la partie supérieure de la fesse (au-dessus de l'horizontale passant par le sommet du pli inter-fessier) ; bien s'assurer que l'aiguille n'a pas pénétré dans une veine ; se servir d'une aiguille de 5 cm. d'ouverture assez large (8/10^e de mm.) ; laisser le patient immobile pendant quelques minutes après l'injection.

Boîte de 12 ampoules de 2 cc.

Chaque ampoule de 2 cc

= 0.50 Oléo-Bi = 0.10 Bi métal

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

21, place des Vosges, 21.

PARIS-III*

OLEO-MEL LAXATIF

Gelée de miel à l'huile de paraffine

Formule. — Huile de paraffine extra
neutre à viscosité maxima et
spéc. raffinée p. l'usage interne } P. F.
Miel surfin 1er choix

Indic. — L'association de ces 2 substances réalise une synergie parfaite qui relève, p. le traitement de la Constipation et des affections gastro-intestinales, de toutes les indic. et de la posol. même de l'huile de paraffine. Action mécan. Innocuité absolue.
Prép. — L'Oleo-mel, préparé p. un procédé spéc., se présente sous forme d'une gelée homogène, absolument stable et inaltérable : il conserve tout l'arôme et toute la saveur du miel, ce qui en fait une médication des plus agréables et des plus faciles à prendre.

Laxatif idéal des nourrissons et des pers. délicates. — Prix : 6 fr. 75.

Laborat. DELFOUR, à POUILLON (Landes)

OPHTALMINE

Indic. therap. — Antisepsie oculaire.

Arrêt de la Cataracte, Conjonctivites,
Blépharites, Presbytie prématurée,
etc., etc.

Doses et Mode d'emploi. — Pommade,
deux applications par jour.

Docteur M. LEPRINCE

62, rue de la Tour

PARIS (XVI^{me})

OPOCALCIUM
du Dr GUERSANT

Réminéralisation – Polyopothérapie

Composition. — Extraits totaux de glandes endocrines: Parathyroïde, surrénale, thymus, hypophyse, associés à fluorure, phosphate glycérophosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

Formes. — Cachets, comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

Opocalcium arsénicé (Méthylarsinate disodique). —
Cachets.

Propriétés thérapeutiques. — La décalcification et d'une façon générale la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour recalculier et reminéraliser, il faut donc proeurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action homo-stimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

Or, l'Opocalcium seul remplit ces conditions essentielles et permet une reminéralisation effective.

indications. — Prêtuberculeuse, tuberculeuse, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures, carie dentaire, grossesse, allaitement.

Doses et Mode d'emploi. -- *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés, 3 cuillerées à dessert de granulés ou 3 cuillerées à café de poudre par jour.

Opocalcium arsénifé : 3 cachets par jour.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café de granulé, 1 ou 2 cuillerées à café de poudre, 1 ou 2 cachets, 3 ou 4 comprimés par jour.

Prix. —	Cachets, Comprimés	arsénié.....	10 fr.
		granulé ...	11 fr.

LABORATOIRE DE L'OPOCALCIUM

RANSON, DOCTEUR EN PHARMACIE

121, Avenue Gambetta, 121 - PARIS (20°)

OPOCHLORINE

Composition. — Complexe de chloramine T purifiée, de sels biliaires, de secrétine et de charbon végétal.

L'association synergique de ces différentes substances font, de l'OPOCHLORINE, un des plus puissants choléopoiétiques connus.

Indications. — Dyspepsies intestinales, Tympanisme, Entérocolite muco-membraneuse, Constipation, Entérite des enfants avec selles fétides, etc.

Dose et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 6 comprimés aux repas ; *Enfants* : jusqu'à 16 ans, 1 à 3 comprimés, selon l'âge.

Société Alsacienne de Laboratoires,
23, Rue d'Ouessant — PARIS (xv^e)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques est devenu le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du médecin.

OPOSYNERGINES

SYNERGIES
ENDOCRINO
MINÉRALES

Complexe d'Autacoïdes endocriniens
et de sels minéraux biotiques

Composition. — Ensemble rationnel d'autacoïdes hormonaux des glandes à sécrétion interne et d'organes régularisant la morphogénèse, associés à un complexe de substances organo-minérales sensibilisées, à orientation vitale, selon l'expression même d'Albert Robin, le fluor, le calcium, le magnésium, le phosphore isolés de la partie interne de l'écaille d'huître, le fer, le manganèse, le vanadium sous forme d'alginoïdes extraits du cytoplasma de certaines variétés d'algues marines.

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés se dissolvant dans l'intestin.

Deux formules :

1^o Formule M destinée au sexe masculin à base d'autacoïdes de la glande interstielle du porc cryptorchide.

2^o Formule F destinée au sexe féminin, renferme l'ensemble des sécrétions internes de l'ovaire et des glandes mammaires. Cet ensemble déclanche le stimulus régulateur du métabolisme chez la femme.

Indications. — *Enfants*: Troubles de la croissance, dystrophie infantile. Enfants retardés dès leur naissance, soit au point de vue du poids, de la parole, de l'état mental. Rachitisme, chlorose de la puberté, etc.

Adultes: Atrophie polyglandulaire. Tous états d'asthénie, impuissance, puérilisme mental, maladie de Basedow, certaines migraines par insuffisance thyroïdienne. Consolidation des fractures, sénilité précoce, etc..

Vieillards: Séquelles de la vieillesse, friabilité, ostéomalacie, cancer.

Dans ce dernier cas, l'emploi des Oposynergines est justifié par les travaux de Rohdenburg, Bulloch et Johnston. Ces auteurs ont démontré que l'ablation de la thyroïde, du thymus, des testicules, augmente la réceptivité au cancer.

Chez des sujets immunisés, cette ablation tend à diminuer l'immunité, tandis que l'administration des sécrétions internes de ces glandes tend au contraire à renforcer cette immunité.

Dose et mode d'emploi des Oposynergines.

Enfants: de 1 à 5 ans, $\frac{1}{2}$ à 2 comprimés par jour écrasés dans un peu de lait ; de 5 à 15 ans, 2 à 6 comprimés par jour.

Adultes et Vieillards: 4 à 8 comprimés par jour, et selon l'avis du médecin.

Nota. — L'action des Oposynergines est lente, mais certaine. Dans certains cas que seul le médecin pourra déterminer, il y aura lieu de poursuivre le traitement pendant des mois et même des années, avec des périodes de repos de 10 jours par mois.

Ne pas croquer ces comprimés, les avaler avec une gorgée de liquide quelconque.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'OPOTHERAPIE

Laboratoires G. CHAMAGNE

docteur en pharmacie

58, rue Taitbout, 58. — PARIS

OPOTHÉRAPIE BYLA

Nouvelles présentations brevetées

SANS ODEUR.

CONSERVATION INDEFINIE

CONSTANCE D'ACTIVITE

1^o Cachets « OPO » contenant dans le même pain azyrne, deux comprimés concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipide correspondant.

Désagrégation immédiate dans le liquide stomacal.

Conservation indéfinie, grâce à la suppression des actions lipasiques de contact.

Prescrire : OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2^o les « EXOS » BYLA, sucs tissulaires totaux inaltérables, préparés par exolyse des organes frais.

Prescrire : EXO-THYROIDINE BYLA, etc.

3^o les GLANDULES BYLA (comprimés dragéifiés) enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter toute odeur. *Conservation indéfinie*.

Prescrire : GLANDULES DE SURRENINE BYLA.

4^o les AMPOULES BYLA : liquides organiques injectables, en une seule ampoule de 3 cc dans laquelle ils se trouvent dilués et amenés à un état voisin de l'isotonie.

Prescrire : AMPOULES D'HEPATINE BYLA.

Opothérapie simple, pluriglandulaire et panglandulaire

Les Etablissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire. Paris. (14^e)

R. C. Seine 71895

OPOTHÉRAPIE CHOAY

1° OPOTHÉRAPIE UNIGLANDULAIRE :

Extraits totaux CHOAY

Poudres obtenues par dessiccation rapide des tissus glandulaires, dans le vide profond et à froid. Équivalent aux organes frais dont elles ne diffèrent que par simple élimination d'eau. (CHOAY, *Des extraits opothérapiques*, Vigot, éditeur, Paris.)

Le thérapeute dispose de tous extraits : Bile, Cérébral, Corps Jaune, Entérique, Gastrique, Hématique, Hépatique, Hypophysaire (glandes totales, lobes antérieurs ou lobes postérieurs), Mammaire, Moelle épinière, Moelle osseuse, Myocardique, Orchitique, Ovarien, Pancréatique, Entéro-Pancréatique, Parathyroïdien, Placentaire, Prostatique, Pulmique, Rénal, Sérum sanguin, Splénique, Surrénal (glande totale ou substance corticale), Thymique, Thyroïdien.

Prescrire : (A) *Voie digestive* : Comprimés, ou cachets, ou pilules CHOAY, à l'extrait (indiquer la sorte).

Doses : Adultes, de 2 à 8 par jour aux repas. Enfants de 10 ans, la moitié; de 5 ans, le tiers; de 2 ans 1/2, le quart des doses d'adultes.

(B) *Voie injectable* : Ampoules CHOAY à l'extrait (indiquer la sorte).

Doses : Généralement une ampoule de 1 cc. tous les deux jours, sauf dans certains cas spéciaux (obstétrique, gynécologie, etc.).

2° OPOTHÉRAPIES ASSOCIÉES :

Syncrines CHOAY

Les troubles des glandes endocrines sont presque toujours complexes par synergie des sécrétions internes.

Pour combattre ces troubles le praticien dispose d'extraits opothérapiques associés, les Syncrines, dont les formules correspondent aux cas les plus fréquents de Syndromes pluriglandulaires.

Prescrire : Comprimés, ou cachets, ou ampoules Syncrines CHOAY, formule n°

Syncrines CHOAY : N° 1, Pluriglandulaire — N° 2, Surréno-Hypophysaire — N° 3, Thyro-Surréno-Hypophysaire — N° 4, Thyro-Ovariennne — N° 4 bis, Surréno-Ovariennne — N° 5, Thyro-Orchitique — N° 5 bis, Surréno-Orchitique — N° 6, Hypophyso-Orchitique — N° 6 bis, Hypophyso-Ovariennne — N° 7 Thyro-Hypophyso-Ovariennne — N° 7 bis, Thyro-Hypophyso-Orchitique — N° 8, Peptosthénie (glandes digestives). — N° 9, Placento-Mammaire, etc.

Doses : *Voies digestives*, 2 cachets ou comprimés par jour, aux repas. — *Voie injectable*, généralement une ampoule tous les deux jours.

Laboratoire CHOAY

48, Rue Th.-Gautier — PARIS (Téléph. Aut. 44-39)

OPOTHÉRAPIE FOURNIER

Extraits totaux préparés à froid dans le vide

Endocrisines. — Tous organes : Thyroïde, ovaire, hypophyse, glande mammaire, surrénale, foie, rein, thymus, testicule, pancréas, placenta, etc.

Forme. — 1° *Cachets et comprimés.*

Doses usuelles toutes préparées. — Thyroïde, 0,025 mgr., 0,10 cgr. ; ovaire, 0,10 cgr. ; orchitine, 0,20 cgr. ; surrénale, 0,10 cgr. ; hypophyse, 0,10 cgr. ; foie, 0,50 cgr. ; rein, 0,25 cgr.

Prix : La boîte, 8 fr. ; 10 fr. ; 12 fr.

selon dosage

Cachets pluri-glandulaires

M, sexe masculin.

F, sexe féminin.

Troubles de croissance, infantilisme, arriération.

2° *Ampoules :*

Thyroïde. Ovaire. Surrénale. Hypophyse. Orchitine. Rate. — Association hypo-surrénale. Asthme. — Hypophyse lobe-postérieur, usage obstétrical.

Formuler : Endocrisines-glande injectable Fournier.

Prix : 9 francs

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

OPOTHÉRAPIE MONCOUR

49, *avenue Victor-Hugo*, 49

BOULOGNE-PARIS

Sous forme de Sphérulines, pilules inaltérables et toujours solubles, grâce à leur enrobage spécial. A tous extraits totaux d'organes, préparés aseptiquement, à froid, dans le vide.

Mode d'Emploi. — 1 à 6 par jour, sauf Hépatiques et Rénales, jusqu'à seize par jour.

SPHERULINÈS SYNERGIQUES MONCOUR

(Thyro-ovariennes, Thyro-orchitiques, Hypophyso-ovariennes, Surréno-ovariennes, etc...

Sur demande, toutes associations pluriglandulaires spéciales en SPHERULINES.

NEO-SPHERULINES MONCOUR

Préparées fraîches, sur demande du médecin. Les préparations sont datées. Renseignements sur demande.

Produits Opothérapiques Moncour

49, *avenue Victor-Hugo*, 49

BOULOGNE-PARIS

OPOZONES LUMIÈRE

Constitution. — Préparations opothérapiques, à base de glandes fraîches, obtenues par un procédé, entièrement nouveau, présenté par MM. A. Lumière et Chevrotier, à la Société de Thérapeutique de Paris (23 octobre 1912), fondé sur les propriétés absorbantes de certains sels inertes. Ces préparations renferment intacts tous les éléments chimiques et biologiques de la glande. Ils sont glutinisés et dragéifiés, ce qui facilite leur conservation et permet d'éviter l'action trop hâtive des sucs digestifs.

Les Laboratoires Lumière préparent des Opozones à base de tous organes. Chaque Opozone correspond à son poids de glande fraîche (0 gr. 20).

Produits spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER, Pharmacien

9, cours de la Liberté — LYON

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

OPOZYMASES

Les Opozymases représentent une forme rationnelle et nouvelle de l'opothérapie gastro-intestinale.

Forme Pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Comprimés blancs à base d'*Hormones gastriques* et *parotidiennes* solubles dans les sécrétions stomacales.

Comprimés roses à base d'*Hormones Coecales, pancréatiques* et *hépatiques* solubles seulement dans le suc intestinal.

Cette méthode permet donc de faire agir synergiquement les enzymes de la digestion dans leur propre milieu et par conséquent dans les conditions d'activité les meilleures.

Les Opozymases sont riches en *Vitamines* et *Homo-stimulines spécifiques*. Ce sont de puissants Catalyseurs que l'on emploiera avec succès dans toutes les affections des organes digestifs et du Foie par déficience ou excès des sécrétions *endo* ou *exocrines*.

Posologie. — *Adultes et Enfants* : Deux comprimés à chacun des principaux repas ; un blanc quelques minutes avant le repas, un rose au milieu du repas. Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Ce traitement ne comporte aucune contre-indication.

Spécimen sur demande à MM. les Médecins

Société Française d'Opothérapie

Laboratoires G. CHAMAGNE

58, rue Taitbout — PARIS (9^e)

ORARGOL AMICROS

Formes. — ORARGOL INJECTABLE (titré à 0.5 % solution isotonique. — a) Bte 6 ampoules 5 cc (médecine générale); b) Bte 1 ampoule 10 cc (chirurgie, traitements pré et post-opératoires).

ORARGOL NON INJECTABLE (titré à 1 % — a) Gouttes d'Orargol. Grand flacon (60 gr. environ); b) Rhino-Orargol O. R. L. Petit fl. 20 gr. environ) Oto-Rhino-Laryngologie. Ophtalmologie.

Indications. — Tous les états infectieux, fièvre, septicémies, grippe, pneumonie, broncho-pneumonie, etc...

Traitements pré et post-opératoires.

On utilisera l'ORARGOL en injection dès le début d'une infection, seul ou combiné à la vaccinothérapie ou à la sérothérapie.

Non injectable: usage Interne: Gouttes; pansements en général.

Pesologie. — A. AMPOULES. Injections de 5 à 20 cc. intra-musculaires ou intra-veineuses, tous les jours ou tous les deux jours. Chez les enfants, 1 cc, par année d'âge.

B. GOUTTES. Adultes: une cuillerée à café matin et soir; enfants, 20 à 100 gttes suivant l'âge dans une boisson quelconque.

C. ORARGOL O. R. L. — a) pour instillations nasales: 4 à 5 gttes dans chaque narine à l'aide de l'instillateur Amicros ou du Pulvargol. b) pour gargarismes: 10 à 15 gttes dans une tasse à café d'eau chaude, 2 fois par jour. c) Collyres.

Laboratoire des PRODUITS AMICROS

G. HELME, pharmacien de 1^{re} classe

5, Rue Clauzel, PARIS, 9^e — Tél. Trudaine 00,47

ORTHO-GASTRINE

Formule :

Sulfate de Soude anhydre . . .	0 gr. 25
Phosphate de Soude anhydre . .	0 gr. 25
Bicarbonat de Soude	0 gr. 10
CITRATE de Soude	0 gr. 10
Pour 1 paquet N° 30	

Avantages. — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et composition.

Indications. — Toutes celles de la solution alcalino-sodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire. Dyspepsie. Gastralgie. Hyperechlorhydrie. Entérite. Intoxication alimentaire, etc.

Posologie. — Adultes ; 2 à 4 paquets par jour.

Enfants (sucrez légèrement) de 6 mois à un an 1/2 à 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies ;

De 1 an à 3 ans, 1 paquet par jour.

Laboratoire A. LEBLOND

Pharmacien de 1^{re} Classe, Ex-interne des Hôpitaux de Paris
51, Rue Gay Lussac — PARIS (V^e)

R. C. Seine 50949

OSTÉO-HÉPATINE

Opothérapie osseuse additionnée de 10 % d'extrait hépatique (moelle et os frais de veau).

Dose. — Tablettes friables. — Adultes : 3 à 5 tablettes par jour. — Enfants : 1 à 3 tablettes par jour, entières ou pulvérisées.

Propriétés. — Reminéralisant, récalcifiant organique toujours actif et puissamment actif. Se différencie des sels minéraux par une activité indiscutable, cliniquement établie.

“La reminéralisation doit être faite à l'aide de l'opothérapie osseuse en soutenant l'activité hépatique”. Travaux des professeurs A. Robin et Teissier (de Lyon).

Indications. — Tuberculose, Maladies osseuses et nerveuses, Grossesse, Allaitement, Croissance, Dentition, Rachitisme, etc.

Préparation sans similaires ni équivalents.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, Rue de la Source — PARIS (16^e)

Téléph. Aut. : 08-82

OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif du *Strophantus Gratus*
isolé par le procédé particulier
du Professeur Arnaud

Cardio-tonique énergique,
Diurétique puissant.

Formes.

Solubaïne (voir à ce nom), Solution au
1/1000 d'Ouabaïne Arnaud.

Comprimés au 1/10 de mmgr.

Comprimés au 1/4 de mmgr.

Ampoules de 1 cc, au 1/4 de mmgr., p.
injections intraveineuses.

Ampoules de 2 cc, au 1/2 mmgr., pour
injections intramusculaires.

Natibaïne (*voir à ce nom*).

Indications.

Insuffisance du ventricule gauche : des
Aortiques, des Cardio-rénaux, des Hy-
pertendus, avec ou sans artério-sclérose.

Insuffisance du ventricule droit : Lésions
mitrales ou tricuspidiennes, Péricar-
dites et symphyses du péricarde,
Emphysème, Asthme, Myocardites
d'origine infectieuse.

Bien spécifier sur l'ordonnance

« OUABAÏNE ARNAUD »

Echantillons et Littérature :

Laboratoire NATIVELLE

49, boulevard de Port-Royal, 49
PARIS

OUATAPLASME

du D^r Ed. LANGLEBERT

Pansément humide complet

Instantané, aseptique, émollient

Indications. — Furoncles, Anthrax, Absès, Brûlures, Eczéma, Phlébites, Coliques, Plaies contuses.

Mode d'emploi. — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liquueur de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Peut facilement se sinapiser en étendant à sa surface une couche de farine de moutarde qu'on aura au préalable délayée dans un peu d'eau froide; ainsi préparé, il est le cataplasme sinapisé idéal.

ETABLISSEMENTS SABATIER

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (16^e)

OVO-LÉCITHINE BILLON

Prop. thér. — L'*Ovo-Lécithine* agit comme un stimulant des fonctions de nutrition et d'assimilation; elle favorise l'hématopoïèse, empêche la déminéralisation phosphorée, relève l'énergie contractile du cœur et des muscles, etc.

Formes et doses. — Dragées à 0 gr. 05, 4 à 6 par jour (enfants 2 à 3); granulés à 0 gr. 10 par cuill. à café, 2 à 3 par jour (enfants 1 à 2); injections intra-musculaires, une par jour.

Indications. — Neurasthénie, dépression nerveuse, chlorose, anémies de toute nature, lymphatisme, cachexie sénile, période de convalescence des états infectieux.

Littérature sur demande

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5863

OVOMALTINE

Composition. — Matières protéiques 14,2 %. Maltose 62,8 %. Dextrines 7,8 %. Corps gras 8,2 %. Cendres 3,7 %. Phosphore organique 1,18 %. H²O 2, 12 %. Diastases.

Forme. — Poudre irrégulière.

Indications. — *Aliment de force* pour tout organisme affaibli par le surmenage, la maladie ou la vieillesse. *Aliment remède et de régime* dans les affections gastro-intestinales. *Galactagogue* préparant et facilitant l'allaitement.

Doses. — *Enfants - Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe par 20 à 25 centilitres de lait, coupé d'eau, de thé, de café, etc.

Préparer sans cuisson.

Ne convient pas aux nourrissons.

Etablissements WANDER

53, Rue de Charonne — PARIS (XI^e)

OVULES CHAUMEL

Les Ovules à la Glycérine solidifiée, et aux principaux médicaments, constituent le mode de pansements vaginaux le plus commode.

Indications :

Aménorrhée. — Ovules Chaumel Emménagogues (Apiol, Cannelle).

Antisepsie. — Ovules Chaumel acide borique.

Congestions. — Ovules Chaumel simples et ichtyol.

Douleurs. — Ovules Chaumel sédatifs (belladone-morphine).

Inflammations. — Ovules Chaumel résolutifs (iodure-belladone).

Leucorrhée. — Ovules Chaumel astringents (tannin-sulfate de zinc).

Métrites. — Ovules Chaumel ichtyol.

Vaginites. — Ovules Chaumel ichtyol.

Établissements FUMOUE

78, Faubourg Saint-Denis — PARIS

OVULES " ROCHE "

au Thigénol à 30 %

(Voir également page " Thigénol ")

Prop. thér. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants et puissamment résolutifs. On constate au bout de quelques jours du traitement par les *Ovules " Roche "* la sédation complète des douleurs, et après quelque temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétroèdent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une intervention chirurgicale.

Indic. thér. — Vaginite, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métorrhée, etc., etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

OXYDOTHYRINE PÂRIS

Compos. — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint, Obésité, Fibrome, Goître et tous les états dus à l'insuffisance Thyroïdienne.

Forme. — Dragées renfermant 0 gr.10 de substance active.

Posologie. — 1 à 2 dragées par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 14 fr. le flacon de 50 dragées

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Piequet — PARIS (15^e)

OXYDOVARINE PÂRIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

Forme. — Dragées dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

Indications. — Troubles de la menstruation, Retentissements pathologiques de l'ovariotomie, Irrégularités, Insuffisance, Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : Le flacon de 50 dragées : 14 fr.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (15^e)

OXY-INJECTEUR du Dr FIALIP

Avantages. — L'OXY-INJECTEUR du Dr FIALIP est pratique : il supprime l'obus d'oxygène.

Il fabrique lui-même son oxygène, en partant de deux produits universellement répandus : l'eau oxygénée et le permanganate de potasse.

Il donne ainsi de l'oxygène pur et naissant, donc plus actif.

Son volume réduit en fait un appareil de poche. C'est un appareil simple (pas de manomètres ni d'instruments déréglables).

Souple et précis, il permet de faire des injections sous-cutanées de 50 à 500 cc. Son débit est réglable et l'on voit toujours ce que l'on fait. Il est sans danger (n'employant pas d'obus à haute pression qui peuvent faire explosion), L'entourage du malade peut s'en servir aisément.

PRIX. — Ne coûte que 100 Fr. (en boîte carton).

Nous avons établi, au prix de 50 Fr., une très jolie boîte en métal nickelé, permettant de transporter dans la poche l'appareil et les accessoires nécessaires à l'injection.

Laboratoires du Docteur FIALIP

23, Avenue de la Motte-Picquet, PARIS

PAIN ESSENTIEL

avec ou sans chlorure.

Compos. — Le Pain Essentiel est préparé avec des gruaux de blé dur, riches en gluten, additionnés de protéines du lait solubilisées.

Présentation. — Chaque baguette de 10 gr., représente la valeur nutritive de 16 gr. de pain ordinaire, et renferme 6 gr. d'hydrocarbonés.

Avantages. — A été étudié pour convenir à tous les régimes. Très friable, mais oblige le malade à mastiquer ses aliments.

Indic. therap. — Produit de haute valeur nutritive. A recommander dans tous les cas de convalescences, surmenage et alimentation difficile; aux dyspeptiques, entéritiques et diabétiques légers. Aux obèses : maximum 3 à 4 baguettes par repas.

Donne d'excellentes [panades galactagogues.

Sans chlorure pour arthritiques et albuminuriques.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTÈRE (Seine)

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES"

vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

PAINS SPÉCIAUX HEUDEBERT

Les **Pains spéciaux Heudebert** ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain est interdit.

Pour tous régimes,

PAIN ESSENTIEL avec ou sans chlorure (v. article spécial).

Dyspepsie, entérite.

Pains grillés, Longuets, Gressins.

Constipation.

Pain complet.

Obésité.

Gressins, Pain essentiel.

Diabète.

Pain de gluten (régime très sévère, 5 à 10 % d'hydrocarbonés). Pain d'aleurone (régime sévère, 15 à 20 %). Spécial diabétique (régime normal, 30 à 35 % d'hydrocarbonés).

Albuminurie, arthritisme.

Pain hypoazoté. Biscottes, languets, et gressins sans sel.

PAINS DES VILLES D'EAUX.

Pain de Royat (cœur, vaisseaux). **Pain de Contrexéville** (reins, voies biliaires). **Pain de Châtel-Guyon** (constipation). **Pain de St-Nectaire** (albuminurie) **Tranches de Plombières** (estomac, intestins). **Pain de Brides** (obésité). **Pain de Vittel** (arthritisme).

La haute valeur nutritive de ces pains permet de régler médicalement leur consommation.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue St-Germain — NANTERRE (Seine)

PANBILINE

Formes. — Pilules et Solution.

Définition. — La Panbiline, Spécifique total des *Maladies du Foie* et des Affections qui en dérivent, est la seule médication agissant simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(Voir *Rectopanbiline*).

Composition. — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les meilleurs Cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glyciné : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique, ni irritante, et ne contient ni sucre, ni alcool.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase Biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite muco-membraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

Doses moyennes. — 2 à 12 pilules de Panbiline par jour, ou 2 à 12 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas.

Demi-dose pour les enfants.

Echantillon, Littérature

Laboratoire de la PANBILINE

ANNONAY (Ardèche)

PANFÉBRINE

*Médicament de la fièvre
et de toutes les fièvres*

stimulant les fonctions hépatique, biligène,
et splénique, sans action déprimante sur le
cœur

Traitement du paludisme : Panfébrine A B

Spécifique de ttes les pyrexies : Panfébrine B

1° Panfébrine B (toutes fièvres)

Composition.

Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas.

Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Son rôle.

Antithermique dans toutes les pyrexies.

Action.

1° Apyrétique énergique chez tous les tuberculeux fébricitants.

2° Maladies infectieuses (grippe, dothérien-térie, scarlatine, etc., et phlegmasies de toutes sortes).

Posologie.

Un cachet-comprimé de Panfébrine B dès que la température est à 38° ou au dessus (Peut être renouvelé 2 à 4 fois en 24 h.).

2° Panfrébine A B (Paludisme)

Composition. — Panfébrine A : Acide méthylarsinique $As = O-CH^3(OH)^2$. Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Panfébriane B : Comp. indiquée ci-dessus.

Son rôle.

Action spécifique d. le paludisme (N'occasionne jamais d'accidents quinquiques).

Avantage. — Innocuité absolue.

Posologie.

Préventif : 1 cachet-comprimé A le matin, 1 cachet-comprimé B le soir. — Paludisme aigu et chronique : 3 cachets-compr. A et 3 cachets-compr. B par jour. — Enfants : 12 ans, 2 cachets-compr. A et 2 cachets-compr. B p. jour. De 7 à 8 ans, 1 cachet-compr. A et 1 cachet-compr. B p. jour.

(Echantillon et Littérature)

LABORATOIRES DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier

PARIS-XIe. — Tél. Roquette 14-12

PANGADUINE

Extraite directement des Foies de Morue

Contient tous les principes actifs, alcaloïdes, phosphoglycérides, lécithines, contenus dans l'Huile de foie de Morue.

Elle permet d'absorber sous une forme agréable et parfaitement assimilable les principes médicamenteux correspondant à une dose d'huile de foie de morue intolérable pour le malade.

Elisir de Pangaduine - *Très agréable au goût*

Contient 10 c/g de **Pangaduine** par cuillerée à bouche. *Dose*: Un verre à liqueur avant chaque repas.

Pangaduine granulée - Contient 10 c/g de **Pangaduine** par cuillerée à café. *Dose*: Une cuillerée à café avant chaque repas.

Ch. SOUILLARD

2, Rue du Marché-des-Blancs-Manteaux, 2 — PARIS

PANGESTYL NARTY

Nature et action. — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif; 2° Par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

PANGESTYL (*qui digère tout*).

Indications. — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhées, Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion : Coliques hépatiques, ictère ou Jaunisse, Angiocholites, Cholécystites, etc.

Formes et Mode d'emploi. — *Granulés ou Cachets*
Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des malaises dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

Laboratoire Georges TINARD

134, Boulevard Péreire — PARIS (17°)

PANGLANDINE

Description. — Capsules kératinisées de 0 gr. 25 (50 par flacon) contenant une synthèse opothérapique : thymus, ovaire, rate, duodénum, hypophyse, capsules surrénales, thyroïde, pancréas, testicules, foie, prostate, en proportions physiologiques.

Action thérapeutique. — L'insuffisance fonctionnelle d'une glande à sécrétion interne, entraînant un surcroît de travail pour les autres, la médication opothérapique doit renforcer l'action des principales glandes en suppléant celle qui est déficiente et, par conséquent, comporter un mélange synthétique.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans la sénilité, l'obésité, la neurasthénie, les retards de croissance, les troubles de la puberté, le myxœdème, l'infantilisme.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

PANLACTO MIDY

Culture pure des 3 bacilles lactiques : bacille Bulgare, bacille Bifidus, bacille Paralactique à l'état vivant et actif.

Comprimés dosés à :	Bacilles bulgares.....	0,02
	Bacilles bifidi.....	0,02
	Bacilles paralactiques	0,02

Mode d'emploi. — 3 à 8 comprimés par jour, soit à la fin du repas, soit au petit déjeuner et dans un verre d'eau lactosé (5 grammes), le soir avant de se coucher.

Prop. therap. — Détruit toutes les fermentations microbiennes, antiseptise et tonifie les intestins.

Indic. — Affections intestinales : diarrhées infantiles, gastro-entérites, entéro-colites, etc.

Vente au détail : 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17^e)

PANTOPON " ROCHE "

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0 gr. 01 de Pantopon " Roche"
 = 0 gr. 50 ctg. de teinture d'opium,
 = 0 gr. 025 mgr. d'extraît d'opium,
 = 0 gr. 005 mgr. de morphine.

Posologie et mode d'emploi. — Voie buccale :

PANTOPON " ROCHE " SIROP

(dosé à 0,01 ctg. de Pantopon " Roche" par cuillerée à soupe.)

Adultes : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus
 Enfants : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

PANTOPON " ROCHE " COMPRIMÉS

(1 comprimé = 0.01 ctg. de Pantopon " Roche").

Adultes : 1 à 3 par jour et plus.
 Enfants : 1/3 à 1 par jour, selon l'âge.

Voie hypodermique :

PANTOPON " ROCHE " AMPOULES

(1 ampoule = 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon " Roche").

Boîtes de 6 et 12 Ampoules

Adultes : 1 à 2 par jour et plus.
 Enfants : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

Indic. thér. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}
 21, Place des Vosges — PARIS

PAPAÏNE de TROUETTE-PERRET

Ferment digestif, énergétique, extrait du suc du *Carica Papaya*, digère les produits azotés, *quelle que soit la réaction de l'estomac*, acide, neutre ou alcaline.

Indications :

Toutes les fois que l'on digère mal.

Pour les Adultes :

Elixir "TROUETTE-PERRET" à la *Papaïne* :

Un verre à liqueur après chaque repas

Cachets "TROUETTE-PERRET" à la *Papaïne*.

Un à deux cachets à chaque repas.

Comprimés "TROUETTE-PERRET" à la *Papaïne*.

Deux à huit comprimés à chaque repas

Pour les Enfants :

SIROP DE PAPAÏNE de TROUETTE-PERRET

Gastro-Entérite des nourrissons, Diarrhées, Vomissements.

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

A souvent réussi après échec de toute autre médication.

Bien formuler : *Elixir - Sirop - Cachets - Comprimés de TROUETTE-PERRET, à la Papaïne.*

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeublés-Industriels, 15
PARIS (11^e)

PAPIER FAYARD ET BLAYN

(papier chimique du codex)

Action thérap. — Le papier Fayard et Blayn agit sans provoquer ni irritation ni brûlure ; il est supérieur à tous les emplâtres et il remplace avec avantage les cataplasmes, sinapismes, la teinture d'iode et tous les haumes, topiques ou révulsifs. Aucune des médications nouvelles n'a réussi à lui faire perdre la faveur dont il jouit auprès des médecins qui l'ont expérimenté sérieusement.

Références. — Dans le monde entier, plusieurs générations de médecins ont employé le Papier Fayard et Blayn, doyen des papiers révulsifs, comme l'agent curatif externe le plus sûr et moins irritant contre les affections suivantes : Bronchites, Rhumes, Douleurs thoraciques, Maux de reins, Rhumatismes chroniques, Tumeurs, Nodosités, Meurtrissures, etc...

Mode d'emp. — Chauffer légèrement le papier et l'appliquer sur la partie malade de manière à la recouvrir largement. On peut sans inconvénient le laisser en place pendant plusieurs jours.

Laboratoire DALET, 94, boulevard des Batignolles - Paris 17^e

PARATHYROCALCINE "MONCOUR"

REMINÉRALISATION

Fixation des SELS de CALCIUM

par l'utilisation, comme *MORDANT*,

de l'EXTRAIT TOTAL PARATHYROÏDIEN

Indications. — Prébacillose, bacillose, scrofule, convalescence, croissance, fractures, affections osseuses, art dentaire, et, en général, toutes affections avec déminéralisation.

Notre Extrait total Parathyroïdien, élément essentiel de la médication, est préparé avec des glandes soumises à un contrôle histologique régulier.

Cachets : 1 à 3 par jour.

Comprimés : 2 à 6 —

Produits Opothérapiques " MONCOUR "

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS

PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche)

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse, ni stupéfiante.

Prop. thérap. — Action régulière et sûre.

Effet *non seulement calmant, mais curatif*.

Indications. — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).

Pas de contre-indication.

Posologie. — 3 prises par jour (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour)	Enfants de moins de 1 an.	X à XXX gouttes
		— de 1 à 5 ans.	XX à LX gouttes
		— 5 ans et au-dessus :	XX à cent gouttes
		Adultes.	XXX à cent gouttes

THIRIET & C^{ie}

26 et 28, Rue des Ponts — NANCY

PATHOLYSINE

(Traitement interne des néoplasmes)

Deux formes: Ampoules et Pilules

Composition. — Salicyl-arséni-oxybenzénol-magnésien.

Indications. — S'emploie dans tous les cas où le tissu conjonctif sous-cutané est intéressé, c'est-à-dire dans tous les cas de cancer, sauf le cancroïde.

Mode d'emploi. — 1° Ampoules : Injecter quotidiennement une ou deux ampoules de un centimètre cube. En injections sous la peau de l'abdomen ou des membres ou en injections intramusculaires dans les muscles fessiers ou dans ceux de l'épaule.

2° Pilules : Quatre pilules par jour, au moment des repas.

LABORATOIRES A. LEJEUNE

12, rue Emilio-Castelar. — Paris-XIIe

PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique
des états névropathiques.

Composition. Une cuil. à café contient 0 gr. 50 extrait fluide de *Passiflora incarnata*; 0 gr. 25 extrait mou de *Salix Alba*; XX gttcs alcoolé de *Cratægus oxyacantha*.

Action. — La Passiflore diminue la tension artérielle, régularise l'influx nerveux dans le domaine du grand sympathique et est un sédatif et un antispasmodique de premier ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la Passiflorine par le Saule, sédatif nervin que les auteurs américains ont comparé au bromure et par le *Cratægus* dont l'action tonicardiaque et équilibrante du système nerveux est bien connue (Huchard, Renon, H. Léclerc, etc.).

Indications. — Tous états névropathiques : angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. Insomnie nerveuse; troubles fonctionnels du cœur d'origine nerveuse (palpitations, tachycardie, etc.), troubles nerveux de la vie génitale, etc.

Posologie. — Comme médicament équilibrant du système nerveux: Une cuillerée à café midi et soir avant les repas.

Contre l'insomnie nerveuse: Une à trois cuillerées à café le soir.

G. REAUBOURG, doct. en pharmacie

1, rue Raynouard. — PARIS-XVI^e

PÉLOSPANINES

Sulfates de terres rares

Traitement des Bacilloses subaiguës ou chroniques.

Injections intra-veineuses :

Pélospánines A, ampoules de 2 cc.

Pélospanines B, ampoules de 4 cc.

Injections intra-musculaires :

Pélospanines C, ampoules de 2 cc.
(associat. lipoldique)

Prix : A : 12 fr. — B : 18 fr. — C : 12 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boul^d de l'Hôpital — PARIS (5^e)

PEPTALMINE

Peptone de Viande et de Poisson
Extraits d'Œufs et de Lait

Prop. thérap. — Médication antianaphylactique polyvalente.

Indications. — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse, Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Colites, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

Dosés et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulé, une heure avant chacun des trois repas.

Enfants : Moitié de ces doses.

LABORATOIRE des PRODUITS SCIENTIA,
21, Rue Chaptal — PARIS

PEPTODIASE

(*Stimulant gastrique*)

Forme. — Gouttes.

Composition. — 1° Association en proportion convenable des chlorures de calcium, de magnésium et de sodium qui, d'après des travaux récents, sont des stimulants de premier ordre de la sécrétion et de la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2° Adjonction à ces chlorures de principes amers qui en renforcent l'action.

Propriétés thérapeut. — Grâce à cette composition, les gouttes « Peptodiasé » réveillent l'appétit, augmentent la sécrétion et l'activité des sucs digestifs, accélèrent la digestion et favorisent l'évacuation de l'estomac.

Indications. — Inappétence.

Hyposécrétion.

Digestion lente et pénible.

Atonie gastrique.

Aérophagie.

Posologie. — Trente gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

Enfants. — 4 gouttes par année d'âge et par 24 heures.

LABORATOIRE P. ZIZINE

11, Rue de Capri, — PARIS XII^e

PEPTO-FER du D^r JAILLET

à base de Chloropeptonate de Fer
Elixir aromatisé
très agréable à prendre

Propriétés. — Tonique, digestif, re-
constituant, ne constipe pas, ne noir-
cit pas les dents.

Indications. — Traitement des Anémies,
de la Chlorose.

Dose et mode d'emploi. — Un petit
verre à liqueur immédiatement après
les deux principaux repas.

Société des Produits SCHAFFNER

13, Rue Pavée, 13

PARIS

PEPTO KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment

Liqueur très agréable contenant le
suc de Kola fraîche.

Dose et Mode d'emploi :

1 verre à liqueur avant chaque repas.

Indications :

Fatigues passagères physiques ou
intellectuelles, Albumine, Diabète,
etc.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

PEPTONAL

Composition. — PEPTONE rendue inaltérable par dragéification spéciale.

Action. — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique et curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

Indications. — Migraine. Somnolence, frissons, lourdeur après les repas (crise hémoclasique atténuée). Urticaire.

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Dose. — Deux Comprimés une heure avant chaque repas.

Laboratoires DURET & REMY
ASNIÈRES (Seine)

PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone, de glycérine et de fer

Gouttes concentrées, Elixir, Vin.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 10 à 30 gouttes ou 1 verre à liqueur d'Elixir ou de vin à chaque repas ; Enfants : 1 goutte par année d'âge 2 fois par jour.

Prop. thér. — Reconstitution du globule rouge du sang.

Indications. — Tous les états anémiques et chlorotiques.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS

PEPTONE VASSAL

SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de bœuf. Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé.

Dose. — 3 cuillerées à soupe par jour, dans le potage ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente 600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

Echantillon gratuit sur demande.

Etablissements Léon DANJOU — LILLE

PÉRISTALTINE CIBA

Glucoside pur du Rhamnus Purshiana (Cascara), agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cm³ 1/2).

Ne produit pas d'acécoutumance.

Indic. — Constipation chronique, formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire : Injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention.)

Comp. inés, Cachets, Ampoules.

Doses — Adultes : 1 à 2 cachets, 2 à 4 comprimés, 1 à 2 ampoules. — Enfants : 1/2 à 1 1/2 comprimé, 1 cachet. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

La boîte de 20 cachets : 5 francs 50.

Le tube de 20 comprimés : 4 francs 50.

La boîte de 5 ampoules : 12 francs

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tanno-phosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

Prop. Thérap. — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, pré-tuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

3, rue d'Edimbourg, PARIS (8^e)

124, avenue Rogier, 124, BRUXELLES

PERSODINE LUMIÈRE

Constitution. — Préparation stable de persulfates alcalins purs, obtenue par procédés spéciaux dans les Laboratoires Lumière.

Propriétés. — Préparation cupeptique exerçant une stimulation générale sur les fonctions de la nutrition. Elle excite l'appétit, facilite la digestion et l'assimilation, et provoque aussi l'augmentation rapide de l'embonpoint et du poids.

Indications. — Inappétence (Arnozan), Anorexie (Huchard), Tuberculoses pulmonaires et osseuses (Hobbs), Rachitisme, Dyspepsie (Robin), excepté dans les formes hyperchlorhydriques.

Emploi et doses. — Donner 2 fois par jour, une demi-heure avant les principaux repas, dans un quart de verre d'eau pure :

Adultes : 3 comprimés de Persodine Lumière.

Enfants : 1 à 2 comprimés.

Produits spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER Pharmacien

9, cours de la Liberté — LYON

PERUBORE

(Comprimés)

Désinfectant rationnel des voies respiratoires
(Inhalations — Gargarismes)

Composition et forme. — Association d'essences balsamiques et de principes actifs de plantes, présentée sous forme de comprimés facilement solubles.

Chaque comprimé contient	Baume du Pérou.....	0.03
	Essences aromatiques.....	0.025
	Borate de soude.....	0.5
	Bicarbonate de soude.....	0.30
	Acide tartrique.....	0.10

Propriétés thérapeutiques. — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

Indications thérapeutiques. — Rhumes, angines, toux, affections de la gorge, enrouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites coryza.

Dosologie et mode d'emploi. — 1^{er} *Inhalation* : à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2^{er} *Gargarisme* : à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi verre d'eau bouillie chaude.

Pulvérisation : dissoudre 2 à 3 comprimés dans l'eau du pulvérisateur à vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, Place Victor-Hugo — PARIS (16^e)

“ P H O S ”

Composition. — Combinaison organique parfaitement assimilable de phosphore, manganèse et lécithine.

Indications. — Toutes les Asthénies, Dépression ou Fatigue morale et nerveuse.

Mode d'Emploi.

Granulé : 3 cuillerées à café par jour.

Comprimés : 6 par jour.

Echantillon et littérature sur demande

PHARMACIE UNIVERSELLE

213, rue St-Honoré — PARIS (1^{er})

PHOSOFORME

Trois Formes. — Solution, solution arsénée, Gouttes.

Composition. — Acide phosphorique rendu assimilable, par partielle éthérification.

Thèse de Doctorat en Pharmacie 1923.

Communicat. à la Société de Thérapeutique 1923.

Indic. thérap. — États dyspeptiques. — Neurasthénies. — Rhumatisme chronique. — Gravelle. — Convalescences : Grippe, etc. — Prétaberculeuse. — Phosphaturie. — Hypoacidité urinaire. — Asthénie. — Azotémies.

Mode d'emploi. — Solution et solution arsénée, dose moyenne : 2 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée dans un grand verre d'eau, de vin blanc ou rouge, sucré, à prendre au cours des repas.

Gouttes : 100 gouttes midi et soir, prises comme ci-dessus.

Laboratoires
de Biologie et Physiologie appliquées

D. DROUET & PLET

37, rue de Marly, à RUEIL (Seine-et-Oise)

PHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Crésote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

Prop. Thér. — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

Indications. — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, prétaberculeuse, tuberculose pulmonaire.

Mode d'Emploi. — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos. — 2° Suppositoires dosés à 0 cme. 5 : 2 par jour.

S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

3, rue d'Edimbourg, PARIS (8^e)

24, Avenue Rogier, 124, BRUXELLES

TABLETTES DE PHOSPHARSOL

Composition. — Préparation phosphoarseniée organique combinée à la strychnine.

Indications thérapeutiques. — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, l'impuissance, la tuberculose, etc.

Doses et mode d'emploi. — De deux à quatre tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. NE PAS DÉPASSER CES DOSES.

Prix en France : 8 francs la boîte plus l'impôt.

Dépôt général pour le gros :

Laboratoires EVANS

17, Rue Rochechouart — PARIS IX

Tél. : Trudaine 45-07

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

PHOSPHATE PINARD ET PHOSPHARSYL

(*Phosphate Pinard Méthylarsine*)

Caractères Généraux. — Extrait directement des os. Se présente à l'état insoluble, *gélatinoidal*, dans un état extrême de division.

Grâce à la constitution gélatineuse de sa molécule, le suc gastrique est sans action sur lui.

Il est *happé* par les hydrates de carbone alimentaires dont il suit l'évolution assimilatrice, d'où son assimilation *maxima*.

Le **PHOSPHARSYL** est le même produit contenant 0 gr. 03 de méthylarsinate sodique par cuillerée à potage.

Indications. — Tuberculose, Prétuberculose, Rachitisme, Affections des os, Croissance, Convalescence, Carie dentaire, Diabète, Inappétence (**PHOSPHARSYL**). Maladies consomptives (**PHOSPHARSYL**).

Posologie. — **PHOSPHATE PINARD** : Une à deux cuillerées à soupe, avant les deux grands repas.

Demi-dose pour les enfants.

PHOSPHARSYL : Une cuillerée à potage, avant les deux grands repas.

Une cuillerée à crème, pour les enfants au-dessus de 6 ans.

N. B. — On obtiendra le maximum d'efficacité en faisant prendre alternativement aux malades, pendant 8 jours, le **PHOSPHATE PINARD** et, les 8 jours suivants, le **PHOSPHARSYL**.

Etablissements du Docteur PINARD
3, *Pass. Harriot* — COURBEVOIE (Seine)

PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE

Glycérophosphates très purs qui ont servi aux expériences de M. le Professeur Albert Robin (Communication à l'Académie de Médecine du 24 Avril 1894).

Formes et Doses. — *Solution gazeuse*:

(de chaux, de soude ou de fer)

2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Granulé (de chaux, de soude, de fer ou composé):

2 à 4 cuillerées à café par jour.

Injectable (de chaux, de soude ou de fer):

1 à 2 injections par jour.

Propriétés. — Double action reconstituante:

1^o *Action reminéralisatrice*, par l'apport du phosphore uni aux bases qui lui sont normalement associées dans l'organisme, sous la forme même — directement assimilable — adoptée par celui-ci;

2^o *Puissante action stimulante sur la nutrition*, par l'intermédiaire du système nerveux et de tout le système glandulaire.

Indications. — Contre toutes les formes de la faiblesse et de l'épuisement: Croissance, Débilité, Anémie, Neurasthénie, Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Surmenage, Convalescences.

Nota. — Ce traitement reconstituant s'associe utilement et sans contre-indications à de nombreuses autres médications: opothérapique, sérothérapique, iodurée, arsenicale, mercurielle, anti-paludique.

Etablissements JACQUEMAIRE

M. MIGUET, Docteur en Pharmacie

VILLEFRANCHE (Rhône)

PHOSPHATINE FALIÈRES

Aliment des enfants, des vieillards,
des surmenés, des convalescents.

S'emploie, pour les enfants, dès l'âge
de 7 à 8 mois, surtout au moment du
sevrage et pendant la croissance.

Associée au lait frais, la *Phosphatine
Falières*, forme une bouillie, d'un
goût très agréable, de digestion
facile.

Chaque cuillerée à bouche contient
0 gr. 20 gr. de phosphate bicalcique,
assimilable.

G. PRUNIER & C^{ie}

6, Rue de la Tacherie — PARIS

R. G. 58.319

PHOSPHO-FLUOR BEYNET

Reconstituant général aux phosphates organiques fluorés
contient encore de la magnésie, du fer, de la silice dans
les proportions où on les trouve dans l'économie.

Forme. — Granulé, cachets, comprimés.

Indications. — Différentes tuberculoses, rachitisme, frac-
tures, ostéites, caries dentaires, grossesse, allaitement,
anémie, convalescence, surmenage, phosphaturie.

Dose et mode d'emploi. — Granulé : adultes : 2 à 4 cuille-
rées à café par jour, pur ou dans un liquide.

Enfants de 2 à 10 ans, 1/2 dose.

Nourrissons : une pincée dans la bouillie.

Cachets ou comprimés. 2 à 4 par jour ; enfants 1/2 dose.

Chaque cuillerée à café de granulé et chaque cachet ou
comprimé contiennent 0 gr. 30 de principe actif.

Prix actuel : 10 francs

Envoi d'échantillons sur demande adressée au

Laboratoire A. BRAY

25, Grande Rue — BRY-S-MARNE

PHOSPHO-GAÏACOL MARY

Nature. — A base de sels calciques assimilables, avec addition de thiocol, acide arsénieux et arséniate de strychnine.

Prop. therap. — Modification rapide des sécrétions bronchiques. Disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires et du lymphatisme.

Forme. — S'emploie sous la forme de granulé, très agréable au goût, à la dose de 2 à 3 cuillerées à café.

Laboratoire LAVADOUX

32, rue de l'Ouest — PARIS

PHOSPHOPINAL JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique.

Indications. — *Réminéralisateur* : maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

Aliment de la cellule nerveuse : maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.

Formes.

Elixir : adultes : 2 cuillerées à café par jour,
enfants : 1 cuillerée à café par jour.

Capsules : adultes : 4 à 6 par jour,
enfants : 2 à 3 par jour.

Gouttes : adultes : 40 à 60 par jour,
enfants : 20 à 30 par jour.

Prix : 8 francs.

Laboratoire du PHOSPHOPINAL JUIN

3, Quai aux Fleurs — PARIS

PHOSPIRINE

Acide salicylique, Acide phosphorique et
Caféine.

Présentation :

Tube de 20 Comprimés de 0 gr. 50.

Boîte de 20 Cachets de 0,50,

Indications thérapeutiques :

Antinévralgique, Antirhumatismal, Anal-
gésique.

Posologie :

2 à 6 Comprimés ou Cachets.

Laboratoires D. DROUET & PLET

37, Rue de Marly — RUEIL (S.-et-O.)

PHOSTANIOL

en toutes saisons et à tous les âges

Compos. — Préparation tanno-iodique
au phospholactate de chaux méthylar-
siné (Parfum délicieux Ananas-fraise)

Pour tous les malades qui acceptent
difficilement l'huile de foie de morue ou
la digèrent mal.

Indications. — Anémie, croissances re-
tardées, états ganglionnaires, inappé-
tence, bronchite chronique, maladies
scrofuleuses, impétigo et toutes der-
matoses.

Littérature et échantillons

Laboratoires COMTOS

F. CHANAL, pharmacien de 1^{re} classe

FÈSCHES LE CHATEL (Doubs)

PHYLACTONE BYLA

Peptone spéciale à polyvalence protéinique et riche en polypeptides.

CACHETS et GRANULE

Dose et mode d'emploi. — Un cachet ou une dose, une heure avant les repas, dans un peu d'eau froide.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique.

Indications. — Migraines, Céphalées, Urticaires et tous états morbides relevant d'une intoxication alimentaire d'origine anaphylactique.

Les Etablissements BYLA

26, Avenue de l'Observatoire, 26

PARIS

R. C. Seine 71825

PHYSIOSTHÉNINE

sérum leucogène

Nucléinate de Lithium (procédé spécial)

Formes. — Boîtes 3 amp. 20 cc., adultes.

— 1 — 20 cc., —

— 4 — 10 cc., enfants.

— 1 — 10 cc., enfants.

Indic. therap. — Grippe, Angine, Broncho-pneumonie, Fièvre typhoïde, Fièvre puerpérale et toutes les infections, quel que soit le siège, quel que soit le microbe, excepté tuberculose.

Pas de réaction sérique.

Toxicité nulle.

Injectons à la seringue, sous la peau, avec novocaïne, ou profondément dans le muscle sans novocaïne.

Laboratoires D. DROUET & PLET

37, rue de Marly, à RUEIL (Seine-et-Oise)

PHYSIOSCYAMINE

Médication du vague et du sympathique :

Composition. — Combinaison définie d'atropine, d'hyoscyamine et d'ésérine activée par la présence de pepsine spécialement préparée, unie à un excipient approprié.

Indications. — Troubles nerveux ressortissant à la dyspepsie hyperchlorhydrique, à la dilatation et à la ptose gastrique tels que : Vertiges, Congestions post-prandiales, Migraines gastriques, Palpitations de cœur d'origine digestive, Tremblements, Somnolence, Bâillements, Constipation d'origine sympathique, etc., etc., etc.

Posologie. — Un cachet 10 à 15 minutes avant les trois repas.

Présentation. — Boîte de 30 cachets.

LABORATOIRE de la CEPHÆMETINE

L. PUECH, Pharmacien

44, rue Gambetta, à BIARRITZ

Dépôt. — Drogueries et Commissionnaires en spécialités.

PHYTINATE DE QUININE CIBA

Phosphate organique de quinine contenant 57 % de quinine et 11 % de phosphore. Réunit l'action spécifique de la quinine à l'action tonique et reconstituante de la Phytine. Très bien toléré. Très soluble.

Indicat. — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraine, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie.). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

Doses. — Les mêmes que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine.

Le tube de 20 comprimés, 6 francs.

Le flacon de 50 comprimés, 12 francs.

On trouve aussi le Phytinate de quinine en vrac, et on peut le formuler comme les autres sels de quinine.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

PHYTINE CIBA

Produit naturel extrait des graines végétales contenant 22 % de phosphore en combinaison organique avec la chaux et la magnésie. Le plus assimilable des médicaments phosphorés. Tonique et reconstituant. Stimulant des échanges nutritifs et de l'hématopoïèse.

Indicat. — Débilité constitutionnelle, Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie, Anorexie, Convalescences difficiles, Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

Cachets — Comprimés — Granulé

Doses. — Adultes : 1 gr. par jour (2 cachets, 4 comprimés, 2 cuillerées à café de granulé). Enfants : 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte.

Cachets et comprimés : la boîte, 9 francs

Granulé : le flacon, 11 francs

On peut aussi formuler la PHYTINE magistralement.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

PILULES du D^r BEAUFUMÉ

(Anciennement Dragées du D^r Beaufumé)
contre l'INCONTINENCE D'URINE

Composition. — Cytisine 0.001. Strychnine basique 0.0025. Scopolia japonica 0.003

Indications. — *Incontinence d'urine* à tous les âges. (Enfants, adultes, vieillards). *Chorée, Diabète.*

Posologie. — 1 à 6 pilules par jour, progressivement.

PHARMACIE CORDIER
PARTHENAY (Deux-Sèvres)

PILULES DE BLANCARD

Al'iodyure de fer inaltérable, approuvées par l'Académie de Médecine de Paris, dosées à 5 cgr. d'iodyure de fer.

Dose et mode d'emploi. — Adultes : 2 à 6 pilules par jour aux trois principaux repas.

Prop. théér. — Agent incomparable d'Hématopoièse.

Indications. — Anémie, Scrofules, Lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles ou constitutionnelles, suite de Gripes infectieuses, etc.

BERTAUT-BLANCARD Frères
64, Rue de La Rochefoucauld — PARIS

PILULES du D^r DEBOUZY

Opothérapie biliaire.

Affections hépatiques. — Lithiase biliaire. — Insuffisance hépatique. — Entéro-colite.

Pilules de 0 gr. 30, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée.

Dose. — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Laboratoires P. LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (11^e)

PILULES EPARVIER

(CASCARA EPARVIER)

Forme et Composition : Pilules contenant toute la partie active de l'écorce du "*Rhamnus purshiana*", à l'exclusion de toute autre substance purgative.

Action physiologique : Action sur le système nerveux sympathique, sur les fibres lisses de l'estomac et de l'intestin et sur les glandes dont les sécrétions concourent à l'acte de la digestion.

Indications : Constipation en général. *Laxatif de choix* dans la grossesse et l'allaitement et chez les hémorroïdaires et les variqueux. Intoxications gastro-intestinales. Migraine. Atonie des voies digestives.

Avantages : Conservation indéfinie. Solubilité rapide et complète. Selles normales, sans coliques, sans diarrhée. *Pas d'accoutumance.*

Dose : Une pilule (rarement deux) le soir, au dernier repas.

Echantillons sur demande à :

LABORATOIRE EPARVIER

26, Grande Rue Saint-Clair — LYON

PILULES EXPECTORANTES DURIEUX

Composition. — Goudron, benzoate de soude, ipéca, opium, extrait de Polygala.

Propriétés thérapeutiques. — Fluidifie les sécrétions bronchiques, facilite l'expectoration.

Indications. — Rhumes, Catarrhes, Bronchites aiguës ou chroniques, Broncho-pneumonies, quand la Toux est sèche et pénible.

Doses. — 4 à 8 par jour (*Adultes*).

PHARMACIE DURIEUX
VIREUX-MOLHAIN (Ardennes)

PILULES GIP

Oxalate de fer 0,10; Extrait de Quinquina rouge 0,05; Intrait de gentiane 0,01.

Dose et Mode d'emploi. — 4 pilules par jour (2 avant chaque repas); dans les cas graves aller jusqu'à 6 par jour. — Enfants : 3 pilules par jour suivant âge.

Prop. Thér. — Spécifiques de l'Anémie et de la faiblesse; régénératrices du sang et des nerfs.

Indications. — Anémie, Chlorose, Convalescence, Lassitude, Vieillesse, etc.

Laboratoire H. NOGUÈS

11, Rue Joseph-Bara — PARIS (6^e)

PILULES HÉLÉNIENNES NAUD

Composition. — A base d'Hélénine cristallisée. Protoxalate ferreux et quassine.

Indications. — D'après les essais chimiques les plus récentes (thèse du D^r E. PARISOT) l'*Hélénine* constitue le spécifique par excellence de la Leucorrhée, sans lésions anatomiques.

Mode d'Emploi. — Sauf indication contraire du médecin, 4 à 8 pilules par jour aux repas.

Echantillon et littérature sur demande

LABORATOIRES LACROIX

29-31, rue Philippe-de-Girard - PARIS, x^e

PILULES D'HERMAL BRETONNEAU

Ces pilules ne donnant pas d'hydrargirisme parce qu'enrobées au gluten, sont très souvent employées à côté des injections mercurielles et même à côté des injections de 606 et de néosalvarsan. Voici leur formule :

Bi-iodure de Mercure.....	0,01
Iodure d'Arsenic.....	0,002
Correctif spécial.....	0,30

Nous croyons devoir prévenir Messieurs les Docteurs que les flacons de vente de *Pilules d'Hermal* ne sont accompagnés d'aucune notice.

Henri RIVIER, succ^r de LANCELOT & C^{ie}
26-28, Rue St-Claude — PARIS

PILULES LEMARY

Traitement mercuriel dissimulé

Dans le traitement de la syphilis acquise ou héréditaire, il y a très souvent un grand intérêt pour le médecin et même pour le malade à ce que ce dernier ignore quelle est la nature du médicament prescrit, soit que le médecin traitant, mal fixé encore sur le diagnostic veuille le fixer définitivement par un essai de médication spécifique, soit qu'il tienne à ne pas troubler la paix d'un ménage, d'une famille, par la révélation de la nature du mal, soit enfin qu'il s'attache pour une raison quelconque à une discrétion absolue. Il trouvera dans les **Pilules Lemary** nom banal quelconque, mais **NOM DEPOSE**, ce qu'il désire : le traitement mercuriel dissimulé ou traitement secret.

L'étiquette du flacon porte seulement cette inscription :

PILULES LEMARY

(formule A ou formule B ou formule C)
fortifiantes, dépuratives, reconstituantes.

Le prospectus placé autour du flacon n'est pas plus explicite et ne peut donner lieu à aucune indication. Le médecin a donc ainsi toute sécurité.

Pour les **Pilules Dupuytren Codex**, prescrire **PILULES LEMARY**, formule A. — Dose habituelle, 1 à 3 pilules par jour, aux repas.

Pour les **Pilules Ricord Codex**, prescrire **PILULES LEMARY** formule B. — Dose habituelle, 2 par jour, 1 à chaque principal repas.

Pour les **Pilules au biiodure de mercure et iodure de potassium**, prescrire **PILULES LEMARY** formule C. — Dose habituelle : 2 à 4 pilules par jour, selon le cas.

Littérature — Échantillons

Laborat. du Docteur H. PHILIPPE

14, Rue Palais-Grillet — LYON

PILULES PHILIPPE

Potassium — Sodium

Forme. — En pilules *kératinisées* ; elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — *Plus de 20 ans de pratique et de succès.*

Prière de prescrire :

Pilules Philippe à l'iodure de potassium (à 0,50
(à 0,20
(à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les Pilules Philippe à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

Pilules Philippe à l'iodure de sodium. à 0,20

Indications. — Artério-sclérose, Adénopathies
Tension artérielle, Goitre, Obésité, Syphilis, etc.

Dose. — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour en deux ou trois fois.

Littérature et Echantillons

Laboratoire du Docteur PHILIPPE

14, rue du Palais Grillet — LYON

PILULES PURGATIVES DU DOCTEUR DEHAUT

à base de Scammonée, aloès et Coloquinte

Tandis que les purgatifs salins ou l'huile de ricin provoquent la répugnance des malades par leur mauvais goût ou les préparatifs qu'exige leur emploi, les pilules Dehaut, au contraire, d'un aspect agréable, sont faciles à prendre et ne nécessitent aucun préparatif spécial.

Elles se prennent en mangeant.

Dose purgative : 2 à 3 pilules ;

Dose laxative : 1 à 2 pilules

Pharmacie DEHAUT

147, Faubourg Saint-Denis — PARIS

PILULES

du Docteur SEJOURNET

antidiabétiques

Indications therap. — Traitement du
DIABÈTE sans régime trop rigoureux.

Doses et Mode d'emploi. — Pilules
dosées à 0 gr. 02 de Santonine, avec
excipient balsamo-résineux.

Reconstituant de premier ordre, etc.
1 Pilule à chaque repas.

Docteur M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (16^e)

PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, $\text{N H} \begin{smallmatrix} \text{CH}^2 \\ \text{CH}^2 \end{smallmatrix} \text{N H}$, alcalin
organique du groupe des Pyridines. (Inscrit au
Codex Français 1908).

Granulé effervescent, dosé à 0,20 egr. Pipérazine
pure par cuillerée à café.

Doses et Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à
café par jour comme préventif. 4 à 6 cuillerées
à café par jour, crises aiguës, dissoute dans un
verre d'eau à distance des repas.

Prop. Ther. — Dissout 92 % des composés de l'acide
urique; réduit les déchets uratiques en stimulant
l'activité hépatique; antiseptise les urines.

Indications. — Le plus actif des remèdes à pres-
crire dans les manifestations de l'Arthritisme et
de l'Uricémie, Goutte, Rhumatisme, Gravelle,
Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques,
Sclérotique, Artério-sclérose, Eczéma, Diabète,
Aucune contre-indication, innocuité absolue sur cœur,
estomac, vaisseaux.

Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17^e)

PLURION COUTURIEUX

Description. — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le PLURION augmente l'activité des organes hématopoïétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

Indications. — 2 à 4 ampoules par jour dans les anémies GRAVES. 1 ampoule par jour dans les anémies des CONVALESCENTS, PALUDEENS, SYPHILITQUES, CANCEREUX. 1 ampoule tous les deux jours dans les cas plus bénins.

Laboratoires COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

PNEUMOCRATOL

Forme.

Comprimés à base de : arsenic, manganèse, phosphore, strychnées, chaux, fluor, silice, ac. cinnamique, gaïacol-sulfonate, extraits opothérapiques.

Indications.

Affections pulmonaires aiguës et chroniques.

Tuberculose, en particulier.

Contre-indications.

Aucune.

Doses. — 6 à 10 comprimés par jour dans les affections pulmonaires autres que la tuberculose, 10 à 15 dans ce dernier cas.

Littérature franco sur demande

L. BOURDIER

147, faubourg Saint-Denis. — PARIS

PNEUMOGÉINE RENARD

SPÉCIFIQUE DES

DYSPNÉES

Composition. - Iodure double de caféine et de théobromine (chaque cuillerée à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine combinés à l'iode et en solution dans un véhicule qui en masque le goût.

Propriétés thérapeutiques. - L'action de l'iode et de la caféine se trouve renforcé et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques » (Huchard).

La PNEUMOGÉINE par son action

régulatrice respiratoire assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel.

cardio-tonique, soutient le myocarde défaillant, abaisse la tension artérielle.

éliminatrice, débarrasse le sang des toxines et des déchets qui y sont accumulés.

Indications. — Tous les états dyspnéiques: asthme, emphysème, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.

Posologie. — Dose journalière : 2 à 4 cuillerées à café. Verser le matin la dose prescrite dans un verre d'eau sucrée qu'on absorbe par petites gorgées dans le courant de la journée.

PRIX: 8 fr. 80

J. RENARD, docteur en Pharmacie

142, Avenue de Clichy et 2, Rue Gauthier

— PARIS —

POLYMINERAL FORT

GRANULÉ

Composition. — Adrénaline, fluorure de sodium, phosphate de manganèse, hydrate de magnésie, formiate de chaux, phosphate de potasse, lactate de chaux, glycérophosphate de chaux.

Indications. — Reminéralisateur pouvant être utilisé pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes de croissance, etc....

Formes et doses. — Existe sous formes de: Polyminéral adultes (Adrénaline 0,001 Fluorure de sodium 0,02 par mesure).

Doses: 3 à 6 mesures par jour.

Polyminéral enfants: (Adrénaline 0,0005. Fluorure de sodium 0,01 par mesure).

Doses: Bébés de 1 à 3 ans: $\frac{1}{2}$ à 1 mesure; enfants de 3 à 8 ans: 2 à 3 mesures; enfants de 8 à 15 ans: 4 à 5 mesures.

Echantillons :

Laboratoires A. FOURIS

13, rue Lacharrière. — PARIS-III^e

POMMADE LENOIR

à la Cinnamoléine

Traitement spécifique des dartres chroniques; s'adresse exclusivement à ces eczémas à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux dont la ténacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le Pityriasis du cuir chevelu, en décapant la couche épaisse des pellicules qui enserrant et étouffent les cheveux, elle enraye la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions excitantes et microbicides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sebumbacille enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les verues plates séborrhéiques du visage, dites crasse des vieillards, les psoriasis, le sycoosis, la teigne, le favus.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir sur la partie malade.

LABORATOIRES A. LEJEUNE

12, rue Emilio-Castelar. — Paris-XII^e

POMMADE LOGEAI

Composition. — Dosée à 20 %, d'oléosulfonate d'hamamélidine, combinaison définie d'une huile sulfonée spéciale avec un extrait glycéринé total d'hamamelis préparé sans alcool.

Ni stovaïne, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques.

Propriétés. — Analgésique, décongestionnante et doucement vaso-constrictrice. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite. Ne tache pas le linge.

Indications. — Hémorroïdes externes. Prurit anal.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir après lavage avec le doigt enduit d'une forte couche de Pommade Logeais et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes).

A noter l'absence de canule reconnue inutile et dangereuse.

Laboratoires LOGEAI

24, Rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE

POMMADE MIDY

(Adréno-Styptique)

(Adrénaliné, Stovaïne, Anesthésine et Extrait de marrons d'Inde frais, stabilisé), Hamamelis.

Mode d'emploi. — Une application matin et soir, et après les gardes-robes.

Prop. thérap. — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction, antisepsie.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes haut placées.

Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll, 4

PARIS (17^e)

POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmiques

Composition. — A base de nitre et des solanées les mieux triées (récoltes de 1^{er} ch.)

Indic. thérap. et formes. — N° 2 (la plus faible) : Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foinés, fins de coqueluche, etc.

Mode d'emploi. — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise ; la prévenir par une fumigation anticipée, et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

Prix de vente : 5 fr. (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

Laboratoire ESCOUFLAIRE, à Baliseux (Nord)
(Echantil. grat. sur demand. de MM. les Doct.)

PRÉVENTYL

Nécessaire de poche de prophylaxie
antivénérienne

Le premier créé en France sous le contrôle et d'après les conseils des Maîtres de la vénéréologie française.

Composition. — En 3 tubes d'étain de couleur différente :

- 1° Pommade de Metchnikoff (calomel 33 %) ;
- 2° Gelée au protargol à 3 % ;
- 3° Emulsion de savon ;
- 4° Une cartouche de ouate hydrophile.

Présentation. — Grand modèle (7 fr.), pour 8 à 10 applications.

• Petit modèle (3 fr. 50). aspect et format d'une boîte d'allumettes, pour 3 applications.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires MARCHAND & LEROY

40, Rue d'Enghien. — PARIS (X^e)

Téléphone Bergère 37-13

PRODUITS DIÉTÉTIQUES FAVRICHON

Phosphogène :

De toutes les farines alimentaires, la plus riche en phosphates assimilables. Convient à tous les enfants pendant la croissance, mais particulièrement aux enfants chétifs, à ceux dont la dentition est en retard ou dont le système osseux ne se développe pas d'une façon normale. Aliment de choix des jeunes mères pendant la grossesse et l'allaitement. Répare rapidement les pertes en éléments phosphatés chez les convalescents.

Crème de Cacao

Soupe de grains grillés,

Farines naturelles mélangées,

Céréales granulées, etc.

Littératures et échantillons

sur demande

J. FAVRICHON

Pharmacien-Chimiste

Usine créée en 1890 à

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

(Loire)

PROPIDEX

Pommade à base de Propidon.

Préparée sur les indications de M. le Professeur Pierre DELBET, cette pommade répond aux idées actuelles sur la vaccination cutanée.

Indications. — Pyodermites, Furoncles, Brûlures, Plaies en surface, Eschares, Engelures, Ulcères variqueux, etc.

Mode d'emploi. — Applications 2 fois par jour. Recouvrir d'un tissu souple stérilisé.

Littérature sur demande.

Les Etablissements POULENC Frères
86 et 92, Rue Vieille-du-Temple. — PARIS

R. C. Paris 5386

PROPIDON

Bouillon stock-vaccin du Prof. Pierre DELBET

Composition. — Association, en proportions définies, de cultures en bouillon de streptocoques, staphylocoques et B. Pyocyanique. Vieillissement suivi de chauffage. Ces procédés d'atténuation permettent d'injecter le protoplasma microbien à doses massives.

Indications. — Staphylococcies fébriles, anthrax, phlegmons, ostéo-périostites dentaires, osteomyélites, annexites et pelvi-péritonites, érysipèle, lymphangites, infections pyogènes, etc.

Mode d'emploi. — Délivré par boîtes de 3 ampoules contenant chacune 4 cm³ de vaccin. On pratique, selon le cas, une à trois injections intra-musculaires d'une ampoule chaque fois, à trois jours d'intervalle. Pratiquer chaque injection à la face externe de la fesse en deux points différents. Les phénomènes locaux et généraux, parfois assez intenses, se calment après quelques heures. Effet thérapeutique rapide.

Littérature sur demande

Les Etablissements POULENC Frères
86 et 92, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

R. C. Paris 5386

PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergique.

Anémie. - Chlorose. - Débilité. - Convalescence.

Vingt gouttes de Prosthénase contiennent 1 centig. de fer et 5 milligr. de manganèse.

5 à 20 gouttes pour les enfants

10 à 50 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Muse — PARIS (4^e);

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

PROTÉODYNE

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon

Composition :

Sélection de noyaux aminés de Peptones et d'Albumoses.

Forme :

Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 25 de principes actifs
(*Enfants*).

Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 50 de principes actifs
(*Adultes*).

Injectons hypodermiques indolores.

Jamais de choc, ni de réactions anaphylactiques.

Propriétés :

Par ses effets préventifs et curatifs des infections fébriles et des intoxications, la Protéodyne est une arme puissante toujours à la disposition du médecin devant une infection dont il n'a pas le sérum spécifique.

Indications :

Infections fébriles en général : Grippe, Pneumonies, Fièvres typhoïdes, Puerperales, etc.,
Dermatoses par auto-intoxication, Urticaires, Furunculose, Migraines, etc., etc.

Doses :

Adultes. — 1 à 2 ampoules à 0 gr. 50 à la première injection.

Enfants. — 1 à 2 ampoules à 0 gr. 25 à la première injection.

A renouveler de 24 en 24 heures ou de 48 en 48 heures, si la sédation des accidents infectieux n'a pas été obtenue ou ne s'est pas maintenue.

Chez le jeune enfant, réduire la dose suivant l'âge et le poids.

La Protéodyne ne doit être employée que sous le contrôle du médecin.

PRIX :

La boîte de 4 ampoules : 15 fr., impôt compris

Communications du professeur DUBARD de Dijon : Journal de Médecine et de Chirurgie pratique 1919 ; La Clinique et le Scalpel 1923.

Littérature et Echantillons sur demande au

LABORATOIRE D'ÉTUDES BIOLOGIQUES

29, Place Bossuet — PARIS

PROXYTOL

Association des Proxytases des organes de la digestion (Foie, Estomac, Intestin, Pancréas).
Spécifique des affections gastro-intestinales.

MODE D'ACTION :

Assure le fonctionnement cellulaire normal par l'apport des ferments de synthèse ; active la nutrition de l'organe, rétablit les sécrétions.

INDICATIONS :

1° Les dyspepsies ; 2° Les entérites ;
3° L'insuffisance hépatique.

FORME :

Boîte de 36 comprimés.

DOSES :

De 2 à 4 comprimés par jour le matin à jeun avec un peu d'eau.

PROXYTASES

Diastases tissulaires pures spécifiques
à chaque organe

Catalyseurs biologiques réglant l'assimilation
Intime, permettant à l'organe déficient de
restaurer ses lésions et de recouvrer son
activité physiologique.

Action rapide, rigoureusement spécifique.

INDICATIONS :

Les insuffisances fonctionnelles de chaque organe.

PRESCRIRE : PROXYTASES OVAIRE, PROXYTASES REIN, PROXYTASES CŒUR.

FORMES :

Boîte de 36 comprimés pour tous les organes.

DOSES :

Proxytases de Foie et de Poumon : de 4 à 6 comprimés par jour. Autres Proxytases : de 2 à 4 par jour, à prendre le matin à jeun.

Laboratoire des Proxytases

21, Rue d'Aumale — PARIS (IX^e)

Téléph. Trud. 46-07

PROVEINASE MIDY

(Comprimés)

Composition :

1° Extraits secs (desséchés dans le vide) des plantes stabilisées : Cupressus, Viburnum, Maron d'Inde et Hamamelis.

2° Poudres d'organes à sécrétion interne : Thyroïde, Surrénale et Hypophyse.

Propriétés therap. — Synergie régulatrice de l'insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapeutiques des glandes endocrines et les vertus vaso-constrictrices de plantes soigneusement sélectionnées.

Indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles congestifs de la Ménopause et de la Puberté.

Mode d'emploi :

Etats chroniques : 2 à 3 comprimés par jour.

Etats aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel Moll — PARIS

PULMOCARDINE

Asthme et maladies cardio-respiratoires.

Composition :

Quebraco : Combat la dyspnée et augmente l'amplitude des mouvements respiratoires.

Grindelia : Expectorant, diminue la tachycardie et la dyspnée.

Lobélia : détend la contracture et supprime l'angoisse.

Iodure et Caféine : fluidifie les sécrétions bronchiques, regularise le cœur et restitue l'énergie à la systole.

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchite chronique, Angine de poitrine, maladies du cœur et des vaisseaux, etc.

Doses. — 2 dragées au début des 2 repas.

Laboratoire J. FERROCHON

57, rue Origel — TOURS

PURGANOL DAGUIN



Forme. — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0,25. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1/2 à une pastille le soir au coucher.

Enfants : 1/4 à 1/2 que l'on devra sucer lentement.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage, ainsi que les nourrices.

Echantillons sur demande aux

ETABLISSEMENTS DAGUIN,
à SAINT-MAUR (Seine)

PYRATONE

(Guérison rapide de la Coqueluche)

Le PYRATONE est un composé de métaux colloïdaux, mis sous forme de comprimés, possédant des propriétés antimicrobiennes et électro-chimiques.

D'une innocuité absolue, se donne aux enfants de tout âge, même de quelques mois, à la dose de un comprimé après chaque quinte. La guérison commence généralement dès le 3^e jour du traitement.

Littérature et échantillon sur demande.

PHARMACIE FERRÉ

71, boulevard Saint-Michel — PARIS

PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide; Gouttes; Ampoules.

Composition. — Dérivé polyaminométhylé du Pyrazocarbamate d'éthyle.

Emploi et doses. — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée, 60 c.c. avec 0,30-0,50 de bicarbonate).

Gouttes. Adultes : 25-50 à répéter à intervalles de 20'. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives 80-100, si nécessaire. Maximum : 300 *pro die*.

Enfants : 1 à 2 gouttes par année d'âge.

Indications antithermiques : Donner à doses réfractées.

Ampoules A — 2 cc. antithermiques : 1 à 2 ampoules, avec ou sans médication intercalaire.

Ampoules B — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabès, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : 200 gouttes.

Injectons intramusculaires.

Indications. — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaires (25-50 à répéter), chercher la dose-levier; Dysménorrhées (25-50); Arthrites, Lumbagos, Sciatiques, Radiculites, Poly-névrites, Syringomyélie (doses variables); Algies syphilitiques, Tabès, Cancer (60-80-100 gouttes, permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine); Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (25-50, 2 fois par jour); phénomènes douloureux, inflammatoires et traumatiques. (Post opératoire en petite chirurgie.) — Echantillons et Littérature.

Dépôt — Paris: **Pharmacie P. LOISEAU**

7, Rue du Rocher — PARIS

Laboratoires **CAMUSET**, ABLON (S.-et-O.)

QUASSIA-KINA RABOT

aux écorces d'oranges amères

Prop. thérap. — Reconstituant énergique. Le meilleur stimulant de l'appétit. Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

Indicat. — Asthénie. Vertiges stomacaux. Inappétence. Débilité, Convalescences.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi. VIN: Un verre à madère aux 2 principaux repas. Véhicule idéal de la médication iodée.

GRANULÉ: Convient particulièrement aux enfants, ainsi qu'aux malades chez qui le vin est contre indiqué. Ad. 1 cuill. café aux repas. Enfants: $\frac{1}{2}$ dose.

DRAGEES: prix moindre pour un traitement plus long. Ad. : 3 à 6 p. j. $\frac{1}{4}$ d'heure av. les repas. Enfants: $\frac{1}{2}$ dose.

C. DAVID-RABOT,

Docteur en Pharm. Anc. Int. Hôp. de Paris
49, rue de Biche. — COURBEVOIE (Seine)

QUIÉTOL

Bromhydrate de diméthylaminovaléryloxy-
isobutyrate de propyle

Le *Quiétol* peut être employé dans tous les cas où il faut calmer une douleur nerveuse, ou un système nerveux surexcité.

Les indications sont celles de la Valériane et des Valérianates.

Il n'est pas toxique et ne produit aucun effet désagréable.

L'emploi du *Quiétol* ne comporte aucune contre-indication.

Mode d'emploi et doses. — Un à quatre cachets de 0 gr. 50 par jour, suivis d'absorption d'une certaine quantité de liquide.

Littérature sur demande

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

QUIETYL

Composition et forme. — Chaque cachet contient :

Valériane stabilisée.....	0.20
Diéthyl malonylurée.....	0.20
Bromure de potassium.....	0.10
Extrait de jusquiame.....	0.01

Prop. thérap. — Hypnotique puissant, agréable, d'absorption facile.

Indications. — Spécifique incomparable de l'insomnie résultant de : surmenages, intoxications, états nerveux, retour d'âge, maladies aiguës, etc.

Posologie et mode d'emploi. — Le soir, au coucher, 1 à 2 cachets dans une infusion d'eau chaude. Au maximum : 3 cachets par 24 heures.

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo. — PARIS-XVI^e

QUINA BARON

à l'extrait sec complet de quina

Solution sans alcool, correspondant à 0 gr. 50 d'extrait par cuillerée à soupe.

Mode d'emploi :

Deux à trois cuillerées à soupe par jour, avant chaque repas.

Propriétés :

Anémiés, convalescents, tuberculeux, opérés, et dans tous les cas où l'organisme doit être tonifié.

P. FOURNIE

pharmacien de 1^{re} classe

3, place de la Miséricorde — LYON

“ QUINBY ”

Quinio-Bismuth « Formule Aubry »
Adopté et employé dans les Hospices
et dans les Hôpitaux civils et mili-
taires français.

Iodo-Bismuthate de Quinine pur stable
en suspension huileuse à 10 gr. par 100
cm³. stérilisée et prête pour l'emploi.

Propriétés thérapeutiques :

Non toxique. — Spécifique extrê-
mement puissant de la *Syphilis* à
toutes les périodes.

Influence surprenante sur les lésions
de la *Syphilis nerveuse*, de l'hérédo-
syphilis, par action combinée de
l'iode, de la Quinine et du métal
spécifique, le *Bismuth*. Action re-
marquable sur les ganglions. Tolé-
rance parfaite. *Pas de douleur à
l'injection. Pas de stomalite.*

Posologie :

Adultes : Pratiquer douze injec-
tions de 3 cm³.

Enfants : Pratiquer douze injec-
tions de 2/10 de cm³ par année
d'âge.

Ces injections devront être intramus-
culaires profondes et faites dans la
région fessière haute, à 3 jours
d'intervalle (consultez notre nou-
velle littérature).

Se méfier des contrefaçons

Exiger “ Formule AUBRY ”

Echantillons et littératures

Laboratoires CANTIN

à Palaiseau (Seine-et-Oise) France

QUINÉASE

Phosphoformate de quinine.

Boîtes de 12 Ampoules dosées à 25 cgr.

— — — — — 50 cgr.

— 20 Comprimés de 25 cgr.

— 10 — 50 cgr.

Propriétés thérapeutiques. — **TOXICITÉ** moindre que le chlorhydrate du même sel. Jamais d'escharses.

Diffusibilité. — 20 minutes au maximum, après l'injection, le goût de quinine est perçu dans la bouche.

L'injection ne provoque pas, ou peu, de nodosité, preuve manifeste de la diffusibilité.

Mode d'emploi. — Injection, soit dans un muscle, soit dans le tissu cellulaire sous-dermique. L'injection est indolore.

Laboratoires D. DROUET & PLET

37, rue de Marly, à RUEIL (S.-et-O.)

QUINEINE

Extrait intégral des principes
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassées de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour, dose fébrifuge: 1/2 cuillerée à café En solution non alcoolique.

Laboratoire des Produits Scientia

21, rue Chaptal

PARIS

QUINOFORME LACROIX

Composition. — Formiate basique de quinine.

Avantages. — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine.

Le plus riche en quinine (87,56 0/0 de sels basiques ou neutres).

Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

Indications. — Paludisme, Fièvres malariques, Fièvres intermittentes.

Formes pharmaceutiques :

Ampoules, 6 et 12 ampoules de 0,25 et 0,50.

Cachets, 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50.

Comprimés, 10 et 20 comprimés de 0,10 à 0,50.

Laboratoires H. LACROIX

V. Mérobian, Successeur

29 et 31, Rue Philippe-de-Girard — PARIS (10^e)

QUINOÏDINE DURIEZ

Dragées contenant chacune 0,10 quinoïdine.

Tonique et fébrifuge. Supérieure à la quinine contre les récidives des fièvres intermittentes et la cachexie tellurique (Docteur Burdel, *Union Médicale*, novembre-décembre 1878, etc.), sans ses inconvénients habituels (bourdonnements d'oreilles, troubles gastriques), malgré l'usage prolongé.

V. *Bull. Académie de Médecine*, 21 mai 1878
Communication du Dr Burdel. — Communications des Drs Le Moine, Dardenne, Dujardin-Beaumetz, etc., etc. — *NOTICE* sur demande.
4 à 6 dragées par jour pendant 2 à 3 semaines.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS

RADIOLYSINE

Complexe colloïdal radio-actif
en solution isotonique injectable

Composition. — Mésorhénium, Cu, Mg, Si, Fe, Mn, Ph. Ca.

Propriétés. — La Radiolysine réalise la chimiothérapie totale du Cancer. Elle permet au médecin d'administrer simultanément à son malade tous les éléments qui ont donné des résultats dans le traitement du cancer.

Indications. — Tous les cancers, soit comme médication adjuvante du traitement chirurgical (prévient les récidives) ou des traitements radium et radiothérapiques dont elle prolonge l'action. Cancers inopérables.

Présentation. — En boîtes unitaires, chaque boîte contenant les 2 ampoules jumelles nécessaires pour une seule injection de 5 cm³.

Mode de prescription. — Prescrire 10 Radiolysine, pour une série de 10 injections intramusculaires, une tous les 3 jours.

N.-B. — Aucune indication ne révèle au malade la nature de l'affection pour laquelle il est traité.

Laboratoire des Colloïdes Radio-Actifs

41, Rue de Rome — PARIS (VIII^e)

RECONSTITUANT MARY

Prop. therap. — Tonique de premier ordre. Grande richesse thérapeutique : Quina, coca, kola, gentiane, quassia, cacao, noix vomique. Fer organique et Phosphates.

Traitement curatif des Anémies, Lymphatisme, Anorexie, Convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. — Demi-dose pour enfants.

Laboratoire LAVADOUX

32, rue de l'Ouest — PARIS

RECTOPANBILINE

Forma. — Solution.

Définition. — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du D^r Bensaude amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la billogenèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

Composition. — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* glycérimé.

Indications. — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (Troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose* dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts : Hernies, Grossesse, Accouchements.

Posologie. — Une à trois cuillerées à café dans 160 grammes d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — Demi-dose pour les enfants.

Echantillon, Littérature

Laboratoire de la PANBILINE

ANNONAY (Ardèche)

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Æsculine adrénalinée et d'Ortho-cocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdicure parfait.

Prop. théér. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice, Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Laboratoire de la Varillaxine
164, Rue Saint-Honoré, 164
PARIS

RÉNALEPTINE

Adrénaline pure. — Lévoogyre
Dioxy-phényléthanol-méthylamine

Sous le nom de *Rénaleptine* nous présentons une Adrénaline très pure dont, en dehors des constantes physiques et chimiques, nous déterminons les constantes physiologiques; toxicité et pouvoir vaso-constricteur.

Nous pouvons donc donner la plus formelle garantie de son activité thérapeutique et de la constance de celle-ci.

Indications médicales. — Insuffisance surrénale, défaillance cardio-vasculaire et hypotension, crises nitritolides.

Indications chirurg. — Dans tous les cas où une ischémie locale temporaire est nécessaire.

Présentations :

En flacons de 15 gr. d'une solution au millième.

En boîtes de 10 ou 5 ampoules de 1 cc., marque *Pragma*, pour injections hypodermiques contenant 1 milligr. ou 1/2 milligr. de Rénaleptine par cc.

Littérature franco sur demande.

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, rue Vieille-du-Temple — PARIS (3^e)

R. C. Paris 5386

RESYL

Antiseptique pulmonaire

Ether glycéro-gaiacolique soluble, Non caustique, libère du gaiacol à l'état naissant. Antiseptique pulmonaire et modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

Indicat. — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température. Bronchites et toutes affections de l'appareil respiratoire en général.

Sirop, Comprimés, Ampoules.

Doses. — 2 à 6 cuillerées à café de sirop, de 2 à 6 comprimés par 24 heures. Voie hypodermique : une ampoule tous les 2 jours.

Sirop, le petit flacon : 7 fr.

— grand — : 12 fr.

Le tube de 20 compr. : 5 fr.

La boîte de 12 amp. : 10 fr.

O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

RÉTHRAGINE

Médication bactéricide et radioactive des affections urétrales aiguës et chroniques, chez l'homme et chez la femme.

Nature du Produit. — La Réthragine est une composition médicamenteuse présentée sous forme de bougies renfermant en milieu indolore un organate d'argent titré à 20 % d'argent pur, de l'acide urique et du Bromure de Radium au maximum d'activité et répondant à des constantes physiques nettement déterminées.

Indications. — La Réthragine, sous forme de bougies urétrales, permet de lutter efficacement non seulement contre les infections de l'urètre, mais encore contre celles des glandes contenues dans l'épaisseur de la muqueuse.

Prescrire : Hommes : Bougies (Réthragine H) ; Femmes : Bougies (Réthragine F).

Demander renseignements et littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

RHAGADINE BRACQUEMOND

à base de KÉRATINE

Forme. — Tubes aseptiques.

Prop. thérap. — La *Rhagadine*, à base de Kératine, d'une innocuité absolue, possède des propriétés durcissantes assez grandes pour raffermir l'épiderme le plus délicat ; mélangée à des corps gras, maintient à l'épiderme toute sa souplesse sans atténuer en rien les propriétés spécifiques de la substance médicamenteuse agissante.

Indic. thérap. — Gerçures des seins, Erythèmes des nouveau-nés, déchirures du périnée, Fissures anales chez les hémorroïdaires, Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies déchiquetées ou par arrachement.

Laboratoire BRACQUEMOND

71, Avenue de Villiers — PARIS (17^e)

RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccin curatif antigonococcique

Constitution. — Corps bacillaires rigoureusement stérilisés et enrobés dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver inaltérés jusqu'au niveau de l'intestin, où leur absorption détermine un processus naturel de défense organique.

Indications. — Agit efficacement contre tous les états infectieux ; d'origine gonococcique chez l'homme et chez la femme (blennorrhagie, orehite, métrite, salpingite, salpingo-ovarite, rhumatisme gonococcique).

Doses. — 4 à 6 sphérules par jour, loin des repas. Aucune réaction locale ni générale.

Produits spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIÈR, Pharmacien

9, cours de la Liberté — LYON

RHEOTHYMINÉ Ch. GAUTIER

Comp. — Préparation à base d'acide thymique purifié.

Forme. — Capsules pour adultes dosées à 0 gr. 30.
1 capsule pour enfants dosées à 0 gr. 15.

Indic. — Toutes les helminthiases : oxyures, trémas, ascari-
rides, trichocéphales, bothriocéphales, ankylostomes.

Posol. - Mode d'emp. — *Adultes* : Pendant deux ou 3
jours consécutifs le matin 8 capsules à raison de 2 toutes
les 1/2 heures.

Le dernier jour, 4 heures après la dernière prise, pren-
dre un léger purgatif salin (20 gr. sulfate de soude).

Enfants : (à partir de 7 ans) comme précédent : pren-
dre 4 à 10 capsules suivant l'âge. Réduire le purgatif à
10 gr. de sulfate de soude.

Observ. import. — Proscrite absolument pendant la
durée du traitement les dissolvants du thymol, en parti-
culier l'huile et les liqueurs alcooliques.

Littérature et échantillons :

Spécialités Pharm. - Ch. GAUTIER

13, Rue Dorian, 13 — PARIS (XII^e)

RHESAL VICARIO

Succédané inodore du salicylate de
méthyle. Liquide rapidement absor-
bable par la peau, sans provoquer la
moindre irritation cutanée.

Action prompte et durable.

Mode d'emploi :

En onctions, deux à trois fois par
jour, en recouvrant de flanelle ou même
de taffetas gommé.

Indications :

Rhumatismes. Goutte. Névralgies.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (9^e)

RHIZOTANIN CHAPOTOT

Composition. — Tanin physiologique vivant directement assimilable, sels de chaux et de magnésie.

Forme. — Cachets.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, états tuberculeux et pré-tuberculeux, états de consomption, bronchites chroniques. Attaque directe des bacillons.

Neutralisation des toxines.

Consolidation du terrain affaibli.

Amélioration rapide des accidents diarrhéiques.

Exaltation des réactions défensives de l'organisme

Posologie. — 4 à 6 cachets par jour.

Laboratoires CHAPOTOT

56, Boul' Ornano, 18 et 20, rue Championnet
PARIS 18^e

Registre du Commerce PARIS 20.019

RHODAZIL

(Solution aromatisée
de Benzoate de Benzyle U. R.)

Médication antispasmodique des muscles laxes

Parfaite tolérance — Aucune toxicité

Indications.

Asthme vrai, Coqueluche, Spasmes du pylore, Colique hépatique, Dysménorrhée, Hoquet persistant, Hypertension, Mal de mer, etc.

Posologie.

Chez l'adulte, 30 à 40 gouttes, renouvelées toutes les trois ou quatre heures.

En médecine infantile, 2 à 4 gouttes par année, renouvelées toutes les trois ou quatre heures.

Laboratoire des Produits

USINES DU RHONE

21, Rue Jean Goujon, 21 — PARIS (8^e)

RHOMNOL



A base d'acide nucléinique pur et de nucléophosphates naturels.


Indic. thér. — Puissant reconstituant du noyau cellulaire, antineurasthénique de choix, indiqué dans toutes les affections dysérasiques consomptives.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0,05 : 4 à 6 par jour aux repas. *Saccharure* (granulé) 0,10 par cuill. à dessert; une cuill. à dessert aux repas, pour adultes; moitié ou quart pour les enfants, suivant l'âge. *Ampoules* 1 c. c. (0,05 de nucléinate de soude par c. c.) pour injections hypodermiques. (Spécialement indiquées dans les maladies infectieuses aiguës.)

Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

RIODINE



Compos. — Ether glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20 % d'iode.

Forme. — Flacon de 50 perles. Chacune représentant l'action de 0,20 cgr. environ d'iodure alcalin.

Prop. Physiol. — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable.

Action prolongée et durable sans iodisme.

Indications. — Affections cardio-vasculaires : Artério-sclérose, Myocardites chroniques, Hypertension, etc. — Affections respiratoires chroniques : Emphysème pulmonaire, Bronchites chroniques, Asthme, etc. — Affections diverses : Obésité, Rhumatisme chronique, Scrofule, Syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Dose. — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 7 fr. 15 (sans impôt)

Laboratoires P. ASTIER

41 à 47, Rue du Docteur-Blanche — PARIS (16^e)

RUTONAL

Phénylméthylmalonylurée

Hypnotique et anti-épileptique.

Les propriétés thérapeutiques du *Rutonal* sont très voisines de celles du *Gardénal*. Grâce à son action plus atténuée, elle se prête au traitement des sujets sensibles au *Gardénal*, ainsi qu'à la cure d'autres affections nerveuses : états anxieux, etc.

Doses moyennes pour adultes : 1 à 4 comprimés à 0 gr. 20 par 24 heures.

Mêmes recommandations que pour le *Gardénal* dans la conduite du traitement.

Littérature sur demande.

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple. — PARIS

R. C. 5386

RYTHMOS LEYSIN

Composition. — Iode (sans iodisme), Muguet, Mais, Crataegus, Borneone, Gui, Arséniate de soude.

Indications. — Asystolie, même lorsque la Digitale et la Digitaline se montrent inefficaces, Asthme, Angine de Poitrine, Arythmies, Endocardites, Eréthysme, Insuffisance aiguë du cœur gauche, Insuffisance irréductible du cœur droit.

Propriétés. — Toni-Cardiaque de grande puissance et d'extrême souplesse. Eupnéique et Hypotenseur énergique à action durable.

Posologie. — 2 à 6 demi-cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, à n'importe quel moment de la journée. Supprimer les collyres mercuriels et les insufflations de calomel dans les yeux,

Prix : 22 fr. 40 — Au Corps Médical : 16 fr. 50

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e)

SALAS-EMBROcation

Sans acide

(l'acide durcit le muscle et irrite la peau)

La seule Embrocaction
admise par le corps médical

Composition. — Térébenthine, capsicum, gingembre, tannin de rathania. Ce dernier produit possède une puissante action astringente sur le tissu musculaire.

SALAS-EMBROcation est incontestablement le liniment dont la formule est la plus logique et la plus complète.

Indications. — Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Douleurs névralgiques, Migraines, Lumbago, Rhumes, Maux de gorge, Foulures, Contusions, Massages, Consolidation de fractures, Contractures musculaires, etc. *La valeur de deux cuillerées à bouche de « SALAS-EMBROcation » mélangée à un bain chaud donne d'excellents résultats dans les cas de raideur et de fatigues musculaires.*

SALAS-EMBROcation n'attaque ni le métal, ni l'émail des baignoires et ne renferme aucun produit toxique.

Société Alsacienne de Laboratoires
23, rue d'Ouessant — PARIS (xv^e)

SALASENYL

Le **SALASENYL** est un antiseptique à base de chloramine T, chimiquement pure.

C'est une poudre blanche cristallisée, soluble dans l'eau en donnant une solution légèrement alcaline.

Les solutions sont *stables*, ce qui permet de les préparer à l'avance dans les hôpitaux ou cliniques.

Indications. — Toutes les fois que le médecin ou le chirurgien devra lutter contre les *accidents septiques*. Désinfection des Plaies récentes, purulentes, Furunculose, eczéma, Pyorrhée alvéo-dentaire, désinfection en gynécologie.

Forme. — Petits comprimés dosés à 0 gr. 25, dose moyenne 3 par litre d'eau.

Société Alsacienne de Laboratoires
23, Rue d'Ouessant — PARIS (XV)

SALÈNE CIBA (et SALÉNAL CIBA)

Ethers méthyl et éthyl-glyco-salicylique possédant, à un haut degré, les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais ayant sur ce dernier l'avantage de l'absence d'odeur et de toute action irritante.

Indicat. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticollis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

Doses. — Se formule magistralement, pur ou en liniment par 5 ou 10 gr.

Le **SALENAL** (pommade au Salène) est vendu en tube de 30 gr. Prix : 6 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

SALSANOS

A base de sels de soude (sulfate, phosphate, tartrate, citrate)

Forme. — Sel granulé, effervescent, soluble et d'un goût agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Maintient l'alcalinité du sang, empêche celle de l'urine, diminue l'acide urique et participe à son élimination, aide à la dissolution des urates et des oxalates, active la combustion des graisses.

Indications. *Artério-Sclérose*, - Gastralgie, Arthritisme, Rhumatisme, Goutte, Coliques hépatiques et néphrétiques, Maux de tête, Troubles digestifs, Obésité et en général toutes les affections du foie et des reins.

Doses. — Une à trois cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau le matin à jeun.

ROBERTS & C^e, Pharmaciens

5, rue de la Paix — PARIS

SALUBRINE PHENIX

Composition. — Antiseptique puissant à base d'aldéhyde formique et de thymol.

Forme pharmaceutique. — Solution inodore miscible à l'eau; d'odeur agréable, ne tachant pas le linge.

Indications. — Gynécologie, accouchements, pansements, hyperhydrose.

Posologie. — 1 ou 2 cuillerées à soupe par litre d'eau (Usage externe).

LABORATOIRE P. MAUCHANT

14, rue de Birague, PARIS-IV^e

SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche
et des maladies des Voies respiratoires

Propriétés thérapeutiques. — Médicament
héroïque, calmant énergique de la toux,
anti-fébrifuge de premier ordre, médica-
ment antigrippal et anti bronchitique, par
excellence.

Indications.

Laryngites.

Trachéites.

Rhumes vulgaires.

Bronchites aiguës.

Bronchites chroniques dites négligées.

Affections pulmonaires.

Grippes et ses formes.

Coqueluche et toutes les toux de l'enfant.

Deux formes.

Elixir (adultes).

Gouttes (enfants).

LABORATOIRE Georges TINARD

134, boulevard Péreire. — PARIS-XVII

SALYSÉRUM

du Docteur Jules SÉJOURNET

Composé cosalysile

(Communication Académie de Médecine.)

Forme. — Ampoules de 1 cc. d'acide
salicylique indolore.

Indic. therap. — Rhumatisme aigu ou
subaigu. Pleurodynies, Torticolis,
Lumbagos, Rhumatisme gonococ-
cique. Sciatique. Goutte.

Injections complètement indolores.

Laboratoires

de Biologie et de Physiologie appliquées

D. DROUET & PLET

37, rue de Marly, à RUEIL (Seine-et-Oise).

SAMBUL

Médicament végétal, *sans colchique*

Composition :

A base d'un suc extrait des baies du *Sambucus Ebulus*.

Indications :

Goutte ; rhumatismes ; sciatique
névralgie ; lumbago, etc.

Posologie :

Une cuillerée à café matin et soir,
avant et à distance des repas. *N'est pas*
toxique ; pas de contre-indications. Trai-
tement à prolonger dans les cas chroni-
ques rebelles de prime abord. Cures
ininterrompues de 1 à 3 flacons.

Littérature et spécimens médicaux
sur demande

Société des Laboratoires du SAMBUL
EVREUX (Eure)

SANOFORMINE

Composition. — Borates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

Formes. — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

Prop. thérap. — Antiseptique, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, décongestionnant et analgésique.

Indications thérapeutiques et posologiques.

1^o Toilette intime : 1 à 2 comprimés p. lit.

2^o Métrites, leucorrhée, salpingites, etc.,
2 à 3 comprimés par litre.

3^o Désodorisant : 12 comprimés pour un bain de pieds quotidien. — 10 comprimés par litre en lavage (plis de l'aîne, creux de l'aisselle).

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo. — PARIS-XVI^e

SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène

Forme. — Capsules.

Compos. — Chaque capsule contient :

Essences balsamiques : 0 gr. 16

Bleu de Méthylène : 0 gr. 02

Dose. — 4 à 10 capsules par jour.

Action. — Antiseptique, Analgésique, Diurétique. Le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des Affections des Voies Urinaires.

Particularité. — Colore les urines en bleu.

Laboratoires MONAL & Cie

20, rue de Vienne — PARIS

SANTHÉOSE

A base d'une Diméthylxanthine irréprochablement pure, associée selon les cas au phosphate de soude, à la caféine ou au benzoate de lithine.

Formes. — Se présente en cachets en forme de cœur (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés :

1° *Santhéose pure* : Affections cardio-rénales, albuminurie ; 2° *Santhéose phosphatée* : Scléroses, convalescences ; 3° *Santhéose caféinée* : Asthénie, asystolie, infections ; 4° *Santhéose lithinée* : Artério-sclérose, rhumatisme, goutte.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour.

Prop. Thér. — Diurétique, hypotenseur, toni-cardiaque, antitoxique.

Indications. — Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

DÉPOT GÉNÉRAL :

4, Rue Roi-de-Sicile — PARIS (4°)

SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial
Spécifique des Prurits — Eczémas.
Psoriasis. — Lichens.

Sapocrème. — Crème de SAPOLAN. Adoucissante, antiprurigineuse.

Sapocade. — Sapolan et Huile de Cade. Psoriasis. Séborrhée, Sycosis.

Lait de Sapolan. — Erythèmes, gerçures.

Laits de Sapolan à : Soufre : Antiséborrhéique. Essence de Cèdre : Antisquameux.

Savon de Sapolan.

Poudre de Sapolan.

Sapo-barbe. — Savon au soufre et au Sapolan pour la barbe : acné, pyodermites.

Sapo-pâtes. — Pâtes de Lassar au Sapolan.

Laboratoire R. CAVAILLÈS

34, rue de Turin — PARIS (8^e)

SAVONS A. MOLLARD

SAVONS MOLLARD A TOUS MÉDICAMENTS

SAVONS SULFUREUX DE TOILETTE

A. MOLLARD

SAVONS FLUIDÉS MOLLARD

pour les soins du cuir chevelu
(cèdre, cade, sulfureux, panama)

LOTION A MOLLARD A LA PILOCARPINE

SAVON DENTIFRICE MOLLARD

POMMADE ALCALINO-SULFUREUSE MOLLARD

CRÈME SULFUREUSE DE SAVON MOLLARD

(affections squammeuses du cuir chevelu)

ÉMILE LANG & C^{ie}

2, Rue du Marché-des-Blancs-Manteaux

PARIS (IV^e)

SAVON PERUSOL

Composition. — Savon à base de benjoin et de baume du Pérou.

Propriétés thérapeutiques. — Neutre, antiseptique, balsamique, adoucissant.

En incorporant à ce savon de choix le baume du Pérou et le benjoin de Siam, on réalise avec des doses minimes une action thérapeutique efficace, parce que le savon les dépose sur la peau mise au net.

Indications. — Toilette quotidienne, soins hygiéniques de la peau et des muqueuses. Dermatoses superficielles (Rougeurs, acné, boutons, gerçures, dartres).

Lavage des régions avant et après application de pommades, crèmes, corps gras.

Toilette des enfants.

Forme. — Savon de toilette. Savon pour la barbe. Savon liquide : chirurgie, gynécologie.

Laboratoire E. VENDEL

61, Rue de Vaugirard — PARIS

SCILLARÈNE " SANDOZ "

Compos. — Glucoside cristallisé, principe actif isolé du Bulbe de la Scille.

Forme. — Comprimés à 0 gr. 0005 de substance active : solution à 1/2000, ampoules p. injections intramusculaires ou intraveineuses à 1 cc.

Indic. thérap. — Produit pur, cardiotonique et diurétique. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

Indications. — Spéciales : 1^o remplace la digitale quand elle n'agit pas ou n'agit plus ; 2^o Maintient la compensation ; 3^o Puissant diurétique dans les néphrites.

Posologie. — 1/2 à 3 ampoules par jour, 1 comprimé ou XV gouttes 3 à 4 fois par jour.

Echantil. et Littér. : PRODUITS SANDOZ
3 et 5, rue de Metz. — Paris (10^e)

Dépôt général et Vente :
USINE des PHARMACIENS de FRANCE
125, rue de Turenne. — Paris (3^e)

SCUROFORME

(Paraminobenzoate de Butyle normal)

Mêmes indications que les Orthoformes. Solubilité et, par suite, toxicité moindre. — Anesthésie très supérieure, Anesthésique local, insoluble, non toxique

- 1° Scuroforme en nature. — Pour être employé en pulvérisation, en insufflation, pour être associé aux pommades, lavements : Plaies douloureuses, Brûlures, Rectites, Colites, Affections oto-rhino-laryngologiques.
- 2° Poudre lactosée à 1/10°. — Pour être employée en pulvérisation et insufflation : Affections rhino-laryngologiques, Dysphagie.
- 3° Pastilles chocolatées à 0 gr. 002. — Pastilles " RHODIA " spécialement indiquées contre : Stomatites, Angines, Pharyngites, Enrouements des fumeurs et des oreillers. Toutes affections douloureuses relevant de la Stomatologie.
- 4° Comprimés carbonato-calciques à 0 gr. 65. — N'exercent aucune influence sur les phénomènes de la digestion. Douleurs gastriques. Ulcérations.

Laboratoire des Produits " USINES DU RHONE "

21, rue Jean Goujon — PARIS (8°)

SEDATINE CHRISTIAENS

Formule. — Dilodo Salicylate de sodium,
2 g. 10; Solution q. s. pour 100 cc.

En ampoules stérilisées de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Remplace la *Morphine* dans : Douleurs arthritiques, Sciatique, Lumbago, Névralgies cérébrale et intercostale, Vomissements incoercibles, Crises hépatiques.

Toxicité. — Nulle, peut être laissée dans toutes les mains.

Forme. — Boîte de 6 et boîtes de 12 ampoules.

A. CHRISTIAENS

2, rue du Champ-de-Mars — REIMS

SÉCACORNINE " ROCHE "

Compos. — Tous les principes actifs de l'ergot de seigle (*secale cornutum*) sous une forme soluble et injectable.

Action thérap. — Stable, d'action sûre, régulière et constante, c'est un vaso-constricteur puissant, donc un hémostatique interne énergique, décongestionnant, augmentant la tension artérielle et régularisant le pouls.

Indic. thérap. — a) *Action hémostatique.* Toutes les hémorragies internes, hémoptysies, hématomés, entérorragies, ménorragies, etc. — b) *Action toni-cardiaque.* Myocardites infectieuses. — c) *Action décongestive.* Congestion pulmonaire, états congestifs de l'encéphale, congestion éthylique, etc. — d) *Action vaso-constrictive.* Diarrhées, leucorrhée, lochies persistantes, sueurs des phthisiques, etc. — e) *Action sur les fibres musculaires lisses.* — a) *Utérus.* — Atonie utérine, avant, pendant, et après les accouchements et les avortements. — Troubles menstruels. — b) *Rectum et Vessie.* — Polypes du rectum (injection sous muqueuse). — Incontinence d'urine, spermatorrhée etc.

Doses et Mode d'emploi. — 1 centimètre cube ou 1 ampoule, ou 40 gouttes, ou 4 comprimés de Sécacornine "Roche" agissent comme 4 grammes de seigle ergoté.

Thérapeutique d'urgence. — 2 cc. ou 80 gouttes par voie buccale; ou 2 ampoules par voie hypodermique ou intramusculaire.

Doses moyennes. — 1/2 à 1 ampoule par jour, par voie hypodermique ou intramusculaire; 20 à 30 gouttes par jour, 1/2 à 1 cc. par jour, par voie buccale ou rectale; 2 à 4 comprimés par jour, par voie buccale.

Thérapeutique Locale. — 2 cc. ou 2 ampoules par jour, en injections intra-utérines (atonie utérine); 1 cc. ou 1 ampoule par jour, en injection sous-muqueuse (*loco dolenti*): Prolapsus du rectum.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e

21, Place des Vosges — PARIS (3^e)

SÉDATOSE

Tartrate borico-potassique
du Docteur André Gigon.

Composition. — Tartrate borico-potassique chimiquement pur.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — Épilepsie.

Mode d'emploi et doses. — Cuillère-mesure dosant 50 centigr. : 6 à 10 par jour ; traitement prolongé.

Flacon de 40 gr.

Laboratoire du Doct^r André GIGON

7, Rue Coq-Héron — PARIS (1^{re})

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques est devenu le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du médecin.

SÉDOBROL " ROCHE "

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré

Tablettes et Liquide :

1 tablette ou 1 mesure = 1 gr. Na Br.

Mode d'emploi et Doses :

Adultes : 1 à 5 tablettes ou mesures par jour.

Enfants : 1/2 à 2 tablettes ou mesures par jour, selon l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on verse une ou deux mesures de *Sédobrol " Roche "* liquide ou on fait dissoudre une ou deux tablettes ; on prépare ainsi instantanément un bouillon particulièrement savoureux que l'on peut prendre à n'importe quel moment de la journée.

Prop. Thér. :

Médecament sédatif, hypnotique et calmant donnant des résultats certains et permettant d'imposer un *traitement bromuré* intensif *dissimulé*, tout en rendant agréable le régime déchloruré.

Indic. Thér. :

Insomnies, névralgies, excitabilité, irritabilité, gastralgies, dyspepsies, palpitations, cardiopathies, migraines, spasmes, convulsions, échorée, névroses, épilepsie, etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

SÉDOGASTRINE

SEDATIF DES
DOULEURS GASTRIQUES

Composition. — 1° Substances neutralisantes très énergiques, notamment l'hydroxyde de magnésium et le carbonate de calcium. — 2° Substances modératrices de la sécrétion, telles que les phosphates de sodium et de calcium. — 3° Substances calmantes et antispasmodiques telles que le conium maculatum, à dose tout à fait inoffensive, mais suffisamment active.

Forme. — Granulé modérément sucré.

Indications. — Hypersécrétion, hyperacidité, dyspepsie douloureuse, spasmes douloureux du tube digestif.

Propriétés thérapeutiques. — La SEDOGASTRINE apporte une sédation sûre aux phénomènes douloureux gastro-intestinaux. Elle aide à la réparation des lésions de la muqueuse du tube digestif. Elle ne constipe pas. Elle n'est pas susceptible d'accoutumance et peut s'employer aussi longtemps qu'on le voudra.

Posologie. — Une cuillerée à café (contenant 2 gr. 40 de principe actif) délayée dans un peu d'eau, une heure après les repas. Renouveler au besoin cette dose trois heures après les repas pour prévenir les douleurs tardives.

LABORATOIRE P. ZIZINE

11, rue de Capri — PARIS XII^e

SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine

Mode d'emploi et dose. — 1° **Ampoules** 1 à 3 injections hypodermiques par 24 heures. 2° **Suppositoires** 1 à 3 "supposédols" par 24 heures.

Prop. Thér. — Plus actif et moins toxique que la morphine à dose égale.

Indications. — Phénomènes douloureux, Insomnies douloureuses, Cancers, Spasmes, Crises Tabétiques, Anesthésie chirurgicale, Accouchements, etc.

Etablissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres — PARIS

R. C. Seine 147.023

SEDOSINE

Sédatif du système nerveux

Action élective sur le système neuro-végétatif
Sommeil normal

Solution de :

Extrait fluide de passiflore..	8 grammes.
— — de cratoégus..	2 —
— de jusquiame.....	60 centigr.
Glycérine	40 grammes.
Sirop d'écorces d'oranges amères q. s. p.	100.

Posologia. — La **SÉDOSINE** se prend en nature, ou, mieux, dans un peu de tisane à raison de :

Dose moyenne : 3 cuillerées à café, réparties dans le courant de la journée.

Dose maximum : 5 cuillerées à café par jour.

Contre l'Insomnie : 3 cuillerées à café, prises en une seule fois, avant de se coucher.

LABORATOIRES LICARDY

38, Boulevard Bourdon — PARIS-NEUILLY

SÉDONEUROL DEHAUSSY

Composition. — Chaque comprimé contient :

Une médication de base, tartrate borico-potassique 0 gr. 33; phényléthylmalonylurée 0 gr. 025; sulfate neutre d'atropine, 1/2 dixième de milligr.

Des correctifs : Caféine 0 gr. 0125, pour les comprimés blancs; strychnine 0 gr. 0002, pour les comprimés roses; on administre alternativement pendant une semaine des comprimés blancs, puis des comprimés roses.

Avantages. — A effet thérapeutique égal, diminution des doses de gardénal dont l'effet dépressif est, d'autre part, combattu par les correctifs.

Indications. — Etats de nervosismes : *Insomnies rebelles, Etats d'anxiété*; Certaines algies : *Migraine, Angor. Pectoris*; Etats spasmodiques : *Asthme, Tétanie, Convulsions de la première enfance, Tics, Chorées, Parkinsonnisme.*

Epilepsie dans toutes ses formes. Le **SÉDONEUROL** constitue l'agent antiépileptique le plus puissant et le mieux toléré.

Posologie. — *Etats nerveux* : De 1 à 4 comprimés par jour (8 au maximum).

Epilepsie : Commencer par 4 comprimés par jour, en trois prises, et augmenter progressivement les doses jusqu'à un maximum de 12 comprimés. Ne jamais interrompre brusquement le traitement.

Pour les sujets qui passent du gardénal au Sédoneurol, donner, au début du traitement, la même dose de phényléthylmalonylurée sous forme de Sédoneurol, qu'ils prenaient sous forme de gardénal pur.

Enfants : 1 à 2 comprimés par jour au moment du repas.

LABORATOIRES DEHAUSSY,

44, Rue Inkermann, à LILLE

SEL DIGESTIF BE-ME-CÉ

Bicarbonate de Soude	4
Magnésie	1
Carbonate de chaux léger	2
lactosés et chimiquement purs.	
par c c.	

Forme :

Poudre.

Propriétés :

Spécifique de l'*Hyperacidose*.

Posologie :

1 cuillerée à café après chaque repas.

Laboratoire ODINOT

21, rue Violet, 21 — PARIS

SEL DE HUNT

Alcalin type

Régulateur Normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

Forme. — Granulé friable.

Posologie. — Une à une cuillerée et demie à café dans un 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 6 fr. 50 le flacon

Laboratoire Alph. BRUNOT

16, rue Boulainvilliers — PARIS

(Téléphone : Autcuil 20-21)

SELENIOL

(Procédé André LANCIEN)

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cm³ (4 par boîte).

Action thérapeutique. — Le sélénol est une solution limpide de couleur brune; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

Indications. — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections cancéreuses, soit seul, soit associé à la Cytuline.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX
18, Avenue Hoche — PARIS

SEOTRAL LEYSIN

Éliminateur extra-rapide de l'acide urique et de ses composés.

Présentation. — Liquide.

Indications. — Crises de goutte aiguë. Rhumatismes musculaires et articulaires aigus.

Propriétés. — Élimine en quelques heures par la salive, la transpiration et les urines des quantités considérables d'acide urique. Arrête les crises de goutte aiguë en quelques heures.

Fosologia. — Se prend à jeun à raison d'une cuillerée à café toutes les trois heures dans de la tisane non sucrée faite avec la poudre jointe au flacon. Rester au lit pour favoriser la transpiration. Pour plus de détails, consulter le mode d'emploi.

Prix : 33 fr. 60 — Au Corps Médical : 25 fr. 60

Les Laboratoires LEYSIN
1 bis, rue Molitor — PARIS (16*)
Téléphone : Auteuil 14-73

SEPTICEMINE CORTIAL

Composition. — Di-urotropine iodobenzométhylée, cristallisée, dialysable, injectable, atoxique, indolore. Aucune réaction locale ou générale.

Propriétés. — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien. Chute de la température régulière, complète, définitive. Microbicide et antitoxique ; éliminateur hépatique et rénal.

Indications. — Infections Aiguës médicales : Grippe, encéphalite, bronchopneumonie, fièvres typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhinopharyngées.

Infections chirurgicales : Septicémies, pyohémies, fièvre puerpérale, Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites, Péritonites tuberculeuses.

Forme. — Ampoules de 4 cc.

Dose. — Septicémies à marche rapide : 2 à 4 amp. dans les 24 h. Septicémies à marche lente : 1 à 2 ampoules dans les 24 heures.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations. Pure ou étendue d'eau. Uro-gynécologie, Plaies purulentes, Tumeurs ouvertes, Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

Nombreuses communications scientifiques

LABORATOIRES CORTIAL

10, rue Béranger. — PARIS

SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE

de HECKEL

Composition. — Le Sérum de Heckel a pour base un extrait organique complet polyvalent, où la surrénine est stabilisée dans un liquide isotonique spécial.

Mode d'emploi. — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule. On pourra renouveler l'injection 4 à 5 fois par 24 heures.

Action. — L'excitation du pneumo-gastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumo-gastrique et le spasme cesse.

Indications. — Le Sérum de Heckel est indiqué dans toutes les formes d'Asthme, au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, et chez les cardiaques en imminence d'asystolie.

Présentation. — Sérum de Heckel pour adultes, 12 ampoules de 3 centièmes.

Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centièmes.

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes - PARIS - Tél. : Wagram 37-64

SÉRUM FERRUGINEUX

FRAISSE

Composition :

Glycérophos. de Soud : : 0 gr. 10
Cacodylate de Fer : 0 gr. 01 ; Caco-
dylate de Strychnine : $\frac{1}{2}$ milligr.,
pour 1 cm³ d'eau distillée.

Indications :

Dynamogénique puissant : spéci-
fique des anémies et de la chlorose.

Formes :

1° En ampoules, boîte de 12 am-
poules : 10 francs (impôt compris).

2° En gouttes, prix du flacon :
8 fr. 95 (impôt compris).

Laboratoires FRAISSE
8. Rue Jasmin, 8 — PARIS

SERUM HYPOTENSIF FRAISSE

Composition :

Extrait de Gui : 0 gr. 05.

Nitrite de Soude : 0 gr. 01.

Indications :

Contre l'hypertension artérielle,
l'Artério-sclérose.

Formes :

1° En ampoules, boîte de 12 ampoules : 10 francs (impôt compris);

2° En gouttes, prix du flacon : 8 fr. 95 (impôt compris).

Laboratoires FRAISSE
8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

SERUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

Composition :

Glycérophosphate de Soude :
0 gr. 10 : Cacodylate de Strychnine
 $\frac{1}{2}$ milligr., pour un cm³ d'eau distillée.

Indications :

Dynamogénique puissant. Active
la phagocytose. S'emploie dans l'adynamie et la neurasthénie.

Formes :

1° En ampoules, boîte de 12 ampoules : 10 francs (impôt compris).

2° En gouttes, prix du flacon : 8 fr. 95 (impôt compris).

Laboratoires FRAISSE
8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

SILICYL

Médication de base et de régime des *états artérioscléreux*, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la lésion initiale et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

Principe. — L'adrénaline ne produit plus de lésion athéromateuse chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude. (Professeur Gouget, *P. M.*, 1911.) — L'injection intra-veineuse inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffler et Pélissier, *Acad. Sciences*, Août 1920.)

Composition. — Silicates de formule $\text{Si}^2 \text{O}^{12} \text{Na}^8$ et K^8 , stables, solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

Emploi et doses. — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante, par périodes de 20 jours par mois.

COMPRIMÉS : Titrés à 0,50 de sel de soude et de potasse, 1 à 2 compr. au repas, 3 fois par jour.

AMPOULES : Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures. (Action rapide : préscléreux, engor.)

Résultats. — Abaissement de la tension Mm et Ma . Viscosité ramenée à la normale. Hypotension. Elimination chlorurée. Diurèse. Action antiathéromateuse. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

Indications. — Présclérose. Artériosclérose. Hypertension. Aortite. Athérome aortique. Sclérose rénale. Angine de poitrine. Endarterite oblitérante progressive. Prophylaxie de l'athérome et de l'hémorragie cérébrale. Troubles cérébraux. Migraines. Vertiges. Paresse intellectuelle. Bourdonnements, etc. Otite scléreuse. Sclérose auriculaire. Troubles oculaires. Presbytie. Fatigue et Sclérose cardiaque. Calcification. Anémie siliceuse.

Echantillons — Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**
7, Rue du Rocher — PARIS

Laboratoires CAMUSET, ABLON (Seine-et-Oise).

SILISODE

Forme. — Granulé.

Comp. — Une cuillerée à café de granulé contient :

Silicate de soude 0,40

Benzoate de lithine 0,10

Dose. — Une cuillerée à café avant les repas.

Action. — Hypotensive, déchlorurante.

Indications. — Maladies de la cinquantaine, Hypertension, Artério-Sclérose.

MICHEL S,

Pharmacien de 1^{re} Classe.

9, Rue Castex — PARIS

SINAHIN

Antidiabétique

Forme. — Pilules de Semen-contratotal.

Propriétés :

Traitement sans restrictions dans l'alimentation normale.

Formule extraite des travaux d'Avienne (Communication Académie de Médecine, décembre 1913.)

Posologie :

Trois à quinze pilules par jour.

Laboratoires CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

SIROP DE BLANCARD

A l'iodure de fer inaltérable
10 cgr. par cuillerée à soupe.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Propriétés. — Agent incomparable d'Hématopoïèse.

Indications. — Anémie, Scrofules, Lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles ou constitutionnelles, suite de Gripes infectieuses, etc.

BERTAUT-BLANCARD Frères,
64, Rue de La Rochefoucauld — PARIS

SIROP COMPOSÉ AUX HYPOPHOSPHITES DE FELLOWS

Le réminéralisateur par excellence
Compos. — Potasse, chaux, fer, manganèse, sodium, quinine, strychnine.

Indicat. — Anémie, neurasthénie, maladies chroniques, affections pulmonaires, rachitisme, convalescence.

Doses et mode d'emp. — Adultes : tonique, 1 cuillerée à café à chaque repas ; stimulant et tonique, 2 cuillerées à café aux repas. — Pour les enfants : De 9 à 12 ans, une demi cuillerée à café ; 5 à 9 ans, un tiers de cuillerée à café ; 1 à 5 ans, un quart.

Nota. — Pour obtenir les meilleurs résultats, avoir soin de toujours diluer le sirop dans de l'eau froide, dans la proportion d'un demi-verre d'eau pour une cuillerée à café de sirop.

Laboratoire ROBERTS et Co
5, rue de la Paix, PARIS

SIROP DU D^r GELINEAU

Composition :

Arsenic-Chloral-Bromuré.

Indications thérapeutiques :

Insomnie, Névralgie, Hystérie

Posologie :

Une à deux cuillerées à bouche
le soir au coucher.

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoire J. MOUSNIER

à SCEAUX (Seine) près PARIS

SIROP GRIBELL

Composition. — Baume du Canada, « *Prunus virginianus* », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble, Baume de Tolu.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi :

Adultes : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour,
pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

PÂTE GRIBELL

Même composition — Mêmes indications

SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé

Mode d'emploi : Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerées à dessert, suivant l'âge.

Laboratoires BELIERES

19, Rue Drouot — PARIS

SIROP LANCHAT

Composition. — Alc. f. Aconit (VIII gttes -|- bromoforme I goutte).

Héroïne, 0 g. 002; Iodophosphate de codéïne, 0 g. 015; Thiocol, 0 g. 20 p. cuill. à soupe.

Suppression des formalités inhérentes aux prescriptions de toxiques.

Indications thérapeutiques. — Dans toutes les *Affections des voies respiratoires*, toux rebelle à forme quinteuse, émétisante ou catarrhale, asthme, emphysème, grippe, tuberculose....

Posologie. — 6-12 ans, 3 cuill. café p. jour; 12-15, 3 cuill. dessert p. jour; adultes 3-5 cuill. soupe p. jour. Éviter son usage chez les tout petits enfants.

Entre les repas pur, ou dans tisane, grog, ou lait tiède.

Littérature et échantillons

Laboratoires COMTOS

F. CHANAL, pharmacien de 1^{re} classe
FESCHES LE CHATEL (Doubs)

SIROP DE LA MATERNITÉ

Ext. de fl. pêcher 25 gr., Manne en larmes 20 gr.

Alcool 60 gr., Alc. de mandarine 5 gr.

Sirop q. s. pour 1 litre.

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

Propriétés thérap. — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

Indications. — Constipation, Embarras gastrique. Pas de contre-indications.

Laboratoire L. LAURIN

86, Boulevard Port-Royal — PARIS

SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER

Au Monosulfure de Sodium inaltérable et Goudron

Approbation scientifique
de l'Académie de Médecine de Paris

Indicat. therap. — Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, Laryngites, Lymphatisme, Dermatoses, Hydrargyrisme, Bismuthisme.

Posclogie. — *Adultes* : Une cuillerée à soupe de Sirop, 2 à 3 fois par jour, une heure avant ou 2 heures après les repas.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert pour les enfants de 7 à 14 ans ; 2 à 3 cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

LABORATOIRES CROSNIER,
6, *Rue Chanoinesse* — PARIS

SIROP PHÉNIQUÉ VIAL

Composition. — Sirop à base d'acide phénique, principe actif des goudrons.

Indications. — Trachéite, Laryngite, Bronchite aiguë et chronique, Asthme, Grippe, Coqueluche, Tuberculose pulmonaire, Hémoptysie, Bronchite fétide, Gangrène pulmonaire, toutes les Hémorragies, Diarrhées chroniques.

Action. — Antiseptique et désodorisant puissant ; augmente la coagulabilité du sang, diminue les sécrétions.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à soupe par jour, pur ou dans une tasse de tisane quelconque.

LABORATOIRES DU D^r CHAPELLE,
8, *Rue Vivienne* — PARIS

SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

1° Calme l'irritation et tarit le catarrhe des **muqueuses bronchiques**, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, iolu, acénil, benzoate de soude).

2° Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir, le **spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique**, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthylé, qui calme ces fibres aussi puissamment que la papavérine, sans en avoir la toxicité.

Dose pour les adultes. — 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Doses pour les enfants. — 2 ans : une cuillerée à café matin et soir ; 5 ans : 3 à 4 cuillerées à café par jour ; à 10 ans : 5 à 6 cuillerées à café.

Ed. DEHAUSSY

Docteur en Pharmacie, Licencié-ès-Sciences

44, Rue d'Inkermann — LILLE

SIROP " ROCHE "

AU THIOCOL

1 cuill. à soupe de Sirop " Roche " = 1 gr. de Thiocol " Roche ".

1 gr. de Thiocol " Roche " = 0,52 cgr. de gaiacol cristallisé.

Doses et Mode d'emploi. — Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour ; Enfants : 2 à 4 cuill. à café selon l'âge.

Prop. Thér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique, Orexiqne.

Indic. Thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsie, Entérites, Diarrhées, etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, Place des Vosges — PARIS

SIROP TEYSSÈDRE

au Bromure de Calcium pur
Médecine du nourrisson

Indications thérapeutiques :

Colique des nouveau-nés, Insomnies, Cris et pleurs prolongés, Crispations nerveuses, Vomissements, Diarrhée, Prurit dentaire, Accident de la première dentition, Affections convulsives, etc.

Emile TEYSSÈDRE Fils Aîné

Docteur en Médec. — Pharmac. de 1^{re} cl.

34, Faub. d'Angoulême — LIMOGES

R. C. Limoges 2549

SISTOMENSINE CIBA

Substance lipodique extraite de l'ovaire, appartenant à la classe des chalcones et harmozones, insoluble dans l'eau.

Action physiologique. — Equilibre la fonction menstruelle. limite et régularise le flux cataménial. Agit efficacement sur douleurs dysménorhétiques.

Indications.

I. — Flux menstruel trop abondant, ménorrhagie essentielle des jeunes filles.

II. — Règles trop fréquentes.

III. — Règles de trop longue durée.

IV. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.

Comprimés, Ampoules.

Doses. — 3 à 6 comprimés par 24 heures ; 1 ou 2 ampoules.

Le flacon de 40 comprimés : 10 francs.

La boîte de 4 ampoules : 12 francs.

(Voir Agomensine)

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1. Place Morand — LYON

SODERSEÏNE

Indication.

Coqueluche.

Composition.

Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

Forme.

Solution sans saveur et d'une innocuité absolue. (Ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

Doses journalières.

Enfants jusqu'à 6 mois..... 100 gr.

— de 6 mois à 2 ans 150 »

— de 2 ans et au-des. 200 »

(Echelle de doses sur le flacon)

J. DEPRUNEAUX, Pharmacien de 1^{re} Classe
18, Rue de Beaune & 31, Rue de Verneuil
— PARIS (VII^e) —

SOLUBAÏNE

Solution au millième d'Ouabaïne Arnaud
Cardio-tonique énergique, diurétique puissant

Indications. — Insuffisance du ventricule gauche: des aortiques, des cardio-rénaux, des hypertendus, avec ou sans artério-sclérose. — Insuffisance du ventricule droit: lésions mitrales ou tricuspidiennes, péricardites et symphyses du péricarde, emphysème, asthme, myocardites d'origine infectieuse.

Doses. — Petites doses d'entretien prolongées: XX gouttes par 24 heures. Doses moyennes: XXX à L gouttes par 24 heures, Doses massives: L à CL gouttes par 24 heures.

Fractionner les doses en 3-4 fois dans la journée.
La Solubaïne permet d'administrer l'Ouabaïne Arnaud par voie buccale; elle est aussi maniable que la solution de Digitaline Nativelle.

Echantillon et Littérature

LABORATOIRE NATIVELLE

49, Boulevard du Port-Royal, 49 — PARIS

SODOTHIOL

Composition. — Solution stérilisée pure, isotonique, injectable de thiosulfates alcalins.

Forme pharmaceutique. — Ampoules de 2 centimètres préparées pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

Indications thérapeutiques majeures. — *Affections hépatiques* : Coliques hépatiques, Lithiase biliaire, Angiocholite lithiasique, Cholécystite calculuse, Cholérine simple, Ictère catarrhal ou émotif, Hépatisme de Roger Glénard.

Manifestations arthritiques : Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Gravelle, Aurie calculuse, Calculs vésicaux, Rhumatisme noueux déformant, chronique, Ankyloses fibreuses articulaires, Otosclérose, Otospongiose.

Indications thérapeutiques secondaires. — *Dermatologie* : Eczémas, Acnés, Accidents cutanés, récidivants ou prurigineux.

Etats congestifs chroniques des Muqueuses respiratoires.

Mode d'emploi. — *A Cure d'Assaut* : 10 injections, une tous les jours.

B Cure de fixation : 10 autres injections deux mois plus tard.

C Cure d'Entretien : 10 injections six mois, puis un an après la première série.

Dans les cas de Rhumatismes chroniques, noueux ou déformants, et quelques affections cutanées récidivantes, la Cure d'Assaut pourra, après 15 jours seulement de repos, être suivie d'une Cure de Complément A bis.

Le SODOTHIOL étant dépourvu de toute toxicité, son usage pourrait, s'il en était besoin, être prolongé pendant tout le temps jugé nécessaire.

Incompatibilité - Acides - Sels acides - Iodures

La boîte de 10 Ampoules : 20 fr., taxe en sus

*Echantillons et littérature médicale
sur demande*

**LABORATOIRE DE MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, Rue Malherbe — BEAUVAIS (Oise)

SOLUPROTINE ROCHE

Solution à 10 % de Protéine Solubilisée

(PEPTONE de CASÉINE " ROCHE ")

de composition constante, stérilisable et inaltérable.

Indications. — *Toutes les indications de la Protéinothérapie : Rhumatismes, Infections, Septicémies, Gonocoécies, Salpingites, Kératites, Sycosis, Furonculose, Tuberculose, et, en général, toutes les fois que l'on cherche à déclencher ou à stimuler les réactions défensives de l'organisme.*

Doses et mode d'emploi. — *Injectons intramusculaires.* — États aigus : doses croissantes de 1/4, 1/2, puis 1 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours

États subaigus et chroniques : doses croissantes de 1/2, 1, puis 2 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

Injectons endoveineuses. — États aigus ou subaigus : diluer 1/4 ou 1/2 cc. dans 10 cc. de solution physiologique pour chaque injection et faire l'injection tous les 3 ou 4 jours.

N. B. — *Les injections intramusculaires et endoveineuses sont parfaitement indolores ; elles donnent lieu quelquefois à des réactions assez violentes, dont l'intensité varie avec chaque malade (choc protéique). Il peut y avoir des sueurs, de la fièvre, des frissons, etc. qui sont l'indice de la réaction défensive de l'organisme.*

Boîte de 12 Ampoules de 1 cc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS (III^e)

SOLUTION BARDET

à l'Extrait sec de Quinquina

Adoptée par le Ministère des Colonies

Médaille d'Or, Strasbourg 1924

Composition. — Solution sans sucre, ni alcool, contenant 0 gr. 50 de principes actifs par cuillère à soupe et titrant au minimum 10 % d'alcaloïdes totaux.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique et reconstituant énergique contre l'Anémie, la Chlorose, le Lymphatisme et dans toutes les Convalescences.

Fébrifuge puissant à forte dose contre les Fièvres intermittentes, le Paludisme et toutes Maladies fébriles.

Mode d'emploi. — Comme *Tonique et Reconstituant* : ADULTES, une cuillère à soupe.

ENFANTS : Une cuillère à café au début des deux principaux repas.

Comme *Fébrifuge* : 4 à 5 cuillères à soupe dans les 24 heures.

Se méfier des nombreuses contrefaçons et imitations.

Formuler : « **SOLUTION BARDET** »

Prix : 15 francs

Echantillons et Littérature :

PHARMACIE BARDET

FONDÉE EN 1860

76, Rue de Sèvres — PARIS (VII^e)

SOLUTION LAROYENNE

Composition :

Succinate d'ammoniaque, Valériate d'éthyle et Bromure de potassium.

Indications :

Spécifique contre toutes les formes de l'agitation nerveuse.

Posologie :

Une cuillerée à café, dans un peu d'eau, avant chacun des trois repas.

Laboratoire DUREL

7, Boulevard Denain — PARIS

SOLUTION PAUTAUBERGE

Composition. — Créosote, 0 gr. 10 ; chlorhydro-phosphate de chaux, 0 gr. 50 : par cuillerée à soupe.

Action. — Absorbée par l'appareil digestif, éliminée par les poumons, la créosote combat les deux foyers de la Tuberculose et des Infections à flores associées.

Le chlorhydro-phosphate de chaux re-calcifiant et reconstituant.

Indications. — Affections pulmonaires, Convalescence de pleurésie, Broncho-pneumonie, Grippe, Rougeole, Coqueluche, Scrofule.

Dose. — 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

L. PAUTAUBERGE,

10, Rue de Constantinople — PARIS (VIII^e)

SOMNIFÈNE " ROCHE "

Dialecyl-barbiturates de diéthylamine.

Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Claude, Crouzon, Laignel-Levastine, Weiss, Etienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloetta, Gelma, Combemale, Fredet, Cleisz, Gayet, S. Banus et des Dr Perlis, Vullien, Assoignion, Kindler, Boisière, Jourdan, Journiac, de Teyssieu, Hamant, Bénéch, Redonnet, G. et D. Bardet etc., etc.

Indic. thérap. — Toutes les insomnies simples ou compliquées, Agitation, Délire, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles nerveux, Epilepsie, Tétanos, etc.

SOMNIFÈNE " ROCHE " Gouttes

XXX gouttes = 1 cc.

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spéciale du produit, ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de donner à chacun sa dose, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

Doses habituelles. — XXX à XLV et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane, 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.

Enfants : V à X et XV gouttes (selon l'âge).

SOMNIFÈNE " ROCHE " Ampoules

Ampoules de 2 cc.

pour injections intra-musculaires

1 à 3 ampoules (Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux, etc.

Ampoules de 5 cc.

pour injections endoveineuses

Anesthésie Obstétricale et Chirurgicale.

Cas graves de psychiatrie.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie

21, Place des Vosges — PARIS

SONÉRYL

-Hypnotique — Antalgique

Nouvel hypnotique de la série barbiturique; l'étude pharmacologique et chimique en a été faite par MM. les Professeurs P. Carnot et Tiffeneau.

Hypnotique et antalgique, le *Soneryl* convient au traitement des insomnies douloureuses.

Délivré sous forme de comprimés dosés à 10 mgr et en ampoules de 2 cc. — dosées à 0 gr. 05 par cc. pour injections sous-cutanées.

Dose moyenne pour adultes : 1 à 4 comprimés ou 1 à 2 ampoules par 24 heures.

Littérature franco sur demande

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (3e)

R. C. Paris 5686

SORNYL

(Anciennement Sornaldéhyde)

Composition supérieure au Benzoate de Benzyle, contenant les dérivés benzylsiques en association médicamenteuse.

Deux présentations : 1° *Gouttes*; 2° *Comprimés*.

Gouttes. — Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse.

Asthme vrai (ou essentiel). Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche, Hypertension.

Posologie. — 5 à 40 gouttes 4 à 5 fois par jour.

Comprimés : Spécifique de la DYSMENORRHEE.

Posologie. — 2 comprimés à un quart d'heure d'intervalle, 6 à 10 par jour.

Demander renseignements et littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut

22, Rue de la Sorbonne — PARIS (V°)

SOUS-AZOTATE de BISMUTH TULASNE

Propriétés thérapeutiques. — Préparé par A. TULASNE, chef de Laboratoire à l'Hôpital de la Pitié, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Grâce à sa pureté et à sa faible teneur en acide azotique, peut être employé, sans crainte, aux plus hautes doses.

Indications. — Le produit le plus actif pour réaliser le pansement gastrique.

Forme. — Le SOUS-AZOTATE DE BISMUTH TULASNE est délivré en boîtes de 10 paquets rigoureusement dosés, de 20 gr., 16 gr., 10 gr., 8 gr., ou 6 gr.

LABORATOIRES BAUDRY

68, boulevard Malesherbes — PARIS

SPASMALGINE " ROCHE "

Antispasmodique vrai

Composition. — 1 ampoule ou 1 comprimé contient :

- A - Un centigramme PANTOPON " ROCHE " (Opium total injectable).
 B - Deux centigrammes PAPAVERINE " ROCHE " (Alcaloïde de l'opium le moins toxique, à propriétés spasmolytiques spéciales).
 C - Un milligramme ATRINAL " ROCHE " (Eiher sulf-atropine, sans action sur le centre parasympathique).

Propriétés. — Les propriétés antagonistes des éléments entrant dans la composition de la Spasmalgine " Roche " expliquent la toxicité atténuée de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

Indic. thérap. — Tous les états spasmodiques, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation ante et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyperexcitation, etc.

Dose et mode d'emploi :

- | | | |
|--|---|---|
| Voie buccale... | { | Dose moyenne : 1 à 2 compr. par jour. |
| | | Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour. |
| Voie hypodermique
ou
intramusculaire | { | Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. |
| | | Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour. |

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}
 21, Place des Vosges — PARIS

SPASMINE JOLLY

Sédatif de choix du système nerveux.

Combinaison physiologique stabilisée de
Valériane fraîche et Aubépine.

Odeur et saveur agréables.

Forme. — Elixir dosé à 0 gr. 10 par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 6 cuillerées à café par 24 heures; 1/2 dose pour les enfants.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, hypnotique et hypotenseur.

Indications. — Névropathies et Cardiopathies.

Echantillons et Notices sur demande

LABORATOIRE L. JOLLY,

1, Rue Christine — PARIS (VI^e)

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies

COMPOSITION :

Sérum frais hémopoïétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine par saignées préalables, contenant les hémopoïétines spécifiques du Professeur Carnot (Ac. des Sc., 1906). Ce sérum n'est pas inactivé par tyndallisation, ses substances minimales sont intactes.

ACTION :

1° Agent d'Hémopoïèse (Hémopoïétines de Carnot) ;

2° Agent de Leucopoïèse et de phagocytose (opsonines) ;

3° Action tonique générale de sérum de cheval ;

4° Agent d'Hémostase générale (Traitement prophylactique des interventions sanglantes).

INDICATIONS :

Toutes anémies, hémophilie, Etats hémorragiques, convalescences, déficiences organiques, tuberculose, infections, et toxoinfections, cure pré-opératoire dans les interventions chirurgicales sanglantes.

Pas d'accidents sérieux ou infectieux.

MODE D'EMPLOI, POSOLOGIE :

Sirop agréable à prendre.

Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude).

Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

Littérature — Echantillon :

LANCOSME

71, Av. Victor-Emmanuel-III-PARIS (8^e)

STANION

Description. — Etain colloïdal en capsules et en ampoules.

Capsules : contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage de kératine (50 capsules par flac.).

Ampoules : contiennent 3 cm³ de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons, et les récidives sont évitées.

Indications. — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

Capsules : 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculites, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

STANNOXYL

Oxyde d'étain et étain métallique
absolument purs

Indications. — Furonculose et toutes affections à staphylocoque : acné, anthrax, abcès du sein chez les nourrices, etc.

Formes. — Pour l'usage interne : comprimés, cachets, ampoules. — Pour l'usage externe : liquide, pommade.

Avantages. — Traitement pratique, rapide et définitif : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les douleurs et arrête l'évolution de la maladie.

Laboratoires ROBERT & CARRIERE

37, Rue de Bourgogne — PARIS

Téléph.: Ségur 29-49 ; Fleurus 13-09

R. C. 176.249 Seine

STAPHYLASE

du Docteur DOYEN

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

Indications. — Aené, Furonculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

Doses. — Adultes : 4 à 12 cuill. à potage par jour; Enfants : 1 à 4 cuill. à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

P. LEBEAULT & C^{ie}

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (3^e)

STAPHYLOCIDE AUDRAS

Tablettes sucrées parfumées à la menthe, dosées à 0 g. 25 d'Étain-Oxyde d'étain plus purs et plus solubles que les produits commerciaux, parce que "Étain d'électrolyse".

— Croquer 2 à 4 tablettes par jour, aux repas de préférence.

— Contre furonculose, acné, orgelets, phlegmon, abcès divers et toutes infections staphylococciques.

Enfants et adultes : pas de contre indication.

NOTA. — Préparation particulièrement pratique, absorbable, efficace, à cause de sa forme de tablettes, nécessitant une longue trituration et division des principes actifs avec le sucre, et leur assurant en outre une fine émulsion par la salive. L'étain arrive ainsi à l'estomac dans l'état idéal pour une absorption rapide et totale.

La boîte (10 à 20 jours) : 6 fr. toutes pharmacies.

Demandez échantillon à :

Laboratoire du STAPHYLOCIDE AUDRAS
à YSSINGEAUX (Hte-Loire).

STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte et à doses moindres. Agent de la phagocytose, la Staphylo-coccine s'emploie en solution, comprimés et ampoules contre la furonculose, l'angine, les maladies infectieuses, les dermatoses, etc.

Laboratoire des PRODUITS SCIENTIA
21, rue Chaptal
PARIS

STENERGINE

Cacodylate de Manganèse
Nucléinate de Manganèse.

Reconstituant général

Producteur d'énergie

Formes. — Cachets, Comprimés, Ampoules.

Indications. Anémie, Chlorose, Neurasthénie, Convalescence des maladies aiguës, Adynamie, Lymphatisme, Dépression des arthritiques.

Mode d'emploi et doses. — La dose moyenne est de deux cachets ou comprimés par jour, mais dans les cas où l'on recherche une action stimulante et rapide, on devra la porter à trois. Une ampoule chaque jour.

Les cachets ou comprimés peuvent être pris à toute heure, mais de préférence au début des repas. Pour les enfants, un ou deux suffisent.

Laboratoires " STÉNÉ "

Anciens Etablissements BEAUGONIN
4, place des Vosges — PARIS

STÉRAMINE

Pâte antiseptique soluble

Compos. — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 % de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

Indications. — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux....

Mode d'emploi. — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

Avantages. — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Le tube de Stéramine : 4 francs.

Echantillons médicaux sur demande.

Laboratoire des ANTISEPTIQUES CHLORÉS
40, rue Thiers — LE HAVRE

STIBYAL

ou Emétique de Bismuth

Tartrate d'antimoine et de sodium

Les indications du Stibyal sont, d'une part la Bilharziose, d'autre part les Leishmanioses dans leurs diverses manifestations.

Nous délivrons le Stibyal sous la forme de solution à 2, 3 et 6 %; cette solution est faite au moyen d'un sel chimiquement pur, préparé spécialement pour la médication intra-veineuse en ampoules de 2 cm³.

Littérature franco sur demande

Les Etablissements POULENC Frères
86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (3^e)

R. C. Paris 5386

STOMOPHILE

RÉGULATEUR ÉNERGIQUE DES FONCTIONS STOMACALES

(Alcalin — Antiferment.)

Forme. — Paquets (de saturation).

Composition. — Alcalins (sodium, calcium, magnésium). — Bismuth (professeur Hayem).

Indications. — Dyspepsie. Gastralgie. Gastrites aiguë et chronique. Hyperchlorhydrie. Hypersthénie. Pyrosis. Ulcère.

(Supprime, dans de nombreux cas, l'atonie intestinale.)

Posologie. — Un paquet, délayé dans un peu d'eau, à la fin ou une heure après les principaux repas.

Dans les crises aiguës, prendre supplémentairement 1 ou 2 paquets dans le courant de la journée.

INNOCUITÉ ABSOLUE

Littérature et Echantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Laboratoires DORANTOWICZ

17, Avenue Parmentier. — PARIS

STOVAÏNE

Chlorhydrate

de Diméthylaminobenzoylpentanol

Produit synthétique. Le moins toxique des anesthésiques locaux, à pouvoir égal; aucune action vaso-constrictive; agit comme tonique du cœur et comme antiseptique.

L'action de la Stovaïne est au moins égale à celle de la cocaïne, mais son absence de toxicité permet d'en utiliser des doses beaucoup plus considérables. La Stovaïnomanie n'existe pas.

En dehors des emplois chirurgicaux (rachianesthésie, anesthésie locale et régionale) la stovaïne se prescrit dans toutes les affections internes et externes où il s'agit de combattre la douleur, le prurit ou l'irritation.

Littérature sur demande.

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

STOVARSOL

Acide Oxyacétylaminophénylarsinique

Le *Stovarsol* se distingue par sa forte teneur en arsenic et sa faible toxicité. Étudié à l'Institut Pasteur de Paris par MM. Fourneau et Levaditti, et à l'Hôpital Cochin par M. le Docteur Fournier, ce produit a fait l'objet de nombreuses publications. C'est le premier exemple d'un médicament d'ordre chimique, administré par la bouche dans l'intention de prévenir une maladie infectieuse.

Indications. — Traitement précoce et traitement d'entretien de la syphilis. Spirochétoses, Pian, Amibiase, Lambliose, Diarrhées, Prétuberculose, Pyorrhée alvéolaire.

Doses : 1 à 4 comprimés dosés à 0 gr. 25, par 24 heures.

Le *Stovarsol sodique*, soluble et injectable par la voie intraveineuse a donné de bons résultats dans la paralysie générale et dans le Paludisme.

Des comprimés dosés à 0 gr. 01 ont été étudiés en vue de la thérapeutique infantile.

Littérature franco sur demande

Les Etablissements POULENC Frères
86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (3^e)

R. C. Paris 5386

STROPHANTUS CATILLON

(Prix de l'Académie de Médecine)

Forme. — Granules de Catillon à 0,001 d'Extrait titré de Strophantus.

Indications. — Asystolie, Oppression, Dyspnée, Œdèmes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique*. En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Si l'on ne veut pas d'effet diurétique, mais seulement *tonique*, on prescrit les

GRANULES DE CATILLON

à 0,0001 de **Strophantine** cristallisée

3, Boulevard Saint-Martin — PARIS

STRYCHNAL LONGUET

Toutes indications de la strychnine.

Affections médullaires et névritiques. —

Asthénie. — Neurasthénie. — Tubercu-

culose. — Maladies infectieuses. —

Convalescence. — Anémie.

Dérivé synthétique de la strychnine, dont la toxicité est dix fois moindre.

Doses. — Par jour :

2 à 4 granules de 0 gr. 01 cigr. de Strychnal.

1 à 2 ampoules de 0 gr. 01 cigr. de Strychnal par c².

Laboratoires P. LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (11^e)

STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable

Nucléophosphate de soude pur et
méthylarsinate de strychnine

Ampoules injectables de 2 c.c.

Dose et mode d'emploi :

Une injection Hypodermique de 1 c. c.
par 24 heures pouvant être portée
à 2 c. c. en une seule injection
dans les cas graves.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

SULFARSINOL LEFÈVRE

Composition.— Combinaison organique de nature grasse, renfermant du soufre, de l'iode et de l'arsenic associés à de l'acide cinnamique.

Facilement saponifiable dans l'intestin en donnant du soufre et de l'iodure d'arsenic à l'état colloïdaux en même temps qu'un cinnamate alcalin.

Se trouve en capsules gélatineuses correspondant à la formule: acide cinnamique: 0,02; iodure d'arsenic: 0,003; sulfoléine à 35%; de soufre: 0 gr. 30.

Propriétés therap.— Celles du soufre colloïdal et de l'iodure d'arsenic associés à un balsamique, l'acide cinnamique. - Affections cutanées - rhumatismes - bronchites - emphysème, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 6 capsules par jour, avant le repas.

Laboratoire du Dr C. LEFÈVRE

52, rue Decamps - PARIS (10^e)

SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal

Granulé — Ampoules — Pommades

Doses et Modes d'emploi. — *Granulé* : 2 cuillers-mesure 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 centig. de soufre colloïdal.

Injectable : 1 inj. par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires 1 inj. tous les 2 ou 3 jours.

Indications. — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques, Bronchites chroniques, Antisepsie de l'intestin, Rhumatismes aigus et chroniques, Arthritismes, Syphilis.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

SULFURION

Description. — Complexé colloïdal électrique isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

Indications. — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorrhagique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, aéné, pharyngites chroniques, etc.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

SULFURYL MONAL

Forme. — Pastilles agréables à sucer.

Compos. — Synthèse des eaux minérales sulfureuses.

Chaque pastille dégage 2 cc. d'hydrogène sulfuré dans l'estomac.

Dose. — Croquer ou sucer 2 à 8 pastilles par jour.

Propriétés. — Permet d'instituer d'une façon active partout et en toute saison la *cure sulfureuse interne*.

Indications. — Affections de la gorge et des voies respiratoires. Lymphatisme. Rhumatismes. Syphilis. Maladies de la peau. Etats infectieux et post-infectieux.

Laboratoires MONAL & C^{ie}
20, rue de Vienne — PARIS

SUPPARGYRES

du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne. Méthode simple sous forme discrète, voie rectale, active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

Forme. — Adultes. — Suppositoires à 0,04 egr. de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Enfants de 1 à 10 ou 11 ans 0,02 egr.

Dose. — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours, repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

Nota. — Hg. vif est et reste le seul anti-syphilitique *indiscutable et certaine*. Sa véritable voie d'absorption est la voie rectale parce que tous les capillaires de l'intestin vont au côté qui vitilisse et rend Hg. actif : On mélange à une solution d'arséna-benzol des trépanées vivantes - Ils vivent. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'EXTRAIT de FOIE, les trépanées sont foudroyées.

(Exp. de Levaditi.)

Laboratoire du Docteur TISSOT
34, Boulevard de Clichy — PARIS

SUPPO-GYNALS

Analgésique emménagogue

Forme. — Suppositoires.

Composition. — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame, de cannabis et de sénéecio, beurre de cacao.

Propriétés thérapeutiques. — Facilitent la venue des époques et calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles.

Mode d'emploi. — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un « SUPPOGYNAL ». Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les S.-G. dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr).

Laboratoire LEES

PARIS — 124, Rue du Bac, 124 — PARIS

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Suppositoires à la Glycéérine solidifiée, pour adultes et pour enfants.

Mode d'emploi :

Mouiller légèrement le suppositoire, en le trempant dans l'eau chaude, puis l'introduire dans l'intestin par la pointe. Lorsqu'il est complètement enfoncé, le pousser profondément avec le doigt, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le contact du suppositoire.

Indications. — Prescrits contre la constipation chez l'adulte et chez l'enfant.

Les Suppositoires Chaumel à la glycérine solidifiée se préparent également aux principaux médicaments, pour leur administration par la voie rectale.

Établissements FUMOUBE

78, Faubourg Saint-Denis — PARIS

LES SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

Composition. — A base d'Arsénobenzol (606).

Mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

Continuer le traitement vingt-quatre jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Accidents primaires et secondaires. Syphilis viscérale.

Hérédo-Syphilis. — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

Présentation. — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 de 606.

Suppositoires pour enfants, à 0 gr. 43 de 606.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01 de 606.

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes - PARIS - Tél. : Wagram 37-64

SUPPOSITOIRES LOGEAIS

Composition. — Chaque suppositoire contient 0.60 egr. d'oléosulfonate d'hamamélide, combinaison définie d'une huile sulfonée spéciale avec un extrait glycéринé total d'hamamelis préparé sans alcool.

Ni stovaine, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques.

Propriétés. — Analgésiques, décongestionnants vaso-constricteurs. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite. Ne tachent pas le linge.

Indications. — Hémorroïdes internes et rectite concomitante.

Mode d'emploi. — Introduire matin et soir après lavage un suppositoire Logeais par le petit bout pour ne pas augmenter l'irritation locale.

Laboratoires LOGEAIS

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénno-Styptiques)

Adrénaline.....	1/4 mgr.
Anesthésine-stovaïne.....	0,06 cgr.
Ext. de Marrons d'Inde frais	..
stabilisé.....	0,02 cgr.

(Hamamelis)
pour un suppositoire.

Dose et mode d'emploi :

Introduire un ou deux suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin une heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales réoule et congestionne les hémorroïdes ; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Propriétés Thérapeutiques :

Décongestionnants, astringents, anesthésiques, calmants, antiseptiques.

Indications :

Traitement rationnel des Hémorroïdes.

Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré
PARIS

Laboratoires MIDY
4, Rue du Colonel-Moll, 4
PARIS (17^e)

SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao-Glycérine)
pour Bébés, pour Garçonnetts,
pour Adultes.

CONSTIPATION, HÉMORROIDES

La boîte : 8 francs.

La 1/2 boîte : 5 francs.

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie.

19, Avenue de Villiers, 19

PARIS

SYLVOR

Poudre composée, exclusivement végétale,
sans aucun produit chimique, d'un goût
agréable.

Indications. — Mauvaises digestions, Manque
d'appétit, Dyspepsies, Gastro-entérites,
Gastralgies, Crampes, Vomissements, Mi-
graines, Mal de mer.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café, dé-
layée dans de l'eau, avant et après les re-
pas, et au moment des malaises, jusqu'à 6
cuillerées à café par jour. Demi-dose pour
les enfants.

LABORATOIRES SAINT-CLAIR,

4, Quai Pasteur — CETTE (Hérault)

SYNCAÏNE

Novocainum : Pharmacopée française 1920

Composition. — Ether para-aminobenzolique du diéthyl-aminoéthanol.

Propriétés. — Anesthésique, sept fois moins toxique que la cocaïne.

Applications. — Petite et grande chirurgie : anesthésie locale, régionale, épidurale et rachidienne.

Formes : I. — *Syncaïne pure*, à l'état de sel ; en flacons d'origine de 0 gr. 50, 1 gr., 5, 10, 25, 50 et 100 gr., pour préparation extemporanée de toutes solutions à titres divers.

II. — *Comprimés Syncaïne pure* n° 1, à 0 gr. 025 ; n° 2, à 0 gr. 05 ; n° 3, à 0 gr. 10 ; tubes de 20 et 10. *Syncaïne-Adrénaline* n° 1a, à 0 gr. 025 de Syncaïne et 1/4 mgr. d'Adrénaline par comprimé ; n° 2a, à 0 gr. 05 ; 3a, à 0 gr. 10 de Syncaïne et 1/2 mgr. d'Adrénaline ; tubes de 20 et de 10.

III. — *Tubes stérilisés Clin* (1, 2, 5, 10, 25 et 50 cc.), de solution de SYNCAÏNE, pure ou associée, aux titres de 1/2, 1, 2, 4, 5 et 8 % pour toutes anesthésies.

IV. — *Ampoules stérilisées de Syncaïne sèche*, dosées à 0 gr. 08, 0 gr. 12 et 0 gr. 15. Ce conditionnement convient surtout aux Rachi-anesthésies.

V. — Solutions adranesthésiques présentant, en ampoules séparées pour le mélange des deux solutions au moment de l'emploi : la solution de SYNCAÏNE à 1/2 % (ampoules de 5, 10 et 25 cc.), et à 4 et 5 % (ampoules de 2 cc), et la solution d'ADRÉNALINE à 1 ‰ (ampoules de 1 cc.). Ces ampoules retardent l'altération des solutions de Syncaïne-Adrénaline où l'Adrénaline est en dilution élevée.

VI. — *Collyres de Syncaïne*, en ampoules compte-gouttes, titrés à 0 gr. 20 et à 0 gr. 40 pour 10 cc.

LABORATOIRES CLIN,

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

SYNERGYL VADAM

Histogénèse générale

Formes :

Ampoules et Granulé

Doses :

Une ampoule tous les deux jours (ou une cuillerée à café de granulé deux fois par jour), chez tous les grands déprimés et Convalescents.

Tonique ante et post opératoire

Composition :

Nucléophosphates de soude et de chaux associés aux arsenicaux assimilables et à la strychnine (0,001 par ampoule).

Demander renseignements et Littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut
22, Rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉ-
CIALITÉS PHARMACEUTIQUES"
vous rend des services, engagez les
Pharmaciens Spécialistes à y souscrire,
ce qui nous permettra de le perfec-
tionner et d'en augmenter le tirage.

SYNTHOL

Complexe de Cyclanols polyméthyléniques et de Cétones cycliques agissant par action physique. Rigoureusement exempts d'alcaloïdes toxiques, de radium ou de dérivés radio-actifs.

Présentation. — Liquide hyalin, non toxique, non caustique, ni salissant, s'employant exclusivement en applications externes. Livré en flacons de 250 cc. environ, entourés chacun d'un écran inactinique.

Propriétés. — Excitant efficace de la vasomotricité (propriétés immédiatement vérifiables).

Tonique du système nerveux par action réflexe et régulateur des échanges intraorganiques.

Cryogénique d'action rapide provoquant instantanément une sensation d'euphorie chez l'individu en état de santé ou en cours de maladie. Dynamogénique et tonique de toute déficience organique sans aucune action secondaire néfaste.

Indications. — La plupart des états de dépression et le symptôme douleur.

Du fait de son mode d'action très général, le **Synthol** est plutôt qu'un médicament un mode thérapeutique utilisable dans de nombreuses circonstances comportant un état de dépression ou le symptôme douleur.

a) Symptôme *Fatigue*: Etats asthéniques au cours des maladies, Anémies, Dénutrition, Convalescence des Etats infectieux, etc., Surmenage intellectuel, Insomnie, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Surmenage physique.

b) Symptôme *Douleur*: Migraines, Névralgies, toutes les douleurs dues aux accidents arthritiques, Rhumatismes aigus, chroniques, déformants, articulaires, musculaires.

Limitations des mouvements articulaires, Arthrites, Sciatiques, Lumbagos, Névralgies faciales, Douleurs intercostales, Coliques intestinales, Hépatiques, Néphrétiques, Utéro-ovariennes, etc.

e) Autres indications principales :

Troubles de la circulation veineuse : Hémorroïdes, Phlébites, Varices, etc.

Usages gynécologiques : Leucorrhée. Vaginites, Métrites. Troubles de la Ménopause. Période obstétricale.

Usages chirurgicaux : Pansements aseptiques, Anesthésie locale en remplacement du Kélène, Anémie post-opératoire.

Usages stomatologiques : Pyorrhée alvéolo-dentaire. (Irrigations dans le trajet intragingival au moyen d'une seringue, guérison obtenue en quelques jours.)

Pansements dentaires, Irritations des muqueuses, etc.

Posologie. — S'utilise en Lotions, Compresses, Frictions, Pulvérisations, Lavages, Gargarismes, Pansements pur ou étendu d'eau à 50 et 20 %.

En général, les applications doivent être faites non seulement sur le point où se manifeste le symptôme douleur, mais en même temps sur la région où l'on estime que se trouve la cause principal du malaise (les applications sur la tête et la nuque sont très importantes généralement indiquées du fait de l'action du Synthol sur les centres bulbaires).

Utiliser : Synthol pur : en Frictions sur la tête, la nuque et les régions malades. Additionné d'eau à 50 et 20 % ; en Gargarismes et Injections intravaginales, etc., et Compresses permanentes renouvelées plusieurs fois par jour, en Compresses sur les Contusions Brûlures, Douleurs névralgiques variées, et Injections dans les trajets fistuleux.

Eviter de laisser s'écouler plus de 24 heures entre chaque application. L'usage du Synthol sur l'épiderme ne doit jamais produire de rubéfaction. Il est inutile de frictionner fort. Dans le cas d'utilisation prolongée en compresses pures, vaseliner légèrement la peau.

Laboratoires de BIOLOGIE

et de PHYSIOLOGIE d'ORLÉANS

Section de Montreuil : 57 ter, rue Edouard-Vaillant

MONTREUIL-sous-BOIS (Seine)

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

A base d'oxygène naissant, menthol, coca-stovaine, benzoate de soude, etc. Tablettes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — Adultes, 10 à 15 par jour à sucer; Enfants, 6 à 10 par jour à sucer.

Propriétés. — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

Indications — Affections des voies respiratoires et de la gorge, Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Laboratoire des Produits Scientia
21, rue Chaptal. — PARIS

TABLETTE PERROUD

La "Tablette Perroud"; est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : Le goût n'est pas offusqué, les reflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de bismuth par tablette divisée en 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastro-pathies : *Gastrite*, *gastralgie*, *hypersecretion*, dans les fermentations intestinales, à petites doses, seule ou associée, la "Tablette Perroud" rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD
7, rue des Archers — LYON

TABUROL MONAL

Opothérapie Sanguine et Reminéralisation.

Forme. — Dragées.

Compos. — Sérum hématopoiétique hémoglobiné associé au fluorure de calcium méthylarsiné.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour aux repas. Avaler sans croquer.

Action. — Hématogènes, Reconstituantes, Reminéralisatrices.

Indications. — États Anémiques, Chlorose, Neurasthénie.

Laboratoires MONAL & C^{ie}
20, rue de Vienne, 20 — PARIS

TÆNIFUGE BARDET

(Médaille d'Or, STRASBOURG 1924)

Composition. — Préparation liquide à base d'Aspidium Félix Mas, obtenue par un procédé mécanique à l'état colloïdal.

Indications. — Tænias, Ascarides, Oxyures, Ankylostomes, Tricocéphales.

Posologie. — Se conformer aux indications du prospectus joint au flacon.

Prix : 16 fr. 80

Echantillons et littérature détaillée

PHARMACIE BARDET

FONDÉE EN 1860

76, rue de Sévres — PARIS (VII^e)

TÆNIFUGE KIRN

en capsules

à base de filicine, principe actif de la fougère mâle dissous dans son huile grasse.

Tœnifuge le plus actif, ne présentant pas les dangers inconvénients des tœnicides, comme la pelletiérine.

(Travaux et thèse de Kira et Schmidt).

Capsules Kirn. — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme ; sans catomel.

Mode d'emploi. — 1^{re} Avant-veille, purgation ; 2^e la veille, diète presque absolue (lait) ; 3^e Le matin à jeun l'absorption de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement suivies.

Enfants. — Capsulines Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires ni équivalents

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, Rue de la Source — PARIS (16). Tél. Aut. 06-62

TAMPOL " ROCHE "

Pansement gynécologique idéal

Le *Tampol Roche* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique non absorbante, contenu dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

Mode d'emploi. — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol Roche* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement, jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait*.

N. B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol Roche* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.


Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

TARTRO-BI " ROCHE "

Pour injections endo-veineuses

Le Tartro-Bi Roche est une solution neutre et limpide à 10 0/0 de tartrobismuthate de sodium répondant à la formule :



Avantages. — Effet rapide. Tolérance maxima. Imprégnation immédiate du liquide céphalo-rachidien.

Indic. partic. — Le Tartro-Bi Roche est surtout indiqué quand on veut agir vite ou attaquer vigoureusement une syphilis nerveuse par exemple ou des accidents graves (ostéo-périostite, anévrisme, myélites, névrites, etc.).

Traitement. — $\frac{1}{2}$ ampoule le 1^{er} jour; si elle est bien supportée, 1 ampoule tous les 2 jours pendant 5 jours; 3 jours de repos; 1 ampoule par jour pendant 4 jours; 4 à 5 jours de repos; enfin 1 ampoule par jour pendant 2 jours.

Cette manière de procéder évite les inconvénients et donne des résultats très rapides.

Technique. — Celle de toutes les injections endoveineuses.

Boîte de 12 amp. de 1 cc

Chaque amp. de 1 cc = 0.10 Tartro-Bi ou
0.035 Bi métal

Produits

F. HOFFMANN — LA ROCHE et Cie

21, place des Vosges

PARIS-III^e

TAXOL

Composition :

Extrait total des glandes de l'intestin.....	0 gr. 05
Extrait biliaire....	0 gr. 10
Agar-Agar.....	0 gr. 05
Ferments lactiques.....	0 gr. 05

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Prop. Thér. — Régulateur physiologique de l'intestin. Aucune accoutumance. Non toxique.

Indication. — Constipation.

Dose et Mode d'emploi. — Commencer le traitement par deux comprimés après un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Laboratoires Réunis

11, Rue Torricelli — PARIS (17^e)

TÉCARINE

Théobrominaacétate de Sodium

Nouveau diurétique déchlorurant, nettement différent de la théobromine, dépourvu de toxicité.

Toutes les indications de la théobromine, avec l'avantage de la solubilité.

Délivré sous les formes de comprimés à 0 gr. 25 (voie buccale) et d'ampoules à 0 gr. 25 pour 2 cc. (voie sous cutanée ou intra-veineuse). Rapidité d'action remarquable.

Les Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple

PARIS (2^e)

R. C. Seine 5386

TERKAL MONAL

Forme. — Dragées.

Compos. — Carbonate de gaïacol ter-pino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

Action. — Calmantes, Expectorantes, Curatives, Reminéralisatrices.

Indications. — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Laboratoires MONAL & C^{ie}

20, Rue de Vienne — PARIS

TETRANITROL ROUSSEL

Composition.

Comprimés de tétranitrate d'Erythrol à 1, 2, 5 mmgr et 1 centigr.

Indications.

Hypertension : Angine de poitrine, asthme cardiaque, œdème pulmonaire.

Doses et mode d'emploi.

Laisser fondre les comprimés sur la langue au moment des crises (de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington. — PARIS-VIII^e

THALASSOTONINE VADAM

Histogénèse générale
et particulièrement pulmonaire

Formule.

Eau de Mer Isotonique.	5 cc.
Cacodylate de soude	0,05
S. de Strychnine.	0,001
Nucléophosphate de soude	0,10

MODE d'EMPLOI et DOSES

Pour Adultes. — Pratiquer tous les 2 jours une injection intramusculaire profonde en ayant soin de faire pénétrer le liquide très lentement dans les tissus. Maintenir quelques secondes un tampon de ouate stérile sur la piqûre après le retrait de l'aiguille et pratiquer un très léger massage pour faciliter la résorption du liquide.

Pour enfants au-dessous de 10 ans. — Commencer par injecter une demi-ampoule et augmenter progressivement jusqu'à une ampoule entière.

Demander renseignements et Littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE

Docteur en pharmacie, Lauréat de l'Institut
22, Rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

THAOLAXINE

(Laxatif-régime)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhamnées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

Doses et mode d'emploi. — Paillettes 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas; comprimés, 2 à 8 comprimés à chaque repas; granulé, 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas (spécialement préparé pour les enfants).

Prop. Thér. — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Laboratoires DURET & REMY

ASNIÈRES (Seine)

THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé

Prop. Thé. — Possède les propriétés tonico-cardiaques et diurétiques de la théobromine, mais elle agit à des doses 4 à 5 fois moindres que celle-ci ; elle est dépourvue des inconvénients de la théobromine.

Indications. — Les effets cardio-toniques et vaso-dilatateurs de la Théobromose, en outre de son action diurétique énergique, font de ce produit associé ou non à la Digitaline (Méthode de Huchard) la base de la thérapeutique cardio-rénale. Elle est indiquée dans l'urémie, l'uricémie, l'artério-sclérose, la sclérose cardio-rénale, les œdèmes d'origine cardiaque ou rénale, etc.

Formes. — 1^{re} Solution. Dose : 2 à 4 cuill. à soupe par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Une cuill. équivalant à 0,50 cgr. de théobromine.

2^e Gouttes. — Dose : 3 à 4 cuillères-mesures par jour.

60 gouttes ou une cuiller-mesure équivalent à 0,50 de Théobromine

3^e Comprimés. — Dose : 6 à 8 par jour.

2 comprimés équivalent à 0,50 cgr. de Théobromine.

Laboratoires DUMESNIL

10, Rue du Plâtre — PARIS

THÉOSALVOSE

Composition. — Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

Propriétés. — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

Indications. — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales, Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr.50 par jour.

Formes. — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, scillitique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

THÉOBRYL " ROCHE "

(Théobromine injectable)

Indications, Contre-indications, Action thérapeutique de la Théobromine, mais plus maniable, plus actif et à doses moindres. (Voir les travaux des Prof. Pouchet, Rémond, E. Duhot, des Drs. Jouisse, Richard St-Yves, Bénéch, Ségard, Vigoureux, Colomiès, Crampon, etc.)

Toujours très bien toléré par les adultes, les vieillards et les enfants.

THÉOBRYL " ROCHE " AMPOULES

chaque ampoule = 2 ce.

Cette forme est indiquée quand il y a intolérance gastrique ou susceptibilité du malade et chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

ADULTES : dose moyenne utile, 1/2 ampoule 2 à 4 fois par jour.

(Voir page Ampoules Théobryl)

THÉOBRYL " ROCHE " GOUTTES

1 ce. = XXX gouttes

Cette forme permet de continuer et de prolonger l'action obtenue par les injections ou de réaliser un *traitement d'entretien* toujours parfaitement supporté. Chaque dose doit être prise dans un verre d'eau sucrée ou aromatisée, ou bien dans une tasse de tisane de queues de cerises, orge et ehliendent, stigmates de maïs, etc., à n'importe quel moment de la journée, de préférence une demi-heure avant ou après les repas.

ADULTES : Dose moyenne utile, X gouttes quatre à huit fois par jour.

Enfants : V gouttes 2 à 6 fois par jour

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e

21, Place des Vosges — PARIS (3^e)

THÉOXANTINE

Diurétique cardio-rénal

Adjuvant précieux des cures toni-cardiaques

Composition. — Théobromine cristallisée pure associée au phosphate disodique.

Indications. — En général toutes celles de la théobromine. Pas d'intolérance. Activité plus grande à doses moindres. Complète très heureusement les cures toni-cardiaques.

Présentation et posologie.

Cachets A : Théobromine crist. pure... 0,50
Phosphate disodique..... 0,20

Adultes. — 2 à 3 cachets par jour.

Cachets B : Théobromine crist. pure... 0,25
Phosphate disodique... 0,10

Enfants 1 à 2 par jour ; Adultes 4 à 6.

Echantillons et littérature.

Laboratoires DEGLAUDE

6, r. d'Assas, Paris (6^e). Tél. : Fleur. 31-85.

Belgique : *Agent Général :* L. PRUNIÈRES

19, Rue Louis Hap. — BRUXELLES

THIGENOL "ROCHE"

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

Prop. thér. — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

Indic. thér. — Dermatologie, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc., Thigénol "Roche" pur ou en solution glycérinée (10 à 15%) en applications externes :

Savon "Roche" au Thigénol, le meilleur savon antiseptique.

Toutes les affections gynécologiques :

Thigénol "Roche" pur ou en solution glycérinée (10 à 15%).

Ovules "Roche" au Thigénol à 30% (voir page spéciale).

Tampol "Roche" pansement gynécologique idéal (voir page spéciale).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

THIOCOL "ROCHE"

Dérivé du gaiacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 gr. de Thiocol "Roche" = 0,52 de gaiacol cristallisé.

Doses et modes d'emploi :

SIROP "ROCHE" au Thiocol

(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol "Roche")

Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour

Enfants : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge

CACHETS "ROCHE" de Thiocol

(1 cachet = 0,50 Thiocol "Roche")

2 à 6 cachets par jour

COMPRIMÉS "ROCHE" de Thiocol

(1 comprimé = 0,50 Thiocol "Roche")

2 à 6 comprimés par jour

Propriétés :

Antiseptique pulmonaire, Phagocyto-gène, Eupeptique, Orexique.

Indications :

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites. - Diarrhées, etc.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

THIONHYDROL GRÉMY

Soufre colloïdal

Liquueur titrée à 0 gr. 20 par cuill. à soupe. — *Pommade*.

Doses et mode d'emploi. — Une cuill. à soupe de *Liquueur* au milieu de chaque repas. — *Pommade* en frictions matin et soir.

Indications principales. — Rhumatisme chronique. - Rhumatisme déformant de la ménopause. - Affections chroniques des voies respiratoires (rhinites, pharyngites, laryngites, bronchites avec expectoration muco-purulente). (Associer l'Immunizol n° 16). — Syphilis (adjuvant du traitement mercuriel). - Vaginites et métrites.

Dans l'arthritisme et dans le rhumatisme déformant de la ménopause, il y a avantage à associer au Thionhydrol la Thyrénine Grémy.

14, Rue de Clichy — PARIS (9^e)

THIOPEPTONE du Dr L. BRU

Soufre colloïdal organique à l'état naissant en sérum glycéринé, directement assimilable.

Indications. — *Le Poupon* : Tous états infectieux du poupon, congestions chroniques et reliquats d'affections aiguës. Pleurites, Douleurs d'épaules, Névralgies intercostales, Rhumatisme tuberculeux, Tuberculose subaiguë et chronique.

Arrêt de la maladie. Pas de choc, pas de réaction, pas de toxicité, action nettement tonique.

Formes pharmaceutiques :

- 1^o Ampoules de 20 cc. pour injections intraveineuses. (1 par semaine.) — La boîte de 3 ampoul.
- 2^o Ampoules de 5 cc. pour injections hypodermiques ou intraveineuses (2 par semaine). — La boîte de 6 ampoules.
- 3^o Flacon de 90 cc., enfants : 1 cuillerée à café par jour ; adultes : 1 à 2 cuillerées à café — aux repas dans un liquide.

Dépôt général et littérature :

Laboratoires F. MOULIN

2, Rue Léon-Cogniet — PARIS

Adresse télégr. : Fémoulef-Paris

THYRÉNINE GRÉMY

Principes actifs totaux de la glande thyroïde
(exempte de parathyroïdes)

Pilules dosées à 0,02, correspondant à 0,20 de glande fraîche.

Tablettes dosées à 0,01, correspondant à 0,10 de glande fraîche.

Doses et mode d'emploi. — Débuter par une pilule par jour pendant deux jours, puis alternant une et deux, puis deux pilules par jour. Au besoin, élever progressivement la dose jusqu'à six pilules, dose maxima.

Tablettes : doses doubles.

Suspendre momentanément le traitement : 1° si le pouls dépasse 100 pulsations ; 2° si le malade accuse de la diarrhée, des transpirations, des bouffées de chaleur, des palpitations, du tremblement.

Indications. — Insuffisance thyroïdienne.

Arthritisme et rhumatisme déformant de la ménopause : associer la *Thyrénine* au *Thionhydrol Grémy*.

Aménorrhée : associer la *Thyrénine* à l'*Ocréine*. (voir aussi *Thyrocréine Grémy*).

14, Rue de Clichy — PARIS (9°)

THYROCRÉINE GRÉMY

SYNERGIE TYRO-OVARIENNE

Association d'*Ocréine* et de *Thyrénine* (voir ces mots) renfermant, pour une pilule, quatre parties d'*Ocréine* et une partie de *Thyrénine*.

Doses et Mode d'emploi. — Deux à six pilules par jour, pendant 20 jours, de préférence une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. — Aménorrhée myxoedème fruste, frilosités, engelures, obésité, rhumatisme chronique, constipation, migraine, chaque fois qu'aux signes d'insuffisance ovarienne, s'ajoutent des signes d'insuffisance thyroïdienne.

14, rue de Clichy - PARIS (9°)

TOCHLORINE

(Paratoluène sulfochloramine)

Produit antiseptique préconisé par Dakin sous le nom de Chloramine T.

C'est une poudre cristalline blanche, très soluble dans l'eau, ne coagulant pas l'albumine des plaies.

Douée d'une action germicide intense, elle n'est ni toxique ni irritante.

Usages Chirurgicaux : La Tochlorine trouve de nombreuses applications sous forme, soit de solution aqueuse à 1 % ou 2 %, soit de pâtes ou crèmes, en chirurgie générale, en urologie, en oculistique, en stomatologie.

Usages médicaux : Pour l'usage interne la Tochlorine a été proposée comme désinfectant de l'intestin ainsi que dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

Littérature sur demande

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique

Ampoules contenant chacune :

Eau de mer diluée.....	5 cc.
Cacodylate de soude.....	0,05
Glycérophosphate de soude..	0,20
Sulfate de strychnine.....	1 mil.

Prop. thér. — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoute l'action des 3 médicaments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. — Tuberculose, neurasthénie, entérites. Convalescents.

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE

52, Rue La Bruyère — PARIS

Télégramme : Chevretelematte, Paris

TONUDOL

comprimés, granulé

Nucléarsinate de manganèse associé aux hypophosphistes des chaux et de fer.

Dose et mode d'emploi. — *Comprimés* : 2, avant chaque repaa.

Granulé : 3 mesures ou cuillerées à café par jour.

Indications. — Reconstituant de l'organisme dans les Surmenages, les Troubles de la Nutrition et de la Croissance, la Chlorose et les Anémies.

Ne contient aucun excitant

LABORATOIRES LICARDY,

38, Boulevard Bourdon — PARIS-NEUILLY

TONYOL " F "

Composition. — Préparation à base d'acanthéa virilis, de piscidia et de viburnum.

Action. — L'acanthéa virilis, dont le principe actif est la muirapuamine, a été étudiée par Rebourgeon et Matte. C'est un remarquable tonique neuromusculaire et un accélérateur du courant circulatoire, à action prolongée due à la lenteur de l'élimination.

Indications. — Troubles de la circulation, Accidents de la puberté et de la ménopause, Règles douloureuses et irrégulières, Congestion pelvienne, Artério-sclérose, Varices, Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour.

LABORATOIRES VARGAS,

5, Rue Chauveau-Lagarde — PARIS

TOT' HAMÉLIS

(ni jouvence, ni extrait, ni teinture)

Composition. — Hamamelis total, spécialement préparé pour être administré en nature avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Propriétés thérapeutiques. — Médication de base de l'insuffisance veineuse. Le **TOT HAMÉLIS** peut être prescrit : 1° seul, avec des résultats contrôlables en moins de huit jours de traitement ; 2° associé à tous produits ; 3° en alternant avec les mêmes produits pour éviter l'accoutumance. (Le **TOT HAMÉLIS** a, sur les compositions polyvalentes, l'avantage de laisser au médecin la direction du traitement à instituer, selon les cas).

Indications. — Stases veineuses, Etats congestifs, Hypertension.

Posologie. — *Cachets* : 2 par jour, aux repas ; *Comprimés* : 6 par jour, aux repas. Après disparition des troubles à combattre, les doses peuvent être diminuées de moitié comme médication d'entretien.

LABORATOIRE CHANTEREAU,

8, Rue de Constantinople — PARIS

TRAITEMENT TODAW

Antirhumatismal puissant

Indications. — Rhumatismes sous leurs diverses formes, surtout dans les cas chroniques et anciens. Réussit alors que tout a échoué, Goutte, Sciatique, Lumbago, Névralgie intercostale.

Formes. — **CACHETS TODAW**, Acétylthéosalicyl, 3 par jour, 1 *au milieu* de chaque repas; **BAUME TODAW**, calmant incomparable, 2 à 3 frictions par jour, sur les parties douloureuses. Le traitement complet comprend 3 boîtes de **CACHETS** et 1 flacon de **BAUME**.

PHARMACIE CORDIER
PARTHENAY (Deux-Sèvres)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

TRÉPARSÉNANS

SULFO-TRÉPARSÉNAN

Composition. — Dioxydiaminoarsénobenzène méthylène sulfonate de soude. Contient 20 % d'arsenic ; solutions moins oxydables à l'air que celles des 606 et 914. Injections sous-cutanées ou intramusculaires indolores.

Formes. — Le Sulfo-Tréparsénan est délivré en ampoules scellées à la lampe et contenant le produit dans le vide sur gaz carbonique, en boîtes d'une dose et en boîtes de 10 ampoules d'une même dose.

Doses.	60	0	I	II	III	IV
	0 gr. 02	0 gr. 04	0 gr. 05	0 gr. 12	0 gr. 18	0 gr. 24
	V	VI	VII	VIII	IX	X
	0 gr. 30	0 gr. 36	0 gr. 42	0 gr. 48	0 gr. 54	0 gr. 60

NÉO-TRÉPARSÉNAN.

Composition. — Dioxydiaminoarsénobenzol méthylène sulfoxylate de soude (914 français). Produit défini, rigoureusement stable ; se présente sous l'aspect d'une poudre jaune citron légère, douée d'une odeur franche, faiblement alliacée, très facilement soluble dans son poids d'eau distillée ; sa solution est neutre.

Doses et Formes. — Délivré en ampoules scellées à la lampe et contenant le médicament dans le vide sur gaz carbonique, aux doses suivantes :

I	II	III	IV	V
0 gr. 15	0 gr. 30	0 gr. 45	0 gr. 60	0 gr. 75
	VI	VII		
	0 gr. 90	1 gr. 05		

- 1° Par boîte de 1 dose en ampoules de 10 cc. à fond plat ;
- 2° Par boîte contenant la série des 6 doses progressives (I à VI) en ampoules à fond plat ;
- 3° Par boîte de 10 ampoules de la même dose, en ampoules ordinaires de 3 cc. à fond rond ;
- 4° En boîtes de 3 ampoules de 3 grammes de sel.

TRÉPARSÉNAN. — Dichlorhydrate de dioxydiaminoarsénobenzène (606 français).

Doses de 0 gr. 10 à 0 gr. 60 par progression de 0 gr. 10.

Nota. — Avant d'être livrés pour l'usage thérapeutique, les Tréparsénans sont l'objet d'un contrôle chimique et d'un contrôle physiologique des plus sévères de façon à ne présenter que des produits parfaitement purs, de bonne conservation et de constance éprouvée.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TREPARSOL

Acide formyl-méta-amino-para
oxy-phényl-arsinique

Médication arsénicale spécifique
par voie digestive

Forme :

Comprimés dosés à 0 gr. 25 de prin-
cipe actif à utiliser sous la direction
du médecin.

Dépôt :

Pharmacie générale
54, chaussée d'Antin, PARIS-IX^e

Echantillons et vente en gros

Laboratoire L. Lecoq et F. Ferrand
6 bis, rue de la Rouvray
NEUILLY - SUR - SEINE

TRÉPOL

Traitement de la syphilis par les sels
de Bismuth. Médication intra-mus-
culaire en ampoules stérilisées.

Spirillicide à base de tartro-bismu-
thate de potassium et de sodium à
64 % de Bi en suspension huileuse.

Adopté par l'Assistance publique et
le Ministère de l'Hygiène.

Pour tous renseignements sur le mode
d'emploi, la technique et la litté-
rature de cette préparation,

Demander renseignements et Littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut
22, Rue de la Sorbonne. — PARIS (V^e)

TREPOQUINOL

Iodo-Quinate de Bismuth en suspension aqueuse *Organo-Synthétique*.

Propriétés spirillieides exéessivement accusées où les extraits organiques facilitent non seulement la résorption du Bismuth, mais encore augmente son activité thérapeutique.

Indications { Syphilis paludéenne.
Toutes affections tréponémiques.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Demander renseignements et Littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut
22, Rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

TRIBROMURE GIGON

Composition. — Bromure triple de potassium, sodium et ammonium.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — Etats nerveux, Psychoses, Hyperexcitabilité, Insomnies, Epilepsie.

Mode d'emploi et doses. — Cuillère-mesure dosant 1 gr. : 2 à 12 par jour.

Flacons de 30, 60 et 125 gr.

Laboratoire du Doct^r André GIGON

7, Rue Coq-Héron — PARIS (1^{er})

TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables : phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et de magnésie nécessaires à l'organisme. Cette spécialité reproduit la formule de Ferrier, ce qui explique et justifie sa vogue. La Tricalcine pure s'emploie en poudre, comprimés, granulés, cachets et tablettes chocolat dans le traitement de la tuberculose et comme tonique de premier ordre, dans l'anémie, les convalescences, etc.

Tricalcine en poudre : une mesure à chacun des 3 repas dans un peu d'eau ou mélangée aux aliments, 1/2 dose au-dessous de 10 ans; comprimés : 3 par jour; granulés : 2 cuillers-mesure à chaque repas, enfants au-dessous de 10 ans, 1/2 dose; tablettes chocolat : 2 tablettes à chacun des 3 repas enfants au-dessous de 10 ans, une tablette; cachets : 3 par jour.

Tricalcine méthylarsinée (0 gr. 01 par cachet) en cachets seulement : 3 par jour; enfants, 2.

Tricalcine adrénalinée en cachets seulement : 3 par jour.

Tricalcine fluorée en cachets seulement : 3 par jour.

(1) Les études radiographiques sur l'ostéoporose dans les fractures de guerre ont démontré l'importance de la récalcification par la Tricalcine, en chirurgie osseuse. De plus dans les cas de déminéralisation, elle apporte par transformation physiologique, grâce au chlorure de calcium et à l'acide glycérophosphorique, les matériaux indispensables pour rétablir la nutrition troublée.

Laboratoire des Produits Scientia
21, Rue Chaptal — PARIS

TRIDIGESTINE DALLOZ

Composition. — Les trois ferments digestifs essentiels à leur maximum d'activité physiologique sous une forme qui assure l'intégrité complète de leur pouvoir digestif.

Forme. — Granulé.

Indications. — Dyspepsies par insuffisance sécrétoire

Dose. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Laboratoire DALLOZ

13, Bd de la Chapelle — PARIS (10^e).

TRIFERYL

Forme. — Comprimés chocolatés de Nueléinate de fer, composé ferro-organique entièrement assimilable, dosés à 0 gr. 30.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 3 comprimés par jour, au début de chacun des repas. Les croquer.

Enfants : Donner 1 ou 2 comprimés par jour aux repas.

Prop. théér. — Puissant reconstituant des globules sanguins et des noyaux cellulaires. Augmente la quantité d'hémoglobine dans le sang jusqu'à 90 %

Indications. — Anémies, Chlorosé, Faiblesse générale, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, etc.

E. HAUTDIDIER

37, Rue Galilée — PARIS

TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

(Dragées à Noyau Mou)

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième	Deux Gouttes (3 centigs.)
Caléine	Deux centigrammes
Café d'Héroïne	Un demi-milligramme

Propriétés et indic. thérap. — *Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel. Médicament de choix de l'Angine de Poitrine, l'Asthme Cardiaque, l'Edème Pulmonaire.*

Mode d'emploi — Ces dragées doivent être croquées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée du principe actif et par là-même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès.
Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Laboratoires LALEUF

49, av. de La Motte-Picquet — PARIS (15^e)

Téléph. Ségur : 65-01

TRINITRINE ROUSSEL

Composition.

Comprimés n^{os} I, II, III correspondant à 1, 2 ou 3 gouttes de la solution au 1/100^e.

Indications.

Hypertension : Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Doses et mode d'emploi :

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. (Deux à 6 par 24 heures).

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington. — PARIS-VIII^e

TUBERCULINE C. L.

Pour le traitement de la tuberculose

La Tuberculine C. L. est présentée en solution dans de l'eau physiologique stérilisée.

La série des ampoules est répartie en trois boîtes de 12 :

Boîte O. — Ampoules contenant par centi-cube de 1 cent millième à 7 dix-millièmes et demi de milligramme.

Boîte A. — Ampoules contenant par centi-cube de 1 millième à 8 dixièmes de milligramme.

Boîte B. — Ampoules contenant par centi-cube 1 milligramme.

Dose. — Habituellement, une injection tous les 12 jours.

Les injections ne produisent aucune douleur ni aucune gêne et le malade peut vaquer aux occupations permises par son médecin.

Littérature sur demande

Les Etablissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

TUBEROL

Association d'essences balsamiques pures.

Propriétés therap. — Sans aucune toxicité. Inoffensif. Il est absorbé par la peau ou respiré en fumigations ou inhalations, puis exhalé avec toute son efficacité antiseptique par la muqueuse des voies respiratoires. Une petite quantité est éliminée par les reins dans les urines.

Indic. therap. — a) Toutes affections des voies respiratoires : Broncho-pneumonie, Bronchite capillaire, Abcès du poulmon, Pneumonies grises, Bronchites aiguës, Catarrhes des emphysémateux, etc.

b) Les états ganglionnaires : Ganglions et Abcès froids non fistuleux.

Mode d'emploi. — 1° Applications thoraciques. Dans une flanelle bien imbibée qui séchera à même la peau;

2° En inhalations, 1/2 cuil. à café dans un litre d'eau bouillante;

3° En compresses. Sur les ganglions, pur ou mélangé de 2 ou 3 parties d'huile ou de vaseline.

Laboratoire du TUBÉROL

23, Rue des Moines — PARIS

TUBES DULCIS

Argolène (Sel d'Ag). — Conjonctivites aiguës, à 5 0/0 et 10 0/0.

Cadmiol (Sel de Zn et Cd). — Conjonctivites chroniques, à 1 0/0.

Cuprinol (Sel organique de Cu). — Conjonctivites chroniques, à 1 0/0 2 0/0, 5 0/0.

Iodo-Calcoïque. — Traitement de la cataracte, à 8 0/0.

Nov-Optochine. — Ulcères à pneumocoques, à 1 0/0.

Oxyde orangé de Hg. — Blépharites, conjonctivites phlycténulaires, à 10/0 2 0/0, 3 0/0, 4 0/0, 5 0/0

Ophthalmoforme. — Antipurulent. à 2 0/0, 3 0/0.

Aristol. — Antipurulent. à 2 0/0.

Iodoforme. — à 1 0/0 et 2 0/0.

Thiosinamine. — Opacités, synéchies à 1 0/0.

Alcaloïdes seuls.

Alcaloïdes associés.

Pilules Iodo-Kératine dosées 0 gr. 20 d'iodure de potassium, solubles dans l'intestin, insolubles dans l'estomac.

Pilules de Cytogénol.

Laborat. de Thérapeutique oculaire
du Docteur FERRY, à BOURG (Ain)

TUBES du D^r GUIRAUD

(Anciennement DAVIEL)

POMMADES OPHTALMIQUES

munis d'une canule spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'œil.

TOUTES FORMULES

Spécialement recommandées : Pommades à l'aristol, à l'oxyde de jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de division extrême et une puissance d'action considérable.

Echantillons sur demande

Docteur GUIRAUD

Ex-Pharmacien des Hôpitaux

98, Rue Saint-Genès — BORDEAUX

LE TULLE GRAS LUMIÈRE

au Baume du Pérou

est destiné à éviter l'adhérence aux plaies des pièces de pansement. — Le pansement fait avec le **Tulle Gras Lumière** se détache aisément sans effort, sans provoquer de douleur ni d'hémorrhagie résultant de l'arrachement d'éléments appartenant aux bourgeons et aux tissus fragiles en voie de régénération.

Le **Tulle Gras Lumière** est coupé en carrés de 10×10 c/m, qui sont superposés dans une boîte métallique, et séparés par du papier destiné à en protéger l'asepsie.

Pour les plaies de grande surface, nous avons un format de 22×22 qui n'est livré que sur demande spéciale.

Produits Spéciaux des Laboratoires A. Lumière

M. SESTIER PHARMACIEN

9, Cours de la Liberté — LYON

ULCÉOPLAQUE-ULCÉOBANDE

" LE PANSEMENT "

Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées. C'est un merveilleux générateur de la cellule, un stimulant de sa vitalité.

Les résultats sont surprenants.

Cicatrisation rapide des plaies atones et des ulcères variqueux, même très anciens, sans interrompre ni le travail ni la marche.

Boîtes de 6 pansements pour 24 jours.

Ulcéoplaque N° 1 — 5 cm. / 6 cm.

Ulcéoplaque N° 2 — 7 cm. / 9 cm.

Ulcéobande — une pièce.

Laboratoire SÉVIGNÉ

11, Rue de Jarente — PARIS (4^e)

ULMARÈNE GIGON

Composition. — Ether salicylique liquide d'odeur agréable.

Indications thérapeutiques. — Analgésique local, antirhumatismal externe. Spécifique contre les rhumatismes, les névralgies.

Formes. — 1° Ulmarène pur, flacons de 30, 60, 125 cmc.;

2° Ulmarène formulé dans une préparation magistrale (liniment, pommade) ;

3° Ulmarol Gigon (liniment) ;

4° Baume du docteur Gigon, en tube.

Mode d'emploi. — Onctions suivies d'enveloppements.

Laboratoires du D^r André GIGON

7, rue Coq-Héron — PARIS (1^{er})

URACÉTOSE

Granulé sucré, effervescent, soluble

Propriétés thérap. — Action uricostreante très énergique, diurétique aussi puissant que doux pour le filtre rénal. Antiseptique urinaire et hépato-rénal par excellence; analgésique.

Tolérance indéfinie. Aucune contre-indication.

Composition. — Tartrate de pipérazine (Lycétol), hexaméthyltétradramine, salicylate, benzoate et formate de lithine lactose et sucre effervescent

Indications. — Toutes les manifestations de l'arthrisme, Artério Sclérose, Douleurs, Rhumatisme, Goutte, Gravelle. Coliques néphrétiques et hépatiques, Névralgie, Migraines. Sciatiques, Maladies du foie, des reins, de la vessie et des Voies urinales (Néphrites, Pyélo-Néphrites, Cystites, Uréterites, Blennorrhagies, etc.).

Grippe, Influenza, Fièvre et toutes les maladies intercurrentes,

Dose et Mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café par jour, dans de l'eau. Pour les enfants de 5 à 15 ans, par demi cuillerées à café, 3 à 6 par jour

Echantillons et Littérature

Laboratoires FEVRIER & DECOIST

26, rue Sévigné — PARIS (4^e)

URASÉOL

Dissolvant de l'acide urique.

Antiseptique urinaire.

Forme. — Comprimés solubles.

Composition :

Acide thyminique.....	0 gr. 05
Benzoate de lithine.....	0 gr. 10
Urotropine	0 gr. 45
par comprimé.	

Posologie. — 4 comprimés par 24 heures, préalablement délayés dans un peu d'eau.

Indications. — Diathèse urique (Rhumatismes, Goutte, Gravelle), Antiseptique des voies urinaires.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} Classe,
de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

URASEPTINE ROGIER

A base de Piperazine, Urotropine, Helmitol, Benzoate de soude et de lithine, etc.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 60 de substance active par cuill. à café.

Dose. — 3 à 6 cuill. à café par jour.

Propriétés. — Antiseptique Urinaire par excellence. Dissout et chasse l'acide urique.

Le flacon : 10 fr.

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie
19, Avenue de Villiers — PARIS

URAZINE

(Citro-salicylate de Pipérazine)

Le plus actif des dissolvants de l'acide urique et des urates, analgésique, antiseptique.

Le médicament de choix à opposer à la *lithiase rénale* et à toutes les *manifestations arthritiques* (goutte, rhumatisme, gravelle, etc.).

Innocuité absolue. Aucune contre-indication.

Comprimés dosés à 0 gr. 30 (3 à 4 par jour, au moment des repas).

Granulés effervescents (une cuillerée à café, dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas).

Laboratoire des Produits

“ USINES DU RHONE ”

21, Rue Jean Goujon — PARIS (8^e)

URIFLUINE

Succinate de Lithine pur

Le seul sel de Lithine injectable sous la peau
sans douleur ni réactions

Indications. — Rhumatisme chronique et déformant, goutte, gravelle, lithiase rénale, coliques néphrétiques, sciatique.

Propriétés thérapeutiques. — Ce sel dissout l'acide urique au sein de l'économie et ensuite aide à son expulsion par une action diurétique très accusée.

Mode d'emploi. — Les injections peuvent se faire dans toutes les régions du corps ; elles n'ont aucun inconvénient, n'amenant ni douleurs, ni gonflement, ni réaction d'aucune sorte. Selon les cas, en faire une matin et soir, une par jour, une tous les deux jours. Les comprimés d'Urifluine se prennent à la dose de 2 à 4 par jour.

Laboratoires " STÉNÉ "

Anciens Etablissements BEAUGONIN

4, Place des Vosges — PARIS

URILYSONE

Hexaméthylène-citrate d'anhydro-hexaméthyltétramine-benzoate de lithine.

Antiseptique urinaire et des voies biliaires.

Indications.

Cystites et pyélonéphrites.

Blennorrhagie.

Cholécystites et Angiocholites.

Rhumatismes.

Calculs.

Doses.

Etats aigus: 2 à 3 comprimés par jour

Etats chroniques : un à 2 comprimés
par jour.

Le tube de 20 comprimés: 5 fr.

O. ROLLAND

1, place Morand. — LYON

URISANINE

Composition. — Benzoate d'hexaméthylène-tétramine (urotropine) dissous dans un excipient à base végétale (plantes balsamiques) auquel a été incorporé l'extrait de stigmates de maïs.

Dosage. — Une cuillerée à café = 1 gr. de Benzoate d'urotropine + 0,20 cgr. d'extrait de stigmates de maïs dissous dans 4 gr. d'excipient végétal balsamique.

Propriétés thérap. — Antiseptique urinaire et biliaire complet ; balsamique et diurétique ; dissolvant phosphatique, urique et uratique ; éliminant sûr et rapide.

Indications. — Toutes affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésico-rénale.

Mode d'emploi. — Se prend diluée dans 1/2 verre d'eau naturelle ou gazeuse.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : par 1/2 cuillerée à café suivant l'âge.

Laboratoires de l'« URISANINE »

28, rue Milton — PARIS

UROFORMINE GOBEY

Comprimés dosés à 0,50. Solution injectable en ampoules de 2 et 5 cc. à 0 gr. 25 par cc.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour dans un verre d'eau froide. Injections de 0 gr. 50 à 2 gr. par jour.

Prop. thérap. — Le plus puissant antiseptique interne. Dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Fièvres infectieuses, Grippe, Encéphalite, Complications broncho-pulmonaires, etc., Rhumatismes, Infections des voies biliaires et urinaires, etc.

G. BEYTOUT & L. CISTERNE

12, Boulevard St-Martin — PARIS (10^e)

UROÏODINE

Composition. — L'Uroïodine ou Iodoéthylate d'hexaméthylénététramine est une combinaison organique contenant 42% d'iode rigoureusement titré, associée à un sel de lithine.

Propriétés physiques et chimiques. — Solution dialysable, se décompose lentement, est diffusée dans tout l'organisme, s'élimine dans l'urine sous forme d'iodure alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique. Pas d'accumulation.

Propriétés physiologiques. — Grâce à sa molécule iodée, l'Uroïodine est un excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense, un fixateur d'oxygène, stimulant les échanges nutritifs de l'organisme.

Grâce à l'heureuse combinaison Iode-Formine, l'Uroïodine constitue un agent anti-infectieux particulièrement énergique. Enfin, grâce à l'association Formine-Lithine, l'Uroïodine est un diurétique très actif et un excellent dissolvant de l'acide urique et des urates.

Indications. — Toutes affections glandulaires : adénites, adénopathies, végétations adénoïdes, serofulides, etc.. Maladies de la nutrition : toutes manifestations des diathèses Urique-goutte, gravelle, calculs, etc.. Arthritique : rhumatismes chroniques et déformants. Tubercules localisés : osseuses et ganglionnaires. Tertiarisme, Scléroses, Asthme, Emphysème, etc..

Formes et Posologie. — Ampoules A de 1% $\frac{3}{4}$. Ampoules B de 3% $\frac{3}{4}$. Comprimés kératinisés de 0 gr. 50. Chez l'enfant au-dessous de 15 ans 1 à 2 ampoules A par jour. Chez l'adulte, 1 à 2 ampoules B en injections intramusculaires ou intraveineuses (bien tolérées sans réaction locale ni choc hémoclasique, résorption parfaite). Comprimés : 1 à 2 comprimés suivant l'âge chez l'enfant ; 2 à 6 comprimés suivant l'âge chez l'adulte, comme traitement d'entretien contenant 42% d'iode ; remplacent avantageusement les iodopeptones qui n'ont que 17% d'iode, mieux tolérés grâce à leur enrobage spécial.

Laboratoire de l'UROÏODINE

45, Boulevard Lafayette, 45 — CALAIS

UROMETINE LAMBIOTTE FRÈRES

Hexaméthylènetétramine pure

Formes. — Comprimés; Ampoules, Cristaux.

Prop. Thér. — Puissant antiseptique interne, antitoxique anturicémique.

Indications. — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses toutes manifestations de la diathèse urique.

Mode d'emploi. — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques.
2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses.

3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

Littératures et échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

3, rue d'Edimbourg PARIS (8°)

124, Avenue Rogier 124 — BRUXELLES

UROSAN DUFAYARD

Forme. — Comprimés à faire dissoudre.

Composition. — Benzo-camphorate d'urotropine et extr. de styles de maïs.

Indications. — S'emploie avantageusement dans tous les cas où l'urotropine est indiquée. *Médicament de choix* pour le traitement des Cystites, Prostatites, Urétrites, Pyélites, Pyélonéphrites, de la Grippe, Fièvre typhoïde, Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Gravelle, Calculs, Phosphaturie.

2 à 6 comprimés par jour, dissous dans l'eau.

Echantillons sur demande.

Laboratoire DUFAYARD

12, rue des Saints-Pères — PARIS

VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE

du Professeur MINET

Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour, l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme, tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe, Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5^e et la 6^e injection, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte, à la dose de 1/4 de cc. entre 1 et 3 ans; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE

du Professeur MINET

« A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une « modification véritablement impressionnante du tableau classique de la Pneumonie. »

Indications. — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards.

Mode d'emploi. — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule, soit 1 cc. 1/2 et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée, dès le deuxième jour, à deux ampoules ou une seule injection. Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 et 3 ans; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

VACCIN ANTI-GRIPPAL

du Professeur MINET

Traitement de la grippe et de toutes ses complications pulmonaires et suppuratives: otites, sinusites, etc. congestion grippale.

Mode d'emploi. — Voir Vaccin Anti-Pneumonique.

Laboratoires " STÉNÉ "

Anciens Etablissements BEAUGONIN

5, Place des Vosges — PARIS

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Ces vaccins sont constitués par des émulsions de cultures microbiennes en milieu fluoruré.

Le procédé de préparation assure d'une façon absolue la mort des microbes, qui conservent cependant toutes leurs propriétés à la vie près. Pratiquement *atoxiques* et *stabilisés* ils conservent leur activité pendant une très longue période.

On peut les utiliser à titre *curatif*, sans réaction fébrile appréciable.

Polyethniques, donc polyvalents, leur efficacité est égale, sinon supérieure à celle des auto-vaccins. Leur emploi ne nécessite ni calcul, ni technique compliquée.

La série comprend les quatre vaccins suivants :

NÉO-DMÉGON antigonococcique.

NÉO-DMESTA antistaphylococcique.

NÉO-DMÉTYS anticoquelucheux.

APLEXIL, préventif des complications pulmonaires de la grippe.

(Voir chacun de ces mots)

Mode d'emploi et Posologie. — Injections sous-cutanées ou intra-musculaires d'une ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

Littérature sur demande :

Les Etablissements POULENC Frères
86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

(Procédés RANQUE et SENEZ)

Prophylaxie. — Vaccinothérapie

VACCIN : Antityphoïdique.

- Antistaphylococcique.
- Polyvalents I, II, III et IV.
- Pneumo-Streptococcique.
- Anti-Coquelucheux.
- Antistreptococcique.
- Anticolibacillaire.
- Antimélicoccique.
- Antiméningococcique.
- Antidysentérique.
- Anticholérique.

Injectables en injections sous-cutanées.

Polyvaccins - Pansements

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX :

DEFFINS, 40, Faubourg Poissonnière — PARIS

LABORATOIRE MÉDICAL DE BIOLOGIE

16, Rue Dragon — MARSEILLE

HAMELIN, 31, Rue Michelet — ALGER

CAMBE, passage de Corinthe — TUNIS

Pour Littérature et Échantillons :

16, Rue Dragon — MARSEILLE

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

VACCINS MICROBIENS CURATIFS

Immunizols Grémy en ampoules injectables

(Voir : Immunizols)

Médicaux

- 10 Furunculose.
- 11 Entérite.
- 12 Appendicite.
- 13 Asthme.
- 14 Asthme des foins.
- 15 Eczéma. — Psoriasis.
- 16 Bronchites chroniques.
- 17 Rhumatisme.
- 19 Acné.
- 22 Typhoïde.
- 23 Grippe.

Chirurgicaux

- 30 Ostéomyélite.
- 31 Abscès chauds. Plaies suppurées.
- 34 Gangrène.

Génito-Urinaires

- 18 Uréthrites.
- 40 Cystites. — Pyélonéphrites.
- 41 Métrites.

Auriculaires

- 50 Otites. — Sinusites. Mastoïdites.

Dentaires

- 70 Pyorrhée alvéolo-dentaire.

IMMUNIZOLS GRÉMY bouillon - vaccins

pour pansements vaccinaux I. B.-V. Grémy
en applications locales

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 10 Furunculose et toutes Staphylococcies 24 Streptococcies. 25 Pneumococcies. 31 Abscès chauds. | <ul style="list-style-type: none"> 35 Ulcères variqueux. 36 Brûlures infectées. 41 Métrites. 50 Otites, Sinusites, Mastoïdites opérées. |
|--|---|

IMMUNIZOLS GRÉMY en comprimés lentoculaires

avec pilules adjuvantes de bile
à administrer par voie buccale.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 10 Furunculose. 11 Entérite. 12 Appendicite. 13 Asthme. 14 Asthme des foins. 15 Eczéma. — Psoriasis. 18 Uréthrites. 22 Typhoïde. | <ul style="list-style-type: none"> 31. Abscès et plaies infectées. 40 Cystites. — Pyélonéphrites. 41 Métrites 70 Pyorrhée alvéolo-dentaire. |
|---|---|

VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé)

Perles. — 3 à 6 par jour avant les repas; ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux heures après un léger repas.

Propriétés. — Antispasmodique énergique et puissant sédatif du système nerveux, régulateur de la circulation et de la respiration.

Le flacon : 8 fr.

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie
19, Avenue de Villiers — PARIS

VALÉRAL PUY

Liquide ou capsules

Bromovalérianate sodique alcalin.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures, tolérance absolue, odeur, saveur agréables, action fidèle et soutenue, pas d'accoutumance.

Véritable spécifique des Névroses convulsives douloureuses spasmodiques, Phobies, Névralgies, Insomnies, Crampes.

Dose. — Une cuillerée à soupe ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 2 à 3 cuillerées à soupe dans 1/2 verre d'eau sucrée par jour, dont une le soir.

Envoi littérature.

Laboratoire PUY
GRENOBLE

VALÉRIANATE GRIGNON

à odeur dissimulée

Composition. — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

Forme. — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane étant absolument masquée.

Prop. therap. — Antinerveux, antispasmodique.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuill. à café par jour.

Pharmacie GRIGNON

2, Rue Duphot — PARIS

VALÉRIANATE PIERLOT

Le VALÉRIANATE PIERLOT,
liquide ou en capsules

RESTE TOUJOURS et MALGRÉ TOUT
l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de la valériane officinale.

H. RIVIER

Pharmacien de 1^{re} Classe

Successeur de LANCELOT & C^{ie}

26 et 28, Rue Saint-Claude

PARIS

VALÉRIANOSE GIGON

Composition. — Extrait de valériane fraîche stérilisée et pepsine.

Forme. — Pilules glutinisées.

Indications thérapeutiques. — Sédatif du système nerveux, Antispasmodique, Antinévralgique.

Mode d'emploi et doses. — 4 à 6 pilules par jour. Solubilité dans l'intestin.

PEPTO-VALÉRIANE

Solution sans odeur d'extrait de valériane fraîche stérilisée et pepsine.

De 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures

Laboratoires du D^r André GIGON

7, Rue Coq-Héron — PARIS (1^{re})

VALÉROBROMINE LEGRAND

Liquide : Dosé à 0,50 egr. de bromovalérianate de soude par cuill. à café.

Capsules enrobées de gluten : Dosées à 0,25 egr de bromovalérianate de magnésie par capsule.

Propriétés. — Sédatif anti-nerveux. Exerce une action énergique sur les centres nerveux. Diminue et abolit leur excitabilité réflexe.

Indications. — Toutes les indications des bromures avec plus d'activité et sans en avoir les inconvénients.

Dosés. — *Liquide :* 2 à 6 cuill. à café par jour dans un peu d'eau sucrée. *Capsules :* 4 à 12 capsules par jour.

DARRASSE Frères

13, rue Pavée — PARIS

VALÉROMENTHOL

Préparation à base de *suc frais de valériane*
combiné à l'éther mentholique
de l'acide valérianique

Prop. thérap. — Tous les avantages des bromures sans aucun de leurs inconvénients. Calmant par excellence. Antispasmodique sûr. Antidote de la douleur, des troubles nerveux et des états pathologiques de la neurasthénie.

Indic. thérap. — Neurasthénie, Hystérie, Insomnie, toutes Affections nerveuses.

Mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

Laboratoire du VALÉROMENTHOL

108, Faubourg Saint-Honoré, — PARIS

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques est devenu le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du médecin.

VANADARSINE GUILLAUMIN

GOUTTES

Composition. — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

Propriétés. — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence le teint redevient frais.

Indications. — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme et les leucémies.

Mode d'emploi. — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler dont elle n'a pas les inconvénients : V à X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

VANADARSINE GUILLAUMIN

AMPOULES

(Sérum Vanadarsiné)

Composition. — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cent. cube.

Propriétés. — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

Indications. — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Injecter 1 à 2 cent. cubes par jour ou tous les deux jours.

Enfants : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos recommencer le traitement si nécessaire.

Laboratoires André GUILLAUMIN
13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

VANADINE CHEVRIER

Composition :

Solution d'acide vanadique chloratée.

Propriétés :

Stimulant de l'appétit ; sans action sur l'estomac.

Indications :

S'emploie dans la pré tuberculose, la tuberculose, l'anémie, la neurasthénie et les affections de l'estomac.

Mode d'emploi :

Six à dix gouttes dans une cuillerée d'eau, avant le repas.

Docteur G. CHEVRIER

21, Faubourg Montmartre — PARIS

VANUCLÉOL

Composition. — Nucléophosphate de Vanadium strychnarsiné.

Formes pharmaceutiques. — 1° Ampoules ; 2° Gouttes.

Indications. — Oxydant par le vanadium, leucosthénique par les nucléines, le **VANUCLÉOL** s'emploie dans les cas d'*Asthénies, Surmenage, Tuberculose et Pré tuberculose, Anémie, etc...*

Mode d'Emploi. — Douze injections journalières pour les ampoules et vingt gouttes par repas, pour la forme goutte.

Echantillon et littérature sur demande

LABORATOIRES LACROIX

29-31, rue Philippe-de-Girard - PARIS, x^e

VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes,
numérotés de 1 à 5.

Doses et Mode d'emploi. — Avaler, sans les croquer, un ou deux Comprimés avant le repas du soir, en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le 6^e jour, et continuer la variation.

Prop. Thér. — Action laxative toujours identique — Jamais d'accoutumance ni d'irritation — Tolérance parfaite — Innocuité absolue.

Laboratoire de la VARILAXINE

164, Rue Saint Honoré — PARIS

VASOLAXINE

Huile de Vaseline pure

Dose :

Adultes : 1 cuillerée à soupe en se levant à jeun et le soir en se couchant.

Enfants : 1 cuillerée à café.

Aromatiser, si jugé nécessaire, avec menthe, citron, cognac, etc.

Indications :

Constipation, Entérites, Appendicites chroniques, Hémorroïdes.

Le flacon, 8 fr. 50

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

VEINARGYRE

Compos. — Chaque ampoule contient 1 cgr. de cyanure de Hg dans un sérum spécial.

Avertissement. — Ne doit être employé que par le médecin et en inject. intra-veineuses.

Indications. — Traitement intensif des paralysies et de la méningite spécifique (sous toutes leurs formes cliniques).

Posologie. — Injecter un centim. cube tous les deux jours, par séries de dix injections. Injecter lentement. Rapprocher ou espacer les inject. ou prolonger les séries selon les indications cliniques. Suspendre quelques j. en cas d'intolérance (stomacale, intest., etc) En inject. intra-musculaires, employer le Musculargyre.

LABORATOIRES RAFEY

Raoul FEIGNOUX, pharm. 1^{re} classe
29, rue des Jardiniers. Montreuil (Seine)

VEINOFLUINE

Régulateur de la Circulation Veineuse.

Composition. — Extraits mous stabilisés de Cyprès et de Marron d'Inde. Extraits mous d'*Hamanidés Virginica* et de *Viburnum Prunifolium*.

Présentation. — Gouttes.

Prop. thérap. — Régularisation de la circulation veineuse, augmentation de la résistance de la paroi vasculaire et disparition des réactions douloureuses liées aux phénomènes congestifs.

Indications. — Toutes les congestions, dilatations et inflammations veineuses: varicels, varicocèles, hémorroïdes, phlébites. Les troubles utérins de la ménopause ou de la puberté.

Posologie et Mode d'emploi. — Trois fois par jour, avant les repas, par prises de XXX gouttes, dans de l'eau, du vin ou une infusion.

Pharmacie NEUVIELE

239, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica, Marrons d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

Indications. — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques, Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

Doses. — Trois comprimés avant les repas de midi et du soir.

P. LEBEAULT & C^{ie}

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (3^e)

VÉRIANE BURIAT

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 0 gr. 12 amide barbiturique diéthylé et 1 gr. Valériane fraîche et INODORE.

Indications. — Hypnotique fidèle, inodore et sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats. Sommeil calme, réveil normal.

Posologie. — Comme sédatif : 2 à 5 cuillerées à café espacées dans les 24 heures.

Comme hypnotique : 2 à 5 cuillerées à café 3 heures avant le moment du sommeil, dans infusion ou eau sucrée.

Flacon de 125 cc.

Laboratoire BURIAT

30, rue Pergolèse — PARIS

VERONIDIA BUISSON

Solution de diéthylmalonylurée associée à l'extrait de *Passiflora incarnata* dans un véhicule synergique et agréable au goût. Chaque cuill. à soupe de solution ou chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de principe actif.

Prop. Thér. — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse dans toutes ses manifestations : Névroses diverses, Palpitations, Phobies, Insomnies, Névrose d'angoisse, etc.

Dose. — 2 cuill. à café comme antispasmodique dans le courant de la journée. — 1 à 2 cuill. à soupe ou comprimés comme hypnotique, le soir au coucher.

Etablissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres — PARIS

R. C. Seine 147.623

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

VERRULYSE

Composition. — A base de glycérophosphates (Phosphate vital) de chaux, fer, manganèse, magnésio, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

Formes. — Poudre légèrement comprimée en petits cachets.

Boîte de 60 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.

Demi-boîte de 30 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de moins de 8 ans.

Dose et mode d'emploi. — *Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.* — 1 cachet par jour pendant 60 jours, au début d'un repas (toujours le même de préférence).

Pour les enfants de moins de 8 ans. — 1 cachet tous les deux jours (30 cachets en 60 jours) ou mieux : 1/2 cachet par jour délayé dans une cuillerée de potage ou tout autre aliment, pendant 60 jours.

Propriétés :

1° **Effet local.** — Au bout de 10 à 15 jours, les verrues prennent une teinte rosée sur le pourtour, et deviennent parfois le siège d'une légère démangeaison ; puis elles grossissent un peu, reprennent ensuite leur couleur et leur grosseur normales et disparaissent dans le mois qui suit la fin du traitement, par élimination ou par résorption progressive, sans laisser de cicatrices. En cas de guérison dès les premières semaines, comme cela se produit quelquefois, le traitement doit néanmoins être continué jusqu'au bout, afin d'éviter les récidives.

2° **Effet général.** — Reconstituant. Amélioration très nette chez les enfants, de l'entrain, de l'appétit, du teint.

Indications. — Traitement spécifique des verrues.

Paraît exercer une action favorable contre d'autres productions épidermiques, pour lesquelles une expérimentation plus étendue est en cours.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé (et même renouvelé) sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 6 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles ou de tumeurs malignes).

Etablissements JACQUEMAIRE

M. MIGUET, Docteur en Pharmacie

VILLEERANCHE (Rhône)

VERTICURINE

Composition. — Silicate de soude, chimiquement pur.

Action. — Hypotensive-anti-athéromateuse déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

Indications. — Artério-sclérose. Angine de poitrine. Troubles cérébraux. Otite scléreuse. Hypertension. Aortite. Bourdonnements. Sclérose cardiaque. Présclérose. Vertiges.

Formes et doses. — 1^o *Liquide* : chaque cuill. à soupe représente un gr. de silicate assimilable. Dose : 1 cuill. soupe aux 2 principaux repas ; 2^o *Comprimés* : chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose : 2 comp. à chacun des princip. repas.

Nous recommandons de préférence la solution

Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1^{re} cl.

3, rue de Suresnes. — GARCHES (S.-O)

VIN DE BAUDON

Antimonio-phosphaté

Compos. — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison organique et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif.

Avantages. — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

Ind. thérap. — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

Posol. — Un verre à madère p. les adultes et un verre à liqueur p. les enfants à prendre au moment des repas ; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 p. j.

Laboratoire VAUDIN ET GUILLAUMIN
Doct. en Pharm. 12, r. Charles-V, PARIS

VIN DE BUGEAUD

Toni-nutritif

Malaga vieux - Quinquina - Cacao

Indications :

Faiblesse générale, Anémie,

Surmenage, Etats consomptifs, Diabète,

Convalescence des Maladies aiguës,

Anémie palustre, etc.

Dose :

Un verre à madère aux deux principaux repas.

P. LEBEAULT & C^{ie}

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (3^e)

VINAIGRE DE PENNÈS

Composition. — Vinaigre à base d'acides benzoïque, thymique, salicylique.

Propriétés. — Antiseptique puissant, non caustique, d'odeur agréable.

Indications. — Pansement des plaies, Morsures, Piqûres, Prophylaxie des maladies infectieuses, Soins hygiéniques de la bouche et des dents, Injections vaginales quotidiennes.

Désodorisant des résidus et des selles.

Mode d'emploi. — Le VINAIGRE DE PENNÈS s'emploie exceptionnellement pur (Morsures, Piqûres), et le plus souvent étendu de 5 à 30 fois son volume d'eau.

LABORATOIRES PENNÈS ET TOULET,

3, Rue de Latron — PARIS

VIOXYL MOUNEYRAT

Puissant accélérateur
de la nutrition générale

Indications. — Asthénies diverses, Cachexies, Convalescences, Maladies consomptives, Anémie, Chloro-anémie, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose, Neurasthénie, Asthme, Diabète.

Forme. — Elixir.

Posologie. — *Adultes* : Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours, porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

VITAMINA

Composition. — Aliment ferment à base de Vitamines indispensables à la vie.

Action. — Rétablit l'équilibre vital par son action sur le système nerveux, sur l'énergie électrolytique, sur les glandes à sécrétion interne, sur les ferments et les diastases.

Indications. — Toutes les affections dues à la carence vitaminiée.

Nourrissons au biberon, enfants en période de croissance, convalescents, vieillards déprimés, neurasthéniques, etc.

Mode d'Emploi. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour. — *Nourrissons et Enfants* : 2 à 3 cuillerées à café par jour, à prendre soit dans une tasse de lait ou d'eau, soit mélangé à n'importe quel aliment solide ou liquide : chocolat, riz, confitures, etc...

Une seule précaution : Ne jamais porter "Vitamina" à une température supérieure à 50°.

LABORATOIRES DU DOCTEUR CHAPELLE

8, Rue Vivienne — PARIS

VITAMINE ROGIER

VITAMINE B.

Indications. — Diabète. Maladies par carence. Troubles de la croissance. Boribéri.

Formes et Doses. — Comprimés. — 4 à 6 comprimés par 24 heures.

L'influence passagère de l'insuline peut être prolongée par un régime équilibré.

D'autre part, l'adjonction à ce régime, soit de Vitamine B, soit de Lévéulose, ou du mélange de ces deux corps permet d'espacer les injections d'insuline et de rendre mieux opérante une même dose de cette substance.

(Communication faite à l'Académie des Sciences, séance du 22 Octobre 1923).

Littérature et échantillon sur demande.

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie

19, Avenue de Villiers — PARIS

VITAMYL

Extrait frais et concentré

de toutes les VITAMINES conservées vivantes

Indications. — Spécifique des états pathologiques dus au manque de VITAMINES.

Scorbut infantile. Croissance ralentie. Développement incomplet. Rachitisme. Troubles de la Grossesse et de la Lactation. Dyspepsie des Régimes. Convalescence. Sénilité précoce. Par les levures Sélectionnées qu'il contient le Vitamyl est un spécifique de la Furunculose et des Eczémas.

Mode d'emploi. — Aux enfants au-dessous d'un an, 1 cuillerée à café par jour suffit.

Aux enfants de 1 an à 5 ans, 2 cuillerées à café par jour.

Aux adultes, 1 cuillerée avant chacun des trois repas.

Laboratoire des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

XEMADERM

Composition. — Pommade à base de corps gras entièrement absorbés par la peau.

Aspect. — Crème blanche d'odeur agréable.

Propriétés. — Calme les démangeaisons et favorise la reconstitution des tissus.

Indications. — ECZÉMA et toutes les affections para-eczémateuses : acné, impétigo, pityriasis, psoriasis, séborrhée, etc...

Mode d'emploi. — En applications matin et soir.

Dans l'acné ponctuée, lotionner d'abord avec l'*Acnédermine* (solution décapante).

Laboratoire GILLOT

59, Rue de Châteaudun — PARIS

LA YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt

Composition. — Ferments bulgares sélectionnés, protégés, par un enrobage spécial, de l'action oxydante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

Formes. — Dragées et granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale, et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

Posologie.

Nourrissons. — 1 à 2 cuill. à café p. j. Yaourtine granulée.

Enf. et Adultes. — Cas aigus : 2 à 4 cuill. p. jour Yaourtine granulée. Cas chroniques : 10 à 15 dragées par jour.

A prendre à jeun avec lait bouilli, 1 h. avant le repas.

L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1^{re} classe
16, r. St-Gilles, Paris-III^e, Tél.: Archives 45-00

YOGHOURT LACTELLA

Composition. — Cultures liquides de ferments lactiques bulgares dans du lait frais exempt de microbes malsains, complet ou écrémé (à sucrer avant usage).

Forme. — En demi-litre et en boîte.

Indications. — *Yoghourt ordinaire.* Adultes : Auto-intoxication intestinale, artério-sclérose, néphrites. — Nourrissons : Succédané temporaire du lait de vache dès la naissance, complément du sein maternel insuffisant, aliment de transition du sevrage. Supprimez le biberon. — *Yoghourt maigre.* Aliment exclusif de tous les fébricitants, spécifique des affections hépatiques et gastro-intestinales, aiguës ou chroniques (ictères, fièvre typhoïde, entéro-colites, eczémas).

Adresses. — Yoghourt ordinaire, Yoghourt maigre chez tous les Pharmaciens et au siège social :

rue du Flocon, TOURCOING

Téléph. : 12-55

Agence : 89, rue Turbigo, PARIS. Tél. Archives 50-03

ZARYL (ancien MYRRH)

Procédé André LANCIEU

Composition et présentation. — Essences d'ambrette, ambrette, myrrh, styrax, rose, orange douce, catilysées et fixées sur hydro-celluloses provenant du maïs et du palmier nain. La libre est distribuée en cigarettes.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatives, analgésiques, procurent le sommeil calme et réparateur, antispasmodiques, décongestives, désodorisantes, entérianes, antiseptiques.

Posologie et mode d'emploi. — 4 à 8 cigarettes par jour, si possible avaler la fumée. La fumée est un véritable colloïde gazeux, agent thérapeutique de premier ordre.

Indications. — Toutes maladies congestives des voies respiratoires, extinction de la voix, asthme, grippe, bronchite, toux coquelucheuse, trachéite, laryngite, entarrhe, rhume des foies, coryza, sinusite, ozène, céphalée.

Gazés, et toutes professions dans lesquelles on respire des poussières.

Aucune contre indication ; ne donne ni vomissements ni nausées. Inoffensives pour le rein, le foie, le cœur. Pas d'incompatibilité médicamenteuse.

GROTARD, docteur en pharmacie

23, Rue Jean-Jacques Rousseau. — PARIS

ZIMBYL

Procédé André LANCIEU

Composition et présentation. — Ethyl. Cin. Aminoforme, très soluble dans l'eau et distribué en ampoules de 3 cc. tyndalisées (Cr. Académie des Sciences 1924).

Propriétés thérapeutiques. — Augmentation de poids, diminution des sueurs profuses, de la température, de l'oppression, reprise du travail et amélioration de la formule leucocytaire. Injections indolores se résorbant rapidement, ne produisant aucun choc. La Cin, éthyl. formine se dissocie dans l'organisme en éléments bactéricides, éliminés par les reins et les voies respiratoires.

Fosologie et mode d'emploi. — 3 cc. intra-musculaire tous les 2 jours par séries de 10 injections (repos 10 jours) 2 séries suffisent. Chez les enfants de plus de 5 ans, un cc. tous les deux jours intra-musculaire (10 injections).

Composé complètement atoxique, point d'accoutumance, n'agit ni sur le foie, intestins, reins ou cœur Pas d'incompatibilité médicamenteuse.

Indications. — Bronchites, anémies, cachexies, bacillozes rénales, préventif des infections tuberculeuses.

F. GROTARD, Docteur en pharmacie

23, Rue Jean-Jacques-Boussieu — PARIS

ZOHOL

Prop. Thér. — Reconstituant.

Indications. — Anémie, Surmenage, Phosphaturie, Convalescences.

1^{re} Forme : En granulés.

Composition :

Hypophosphite de chaux	0 gr. 06
— fer	0 gr. 06
— manganèse	0 gr. 06

Mode d'emploi. — 1 cuill. à café à chacun des principaux repas.

2^e Forme : En ampoules.

Composition :

Hypophosphites composés	0 gr. 18
Sulfate de strychnine	1/4 de mgr.
Eau physiologique Q. P.	2 cm ³

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

Laboratoires Réunis

11, Rue Torricelli — PARIS (17^e)

ZOMO-MUSCULOSINE BYLA (sèche)

(Musculosine concentrée)

Suc de Viande crue de Bœuf, concentré à froid, exempt de tous germes nocifs et entièrement soluble.

Propriétés thérapeutiques. — Antibacillaire, toni-nutritif, excitant physiologique.

Indications. — Convalescence, Anémies, Neurasthénie, Tuberculose, etc...

Dose et mode d'emploi. — Deux cuillérées à potage par jour, dans une tasse de bouillon à peine tiède.

Les Etablissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

R. C. Seine 71895

ZYMATINE LESCÈNE

Composition. — Galatocymases, Vitamines associées aux carbonophosphates minéralisants.

Propriétés. — Elle ne change pas la saveur du lait dont elle assure la conservation et la parfaite tolérance.

Fait disparaître les troubles digestifs et la constipation. Le meilleur sauveur dans l'hyperacidité stomacale. Elle supprime les fermentations secondaires.

Indications. — *Enfants* : Prophylaxie de la gastro-entérite, Maladies de nutrition aiguës ou chroniques. Constipation Rachitisme.

Adultes : Constipation, Affections du tube digestif, Dyspepsies avec hyperacidité, Ulcères de l'estomac.

Doses. — *Enfants* : 1 centigramme par gramme de lait pur ou 2 cuillérées à café par litre de lait bouilli et refroidi ; agiter fortement pour mélanger. Donner tiède en agitant de temps en temps, à une température ne dépassant pas 50°.

Adultes : 1 à 2 cuillérées à café dans un demi-verre d'eau avant ou après les repas.

Laboratoires LESCÈNE

à LIVAROT (Calvados)



3^e Partie

NOMENCLATURE NOMINALE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES,

avec noms et adresses
de leurs fabricants.

A

Acépilline Rambaud	12, rue Beautreillis, Paris.
Acésine	Lab. A. GUILLAUMIN, 13, r. du Cherche-Midi, Paris (7°).
Achanel	USINES DES AUBRAIS, 286, faub. Bannier, Orléans.
Acétylarsan	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Acrisol Clérambourg	4, rue Tarbè, Paris.
Adrémine	MIALHE, 8, rue Favart, Paris
Adrénaline Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris
Adrénocalcine	2, rue Courage, Granville (Manche).
Adrénophyséine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Adréopituine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris
Adrépatine	Lab. LALEUF, 49, avenue Lamotte-Picquet, Paris.
Açaryl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Agémensine Ciba	1, Place Morand, Lyon.
Agénol Cognet	43, rue de Saintonge, Paris.
Aïrol Roche	21, place des Vosges, Paris.
Ahésol Muzi	ROUSSY, à Sarlat (Dordogne)
Alcoolature d'Aconit Ecalle	BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Aldogène Carteret	15, rue d'Argenteuil, Paris.
Alepsal Genèvevriér	2, rue du Débarcadère, Paris.
Algalliment	47, rue Colbert, Tours.
Algarine Nyrdhal	20, r. La-Rochefoucauld, Paris
Algarol	71, rue du Commerce, Paris.
Algatan	Laboratoire de l'Antidol, 40, rue Condorcet, Paris.
Algoecratine Lancosme	71, Avenue Victor-Emmanuel III, Paris.
Algo-Digestine	PONCET, Av. du Pont-Neuf, Limoges.
Algolane Poulenc	92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Algyrène Loudenot	106, av. du Boule, Neuilly-s-S.
Alibourine	Labo. B. K. A. Belfort.
Aliment Tinardon	Labor. OBERLIN, 17, rue Cadet, Paris.
Allocaine Lumière	Cours de la Liberté, Lyon.
Alloval Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Aloysine Gouzène	139, rue de Paris, Pantin.
Alucol	WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
Alunozal	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Amandol	DURET & RÉMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.

Ambrine	48, b. La - Tour - Maubourg, Paris.
Amibiasine	27, rue Miromesnil, Paris.
Amidal	Lab. BEAUGONIN, 4, pl. des Vosges, Paris.
Ampoules bi-iodure Hg. Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Ampoules Boissy	32 bis, bd d'Argenson, Neuilly
Ampoules Churchill	SWANN, 12, rue Castiglione, Paris.
Ampoules de Digalène	HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris.
Ampoules Dubé	MILLOT, 54, rue Bienfaisance, Paris.
Ampoules Guillaumin	168, b. Saint-Germain, Paris.
Ampoules de Pantopon	HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris.
Ampoules Reipar	DRAPIER, à Audincourt.
Amylodiastase Thépénier	2, rue Clapeyron, Paris.
Analgène	J. TINARDON, 17, rue Cadet, Paris.
Anapeptone Vassal	28, r. Hôpital Militaire, Lille.
Anaquinine Lescène	à Livarot (Calvados).
Anasepsine J. Murair	41, r. d. Francs-Bourgeois, Paris.
Androstine Ciba	1, place Morand, Lyon.
Anestile Benqué	47, rue Blanche, Paris.
AnGINE	MAYOLI, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Angiolympe	4bis, rue Hébert, Courbevoie.
Angiosthéline	DURET & RÉMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Aniodol	40, rue Condorcet, Paris.
Antacidol	DURET & RÉMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Antalgel Dalloz	13, boul. de la Chapelle, Paris
Anthema	Etab. POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris
Anthraxone	Institut de Microbiologie, Sarrebrück.
Antialgès Christiaens	à Reims.
Anti - asthmatiques du Dr Cléry	Labo. du Dr CLÉRY, 53, bd. Saint-Martin, Paris.
Antiasthme Bengalais	FAGARD, 44, rue d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine.
Antigastralgique Winckler	MIDY & C ^e , 4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Antigrippine Midy	MIDY & C ^e , d ^e
Antikamnia	5, rue de la Paix, Paris.
Antimucose Mariani	41, boul. Haussmann, Paris.

Antiphlogistine	116, r. de la Convention, Paris
Antiphi	CAPIN à Roquefort (Landes)
Antiphymique Vadam	Labo. L. G. TORAUDE, 22, rue de la Sorbonne, Paris.
Antipyrine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Antirrhoïde Bélières	19, rue Dronot, Paris.
Antiurique de Contrexéville	286, faub. Bannier, Orléans.
Antodyne Pouleuc	92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Antonal	Lab. CARESMEL, 5 et 7, rue Henry-Greville, Angers.
Apusol	Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
Apaludel	AUCLAIR, à Aigurande (Indr.)
Aphloïne	Etab. TROUETTE-PERRET, 15, rue des Immeubles-industriels, Paris.
Apiel Briand	DEGLOS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
Apieline Chapoteaut	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Aplexil	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Apocynine du Dr Deschamps	LALEUF, 49, avenue Lamotte-Picquet, Paris.
Aquintel	Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
Archésine Trouette-Perret	15, rue des Immeubles-industriels, Paris.
Arhema Gallier	36, boul. du Montparnasse, Paris.
Argent colloïdal Nyrdhal	20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Arhéol Astier	45, rue du Dr-Blanche, Paris.
Arhine Lambiotte Fr.	3, rue d'Edimbourg, Paris.
Aristarçol	SCHAERER, 154, boulevard Haussmann, Paris.
Aromalt	139, rue des Pyrénées, Paris.
Arquéritol	LESURE, 70, r. du Bac, Paris.
Arrhépal Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Arrhénuclène Bergevin	à Chateaudun (Eure-et-Loir).
Arsenic Organique Glasser	COIRRE, 79, rue du Cherche-Midi, Paris.
Arséniode	BURIAT, 30, rue Pergolèse, Paris.
Arsenion Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Arsénobenzol Billen	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

Arseno Fer Henry	Lab. Henry, 39, r. de Selessin, Liège.
Arsiodyl Chassaigne	à Rufec (Charente).
Arsiquoine Lemaitre	12, rue Vavin, Paris.
Arsycodyle Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Arsylène Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Arsynal Legrand	GREMY, 14, r. de Clichy, Paris
Artério-Sérum Vin-cardi	VIGUIER, 42, av. Borriglione, Nice.
Arthri-sel	BOILLOT & C ^e , 9, rue Saint-Paul, Paris.
Arthritose	Lab. du MARINOL, à Dieppe (Seine-Inférieure).
Arzonyl	GARDE, 143, rue Guillotière, Lyon.
Ascéine	Lab. CIBA, 1, place Morand, Lyon.
Asciatine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Ascoléine Rivier	26, rue Saint-Claude, Paris.
Aspirine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Aspirine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Asquirrol Poulenc	92, r. Vieille-du-Temple, Paris
Asthmoly sine	Lab. G. MIESCH, 228, boul de la Villette, Paris.
Asthmer	GOBERT, 88, av. J.-B. Clément, Boulogne-sur-Seine.
Asthmylese	Labo. TAETZ, 2, rue Lesdiguières, Paris.
Atophan Cruet	13, rue des Minimes, Paris.
Atoquinol Ciba	1, place Morand, Lyon.
Atoxyl Poulenc	92, r. Vieille-du-Temple, Paris
Atural Poulenc	id.
Aurion Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Avanazol Couturieux	id.
Azipol Thévenot	21, rue des Roses, Dijon.
Azetyl	50, rue Rennequin, Paris.
Azufrol Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Azym	PARET, 52, rue Ste-Cécile, Marseille.

B

Babutyrese	SOCIÉTÉ LACTELLA, 59, b. Gambetta, Tourcoing.
Backérine	Lab. BEAUGONIN, 4, pl. des Vosges, Paris.
Bactioxyne	USINES CHIMIQUES DU PECQ, 39, r. Cambon, Paris.

Bain Carré	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
Bains du Dr Deschamps	49, avenue Lamotte-Piequet, Paris.
Bains de Pennès	3, rue de Latran, Paris.
Balsamydol	JOURDIN, 10, r. Washington, Paris.
Balsamol Leseène	à Livarot (Calvados).
Barkyl	30, rue Bobillot, Paris.
Baume Agerça	30, rue Bobillot, Paris.
Baume Arema	MAYOLI, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Baume Baissade	St-Menet, près Marseille. (Bouches-du-Rhône).
Baume Benqué	16, rue Ballu, Paris.
Baume Delacour	ROGIER, 19, av. de Villiers, Paris.
Baume du Dr Gigon (à Pulmarène)	7, r. Coq-Héron, Paris.
Baume Lartigol	FUMOUBE, 73, faub. Saint-Denis, Paris.
Baume Marta	BONNAURE à Alais (Gard).
Baume Rhodia	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Baume Suelta	Lab. FOURIS, 13, rue Lacharrière, Paris.
Baume Todaw	CORDIER, Parthenay (Deux-Sèvres).
Beef Laveix	G. HOUE, 5, av. Victoria, Paris.
Benzhermyl	AGUETTANT, 38, quai Fulchiron, Lyon.
Béatol	LABORATOIRES RÉUNIS, 21, r. Th.-de-Banville, Paris
Bellefolline Sandoz	3 et 5, rue de Metz, Paris.
Benzoate de Naphтол	FRAUDIN, 4, aven. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
Benzoealypol	GOUDAL, 213, rue St-Honoré, Paris.
Benzo-iodhydrine	36, rue de Paris, Colombes (Seine).
Brucl	BACCÀVIN, 38, rue Albouy, Paris.
Benzolaetine	25, rue de Sévigné, Paris.
Benzo-Lactol	2, rue du Champ-de-Mars, Reims.
Benzo phosphine	FALCOZ, 9, rue Boissonnade, Paris.
Christiaens	MARC & C ^e à Courpière (Puy-de-Dôme).
Benzo-Ringyl	HAUTDIDIER, 37, r. Galilée, Paris.
Benzylal	
Benzylol	

Bestel du Dr Lavené	Rennes (L.-et-V.).
Bétul-Cl Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Bia	Lab. MÉTADIER, 55, rue Nationale, Tours.
Bibromure de Hg	17, boul. Haussmann, Paris.
Vicario	
Bi-iodures Cros	19, rue du Bac, Paris.
Bi-iodure de Hg.	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Midy	
Bi-iodure Souffron	Etablissements BUISSON, 157, rue de Sévres, Paris.
Biléyl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Biliase Raby	RABY à Asnières (Seine).
Bilifluine	BEAUGONIN, 4, place des Vosges, Paris.
Biliel Bouty	3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
Bilirhéine	MONDOLAN, 11, place des Vosges, Paris.
Binol Roger	177, boul. St-Germain, Paris.
Biscels Fraudin	4, av. Desfeux, Boulogne-s-S.
Biscalcine U. T. A.	Lab. d'Opothérapie U. T. A. Liège.
Biscalcose Chevretin	Laborat. CHEVRETIN & LE- MATTE, 5, r. Ballu, Paris.
Biecrine	PHILIPPE, 122, faubourg St- Honoré, Paris.
Biedynamine	Lab. OBERLIN, 17, r. Cadet, Paris.
Biogastrine	BERTHIOT & C ^e , 1, boul. Henri IV, Paris.
Biogénol Demastes	à Vienne (Isère).
Biogésine Rochard	à Lorient.
Bioactyl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Biopherine Girard	48, rue d'Alsia, Paris.
Bioposphine	DEPOUILLY au Creusot.
Biesine Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Bietose Ciba	1, place Morand, Lyon.
Biezel	CAILLAUD, 25, rue Drouot, Paris.
Biphosphate de chaux	Etab. JACQUEMAIRE, Ville- franche (Rhône).
Bircol Mauchant	14, r. de Birague, Paris.
Bismbydral	LANCOSME, 71, av. Victor- Emmanuel III, Paris.
Bismuth Desleaux	id.
Bismupaine	BÉRAL, 194, rue de Rivoli, Paris.
Bismuth	PERROUD, 7, r. des Archers, Lyon.
Bismuth léger Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Bismuthéïdel	ROBIN & C ^e , 43, r. de Poissy, Paris.

Bismuthés Meurice	68, r. Berkendael, Bruxelles.
Blastéase	HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris à Villefranche (Rhône).
Blédine Jacquemaire	à Villefranche (Rhône).
Blennosine	INSTITUT de MICROBIOLOGIE, Sarrebruck.
Blucine	Régis MEILLER, à Dunières (Haute-Loire).
Blutine	MAUCHANT, 14, rue de Birague, Paris.
Boldine Goudé	9, rue Dieu, Paris.
Bolde-Gmel	27, faub. Montmartre, Paris.
Bolde-Verne	à Grenoble (Isère).
Bolde-Lactol	H. SALLES, 12 bis, avenue des Gobelins, Paris.
Boldeine Eparvier	26, Grand Rue St-Clair, Lyon.
Boléase Monal	Laboratoires MONAL & C ^e , 6, rue Daubigny, Paris.
Bonbons vermifuges Royer	LAUMONIER, 225, rue Saint-Martin, Paris.
Bornyval	L. ROHAIS & C ^e , 2, rue des Lions, Paris.
Boricine Meissonnier	LOGEAIS, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Bore-borax Vigier	12, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
Borealeyl Ibévenot	21, rue des Roses, Dijon.
Berosodine Lamyère	SESTIER, 9, cours de la Liberté, Lyon.
Berestyröl	MAYOLI, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Bes Cuit	FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Bougies Américaines	LOGEAIS, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Bougies Chaumel	FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Bougies Reynal	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
Bourazar	BONMAURE à Alais (Gard).
Bov'Cardiac	FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Bov'Bilie	id.
Bov'Hépatie	id.
Brides (tablettes, pilules de)	RICARDON, 17, rue Rochechouart, Paris.
Bromalbin Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Broméine Montagu	49, boul. Port-Royal, Paris.
Bremiasse Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Bromidine Henry	Lab. HENRY, 39, rue de Selessin, Liège.
Bromocarpine	OLIVIERO, 87, rue Denfert-Rochereau, Paris.

Bromogénéol Pépin	PÉPIN & LEBOUCCQ, à Courbevoie (Seine).
Bromomaisine Salle	4, rue Elzévir, Paris.
Bromène Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Bromevaleren Henry	Lab. HENRY, 39, rue de Selessin, Liège.
Bromure Laroze	ROHAIS & C ^e , 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
Bromure de Sodium du Dr Gigen	7, rue Coq-Héron, Paris.
Bromure Souffron	Etablissements BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Bronchitel Henry	39, rue de Selessin, Liège.
Bronchoplastre	CAVAILLÈS, 34, rue Turin, Paris.
Brunyl	BRUNEAU & C ^e , 17, rue de Berri, Paris.
Buctel Pâris	4, rue Lamotte-Picquet, Paris.
Bulgarine Thépénier	12, rue Clapeyron, Paris.

C

Cachets Boveil	14, rue Grenette, Lyon.
Cachets Céli	LANDES, à Gramat (Lot)
Cachets Charvoz	à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône).
Cachets du Dr Faivre	à Lyon.
Cachets Kapytan	BARDET, 76, rue de Sèvres, PARIS.
Cachets opothérapiques Byla	26, aven. de l'Observatoire, Paris.
Cachets Roche de Thiocol	HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris.
Cachets de gaïacalcine Latour	17, place des Vosges, Paris.
Cachets Tédaw	CORDIER, Parthenay (D.-S.)
Cacodylate Vigier	12, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
Cacodyle Gannon	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Cacodyle Phosphate vital Jacquemaire	à Villefranche (Rhône).
Cadéinol	LAFARGE, 45, boul. Lefèvre, Paris.
Cæcaline Gagnière	à Clermont-Ferrand.
Caféine Gondé	9, rue Dieu, Paris.
Calcéose Boillet	9, rue Saint-Paul, Paris.
Calciline	WATELET & C ^e , 25, rue Vanneau, Paris.
Calciphose	Lab. Berger, 14, rue des Pyramides, Paris.

Calcitine	DIGNE Fils à Préjus (Var)
Calce-céril	16, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, Paris.
Calcephore	6, r. Raoul-Berton, Bagnolet (Seine).
Calcozymase	LÉBOIME, 21, boul. Rochechouart, Paris.
Camphemol	Lab. CIBA, 1, place Morand, Lyon.
Camphoral Agneltant	36, quai Fulchiron, Lyon.
Capsules Bardet	76, rue de Sèvres, Paris.
Capsules Bonnefond	MONTAGU, 49, boulevard Port-Royal, Paris.
Capsules Bruel	36, r. de Paris, Colombes (S.)
Capsules Ceignet	43, rue de Saintonge, Paris.
Capsules Dartois	FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
Capsules de Genosan	ROHAIS & Co, 2, rue des Lion-Saint-Paul, Paris.
Capsules d'Ichtyol Vigier	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Capsules Pautau-berge	10, rue de Constantinople, Paris.
Capsules Raquin	FUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Capsules Sals	Lab. du TOPIQUE BERTRAND, Oullins (Rhône).
Capsules salolées	LACROIX, 31, rue Philippe-de-Girard, Paris.
Capsules Sérafen	9, rue de la Perle, Paris.
Capsules Taetz	Lab. TAETZ, 2, rue Lesdiguières, Paris.
Capsules de Terpinol	GONNON, 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
Carbochloryls	ALÉZARD, 70, rue Réaumur, Paris.
Carbolactyl	DENISOT, 19, r. de Fleurus, Paris.
Carbomagyl	TÉTARD à Beauvais (Oise).
Carbosanis	MONTAGU, 49, boulevard Port-Royal, Paris.
Cardibaïne	Lab. DEGLAUDE, 6, rue d'Assas, Paris.
Cardiotanic	GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
Carnine Lefrancq	FUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Cascara Alexandre	41, rue de Rome, Paris.
Cascara Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Cascarine Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Caseoline Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Cassitol	MAUCHANT, 14, rue de Bi-rague, Paris.

Catalysine du Dr Viquerat	FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
Cathodé	Labor. BRISSON & C ^e , 111, rue du Mont-Cenis, Paris.
Cédryl	Lab. IMMUNOS, 6, rue Ed. Valentin, Narbonne.
Cephœmétine	PUECH, 44, rue Gambetta, Blarritz.
Céréalose	Labor. ASTIER, 45, rue du Docteur-Blanche, Paris.
Cérébrine Fournier	49, boulev. Port-Royal, Paris.
Cérébroil	Lab. LEYSIN, 1 bis, rue Molitor, Paris.
Cérédine Loudenot	106, av. du Roule, Neuilly-s-S.
Céréel Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Céréossine	DEHAUSSY, 44, rue Inker- mann, Lille.
Cérinil	16, rue Ste-Croix-de-la-Bre- tonnerie, Paris.
Cervol	DENISOT, 19, rue de Fleurus, Paris.
Cethocal	1, rue du Val-d'Osne, Saint- Maurice (Seine).
Cétrarose Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Charbon granulé Fraudin	4, aven. Desfeux, Boulogne- sur-Seine.
Charbon naphtolé Fraudin	4, aven. Desfeux, Boulogne- sur-Seine.
Charbon Tissot	34, boulev. de Clichy, Paris.
Chélodine	BROCADET, 89, rue du Com- merce, Paris.
Chenanthol	HINGLAIS, à Epernay.
Chloral bromuré Dubois	DURIEZ, 20, pl. des Vosges, Paris.
Chloramine	FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
Chloréthyle Bengué	16, rue Ballu, Paris.
Chloridia	VERRIER & GUERNIER, 64, rue des Tournelles, Paris.
Chlorobacilline	52, r. de Boissy, St-Germain- en-Laye.
Chlorobyl	LABORATOIRES RÉUNIS, 21, rue Théodore-de-Ban- ville, Paris.
Chloro-Calcion	MICHEL, 22, rue des Ber- nards, Paris.
Chloroforme anes- thésique	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Chloroforme Lam- blotte Frères	3, rue d'Edimbourg, Paris.

Cholédol U. T. A.	Lab. d'Opothérapie, Liège.
Choléine Camus	DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.
Choléitoires Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Cholélyse Carheu	8, rue Jean-de-Bellay, Paris.
Choléo-Combretol	CAILLAUD, 25, rue Drouot, Paris.
Cholécholdine Thévenot	21, rue des Roses, à Dijon.
Choléckinase	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Choléolactol Daguin	5, rue des Remises, St-Maur (Seine).
Cholérène	Daniel BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Cigares Barral	FUMOUIZE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Cigarettes américaines Leroy	LANDRIN, 20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Cigarettes du Dr Cléry	53, boul. St-Martin, Paris.
Cigarettes Espic	20, rue Saint-Lazare, Paris.
Cinol	Lab. IMMUNOS, 6, rue Ed. Valentin, Narbonne.
Citrase	ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris.
Citraspirine	LACROIX, 22, boul. Sébastopol, Paris.
Citropalne	Dr FAYET, 304, rue Saint-Jacques, Paris.
Citrosodine Grémy	LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
Clonazone Daufresne	40, rue Thiers, Le Havre.
Cloranol	DUFFOURC, 58, rue Miro-mexnil, Paris.
Coagulène Ciba	1, place Morand, Lyon.
Coca Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Cocaïne Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Coccidal Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Cedocel	20, rue des Martyrs, Paris.
Cedeforme Bettu	35, rue Pergolèse, Paris.
Celchi-Sal Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Cellargel Midy	id.
Celchiflor Vial	8, rue Vivienne, Paris.
Cellébiases Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Celloïdes Amicros	Laboratoire des PRODUITS AMICROS, 5, rue Clauzel, Paris.
Celloïdes Clin	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Celloïdine	LALEUF, 49, aven. Lamotte-Piequet, Paris.

Celloïdegénine	Laboratoire CHAIX, 10, rue de l'Orne, Paris (15 ^e).
Cello-iodé Dubois	Labor. BOTTU-DUBOIS, 35, rue Pergolèse, Paris.
Cellofil	Lab. LEYSIN, 1 bis, rue Molitor, Paris.
Celloïxels	MERMINOD & C ^e , 49, rue de Paradis, Paris.
Collosoï cadique Pépin	9, rue du 4-Septembre, Paris.
Cellothiol	COMAR & C ^e , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Colluborine	LAUMONIER, 225, rue Saint-Martin, Paris.
Coleplastre	CAVAILLÈS, 31, r. de Turin, Paris.
Combrétine Bequillen	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
Comitiol	GRORICHARD, 12, place Labourée, Besançon.
Composé Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Comprimés Guillaumin	13, rue du Cherehe-Midi, Paris.
Comprimés du Profes. Pénrières	COUPAT à Ussel (Corrèze).
Comprimés Rogé-Cavaillès	PEPIN, 9, rue du 4 Septembre, Paris.
Comprimés de Thioceol Roche	HOFFMANN-LA ROCHE, 21, place des Vosges, Paris.
Comprimés Vicby-Etat	G. PRUNIER & C ^e , 6, rue de la Tacherie, Paris.
Conarsénol	IMBERT, 12, place Puget, Toulon.
Condurango Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Condurango granulé Astier	Laboratoires ASTIER, 45, rue du Docteur-Blanche, Paris.
Conhydrarçol	IMBERT, 12, place Puget, Toulon.
Copieine Guillermond	DEGLÔS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
Conarsinol	IMBERT, 12, place Puget, Toulon (Var).
Coréine	DANIEL BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Corps Thyroïde Menceur	à Boulogne-sur-Seine.
Cosmargyre Thévenot.	21, rue des Roses, à Dijon.
Cratægine	E. LEROUX, 11, rue Galilée, Candebec-lès-Elbœuf.

Cratægel	14, r. Eugène-Delacroix, Paris
Cratægus Boequillon	10, rue du Bac, Paris.
Cratægus Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Crayens Chaumel	FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Crayens Raynal	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
Crème résolutive du Dr Rap	CAVAILLÈS, 34, r. de Turin, Paris.
Créosal Dubois	Lab. LALEUF, 40, avenue Lamotte-Piequet, Paris.
Créoseforme Lambiotte Frères	3, rue d'Edimbourg, Paris.
Creseol	Etabl. A. BUISSON, 137, rue de Sèvres, Paris.
Crésyl Jeyes	36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
Crinocalcine	HATIER, place du Peuple St-Etienne.
Cristelax	Et. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
Crucyl	Lab. FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.
Cryogénine Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
Cryptargol Lumière	SESTIER, 9, cours de la Liberté, Lyon.
Crypthermol	DEHAUSSY, 44, rue Inkermann, Lille.
Cupranine Lèger	2, boulev. de Russie, Vichy (Allier).
Cuprifer	AUCHER, à La Ferté-Macé (Orne).
Cuprion Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Cuproëithine	GRÉMY, 14, r. Cliehy, Paris.
Curalluès du Dr Lafay	54, chaussée d'Antin, Paris.
Curatif Vaugirard	37, avenue Mareau, Paris.
Curatine	23, rue des Ecoiffes, Paris.
Curatexine Vendel	61, rue de Vaugirard, Paris.
Curgol Vicarie	17, boul. Haussmann, Paris.
Curiodé	BLANCHON Frères, 7, rue Saint-Lazare, Paris.
	Avenue Parmentier, Paris.
Curocalcine	H. SALLES, 12 bis, avenue des Gobelins, Paris.
Curogène	72, rue de la Paroisse, Versailles.
Curoxyure	Labor. B.E.A., Belfort.
Cyanaurel du Dr Gigen	7, rue Coq-Héron, Paris.
Cyanermine	CAILLAUD, 25, rue Drouot, Paris.

Cypridol Chapelle	8, rue Vivienne, Paris.
Cytobiasc	MARTIN, 36, r. des Archives, Paris.
Cytosal	SCHAEERER, 184, boulevard Haussmann, Paris.
Cyto-Serum Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Cytoplasmine Du-	8, place de la Madeleine, Paris.
catte	
Cytulinz Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.

D

Denisoline Brissou	31, r. Boissy-d'Anglas, Paris.
Dépuratif Kromelinck	BELIERES, 19, rue Drouot, Paris.
Dermadhésine	DUMATRAS, 41, r. St-Pierre, Caen.
Dermetagine	15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
Dermoplastol	DUMESNIL, 10, r. du Plâtre, Paris.
Diabétifuge	Laborat. SCIENTIA, 21, rue Chaptal, Paris.
Diachusine	LEJEUNE, 12, rue Emilié-Castelar, Paris.
Diadermine	BONETTI, 12, rue Vavin, Paris.
Dial Ciba	1, place Morand, Lyon.
Dialacétine Ciba	id.
Dialyl Brunot.	16, rue Boulainvilliers, Paris.
Diasclérol	RANSON, 121, aven. Gambetta, Paris.
Diascs Progil	SOCIÉTÉ PROGIL, 6, boul. de Strasbourg, Paris.
Diasténine Grémy	14, rue de Cléchy, Paris.
Diastogène	DEHAUSSY, 44, rue Inker-mann, Lille.
Dicallode	MAYOLY-SPINDLER, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Didial Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.
Diéménal	J. DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune, Paris.
Diénel	DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune, Paris.
Digalène Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE, & C ^{ie} , 21, place des Vosges, Paris.

Digestif Capmartin	2, r. du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
Digestif Harvey	MALMANCHE, 37, r. de Paris, Ruell.
Digestif Henry	39, rue de Selessin, Liège.
Digestif Pipel	D ^r THOUVENIN, à Bonnelles (S.-et-O.).
Digibaine	Lab. DEGLAUDE, 6, rue d'Assas, Paris.
Digicardine	Lab. IMMUNOS, 6, rue Éd. Valentin, Narbonne.
Digitaline Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.
Digimialbaine	MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
Digitale Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Digitale Ecalte	BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Digitaline Homolle & Quévenne	GENEVOIX, 14, rue des Beaux-Arts, Paris.
Digitaline cristallisée de Nativelle	49, boulevard Port-Royal, Paris.
Digitaline cristallisée du D ^r Mialhe	8, rue Favart, Paris.
Dimétol Vicarie	17, boul. Haussmann, Paris.
Dimol	Lab. Anglo-Français, Bois-Colombes (Seine).
Diiodoforme Taine	ADRIAN, 9, rue de la Perle, Paris.
Diöradin	CAILLAUD, 25, rue Dronot, Paris.
Dioséine Prunier	6, avenue Victoria, Paris.
Diplo vaccin U. T. A.	Lab. d'Opothérapie U. T. A., Liège.
Disménine Henry	39, rue de Selessin, Liège.
Diurèse	CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, Paris.
Diurocardine	285, av. Jean-Jaurès, Lyon.
Di-Uroiodine	VÉNIEZ, 45, boul. Lafayette, Calais.
Dmégon (Néo)	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Dmesta (Néo)	id.
Dmetys (Néo)	id.
Doloma	29, place Bossuet, Dijon.
Dozéol	Lab. DEGLAUDE, 6, rue d'Assas, Paris.
Dragées anticatar- rales	LEGOUX Fr., 10, rue de Turenne, Paris.
Dragées antinerveuses Cavallès	PEPIN, 9, r. du 4-Septembre, Paris.
Dragées Benqué	16, rue Ballu, Paris.

Dragées de Bondonneau	GUERIN, 60, cours de Vincennes, Paris.
Dragées Carbonel	CARTÉRET, 15, rue d'Argenteuil, Paris.
Dragées Demazières	131, rue de Vaugirard, Paris.
Dragées de fer Coignet	43, rue de Saintonge, Paris.
Dragées de fer Rahuteau	COMAR & C ^e , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Dragées Elkin	DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune, Paris.
Dragées ergotées	MANNET, à Loudun (Vienne)
Dragées Fernel	SOCIÉTÉ DES PRODUITS RENLAIGUE, 76, boulev. Haussmann, Paris.
Dragées Gelineau	MOUSNIER, à Secaux.
Dragées du D' Hecquet	49, boul. Port-Royal, Paris.
Dragées Ténicardiques Le Brun	5, r. Hippolyte-Lebas, Paris.
Dragées Névresthéniques "Yse"	65, rue Louis-Blanc, Paris.
Dragées Nyrdhal	20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Dragées Pautauberge	165, r. St-Denis, Courbevoie.
Dragées Sameda	2, rue Colonel-Renard, à Meudon (S.-et-O.).
Duodénase	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
Dyspeptine Hepp	Labor. du Puits-d'Angle, Le Chesnay (S.-et-O.).

E

Eau Antileucorrhéique Blotière	6, rue Dombasle, Paris.
Eau Chambille	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Eau de St-Colomban	Bains-les-Bains (Vosges).
Ebanyl	TRONCIN et HUMBERT, 96, r. d'Amsterdam, Paris.
Eczéda	BEYTOUT et CISTERNE, 12, boul. St-Martin, Paris.
Edistel	J. QUÉVOIX à Orléans.
Edevaccin	Institut de Microbiologie, Sarrebrück.
Ektegan	12, rue Lamartine, Paris.
Elatine Bouin	FAGARD, 44, rue d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine.
Elbon Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.

Electrarçol Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris
Electraurcol Clin	id.
Electrocuprol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro Hg	COMAR & C ^{ie} , id.
Electromanganol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electromartiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electrepalladiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro-platinol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro-Rhodiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electrosélénium	COMAR & C ^{ie} , id.
Elixir d'antipyrine Lareze	ROHAIS & C ^{ie} , rue des Lions- Saint-Paul, 2, Paris.
Elixir Benjean	DUSSUEL & FAURE, Aix- les-Bains.
Elixir Déret	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés St-Jacques, Paris.
Elixir Duchamp	Comte de GRAUWE, 6, rue Rocroy, Paris.
Elixir Ducre	DURIEZ, 20, pl. des Vosges, Paris.
Elixir Duret	10, rue du Bac, Paris.
Elixir cupeptique Tisy	VAUDIN & GUILLAUMIN, 12, rue Charles V, Paris.
Elixir de fer Kœniç	37, avenue Marecau, Paris.
Elixir ferro erçoté	MANNET, à Loudun (Vienne)
Elixir Glasser	à Turckheim près Colmar (Haut-Rhin).
Elixir Glover	R. GRUET, 13, rue des Minimes, Paris.
Elixir Grez	COLLIN, 49, rue Maubeuge, Paris.
Elixir Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Elixir Iodo-dépuratif	C. PÉPIN, 9, rue du 4-Sep- tembre, Paris.
Elixir Mannoet ioduré	à Loudun (Vienne).
Elixir Mariavi	41, boul. Haussmann, Paris.
Elixir Martin-Mazade	à Saint-Vallier (Drôme).
Elixir du Dr Mialhe	8, rue Favart, Paris.
Elixir de Pepto- Cardine	DURET et REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Elixir polybromuré Yvon	5, rue de la Feuillade, Paris.
Elixir Spes	Dr GUIRAUD, 98, rue Saint- Ginès, Bordeaux.
Elixir tribromuré	MANNET à Loudun (Vienne)
Elixir Virenque	DEGLÔS, 131, rue de Vau- girard, Paris.
Elixir de Virginie Nyrdhal	MORIDE, 20, rue La-Roche- foucauld, Paris.
Elixir Vital Quentio	MOUSNIER, à Secaux.
Embryonine du Dr Barré	à Argentan (Orne).

Emétinol Viel	7, rue Saint-Yves, Rennes.
Emplâtres R. Cavallès	34, rue de Turin, Paris (8 ^e).
Emplâtre Duret	61, rue de Vaugirard, Paris.
Emplâtre poreux Williams	LOGEAI, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Emulsion Bonnefond	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Emulsion Marebais	à la Rochelle (Char.-Infér.).
Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Energétiques végétaux Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Enésol Clin	29, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Engelurel	22, rue de Vienne, Paris.
Eniade Lefebvre	2, rue Duphot, Paris.
Eno's Fruit Salt	3, Av. Lowendal, Paris.
Entéroseptyl Clérambourg	BRUNERYE, 4, rue T Barbé, Paris.
Entérovaacuo Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
Entérozone	H. ROGIER, 9, rue de la Terrasse, Paris.
Entérozyne Chevreton & Lematte	5, rue Ballu, Paris.
Eparseno	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Epidesine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Erapel	45, rue de l'Ecliquier, Paris
Ergot de seigle Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Ergotine Benjean	LABELONYE, 99, r. d'Aboukir, Paris.
Ergotine Yvon	5, rue Lafenillade, Paris.
Ergotinine Tabret	10, rue du Commandant-Rivière, Paris.
Erythrocluès	Phar. LAFAY & FERRAND, 54, chaussée d'Antin, Paris.
Erséol Prunier	6, rue de la Tacherie, Paris.
Eseuléel	FOURIS, 13, rue Lacharrière, Paris.
Ether anesthésique	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Ether amyvalérianique	G. BRUEL, 30, rue de Paris, à Colombes (Seine).
Eucalcium	BASTIDE, 59, boul. de Paris, Marseille.
Eucalyptine	Lab. LEBRUN, 5, r. Hippolyte-Lebas, Paris.
Eucratel	D ^r CREUZÉ, 1, r. Bonaparte, Paris.
Eucytel	MAYOLI, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.

Eudynol

Eugène Prunier

Eukénel Clément

Eukinase Carrien

Eumictine Leprince

Eupeptique Monaven

Euphen

Euphenel Ağuettant

Euphorol Loudenot

Euphrésine Bastia

Euprine Vernade

Eupnogénel

Euréka-Cooky

Eurenal

Eusemmeine Bélières

Eutensyl Grémy

Evatinine Carrien

Evine

Eveonymine Thibaut

Exol Coénel

Exolysés Byla

Extrait de Malt

Français Déjardin

Extrait de Malt Fran-

çais Déjardin gly-

cérophosphaté

Extraits Monceur

USINES DES AUBRAIS, 286,
faub. Bannier, Orléans.

6, rue de la Tacherie, Paris.

7, passage Thionville, Paris

54, faub. St-Honoré, Paris.

62, rue de la Tour, Paris.

VACHERON, 26, av. Vallioud
à Ste-Foy, près Lyon.MAYOLI, 1, pl. Victor-Hugo,
Paris.

36, quai Fulchiron, Lyon.

106, av. du Roule, Neuilly-s-S.

61, cours de la Liberté, Lyon.

DARRASSE Frères, 13, rue
Pavée, Paris.

LAGAYE à Vouvant (Vendée)

18, rue Molitor, Paris.

CARTERET, 15, rue d'Argen-
teuil, Paris.

19, rue Dronot, Paris.

14, rue de Cléchy, Paris.

54, faub. Saint-Honoré, Paris.

40, rue des Francs-Bourgeois,
Paris.

76, rue Petits-Champs, Paris.

43, rue de Saintonge, Paris.

26, av. Observatoire, Paris.

109, boulevard Haussmann,
Paris.109, boulevard Haussmann,
Paris.49, avenue Victor-Hugo, Bou-
logne-sur-Seine.

F

Fabianose

LOGEALS, 24, rue de Silly,
Boulogne-sur-Seine.

Facmine Longuet

34, rue Sedaine, Paris.

Farines Benedictus

74, rue Lamarek, Paris.

Farines Favrichen

à Saint-Symphorien-de-Lay,
(Loire).

Farine lactée

Heudebert

85, rue de Saint-Germain.
Nanterre.

Farine lactée Nestlé

6, avenue Portalis, Paris.

Farine lactée Salvy

6, rue Daubigny, Paris.

Farines Maltées

47, rue Miromesnil, Paris.

Jammel

Farine de malt

85, rue de Saint-Germain,
Nanterre.

Heudebert

Farine Milo

6, avenue Portalis, Paris.

Favelysine Thévenot	21, rue des Roses, Dijon.
Félamine	Et. SANDOZ, 5, rue de Metz, Paris.
Félargent	USINES DU RHONE, 21, rue Goujon, Paris.
Férarsényl	GAUTIER, 4, rue Fays, Saint-Mandé (Seine)
Fer Bravais	Comte de GRAUWE, 16, rue de Roeroy, Paris.
Fer Henry	St-Mandé (Seine).
Fer injectable Roussel	39, rue de Sclessin, Liège.
Feriodé Byla	MOUSNIER, à Secaux.
Fer Larcade	26, av. de l'Observatoire, Paris
Fermentérol Milan	151, rue Lahayette, Paris.
Ferments organiques Zéver	CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, Paris.
Feresthyl	COIRRE, 79, rue Cherche-Midi, Paris.
Feroxal Buisson	PARIS, 4, rue de Lamotte-Piequet, Paris.
Fer-ovarine Vitalis	157, rue de Sèvres, Paris.
Fer Quévenne	38, bd. de Charonne, Paris.
Fer Rabuteau	GENEVOIX, 14, rue des Beaux-Arts, Paris.
Ferrecalbiose	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Ferrocédile Leprince	Lab. ROUSSY à Viroflay, (Seine-et-Oise).
Ferrecol	62, rue de la Tour, Paris.
Ferremalt	Lab. du FERROCOL, 58, rue Taitbout, Paris.
Ferropeptone	Lab. Anglo-Français, Bois-Colombes (Seine).
Ferrophytine Ciba	J. TINARDON, 17, rue Cadet, Paris.
Ferroplasma	1, place Morand, Lyon
Ferrygène Carrau	VIVIEN, 6, rue d'Abbeville, Paris.
Fer vital de Jacquemaire	Labor. TISSOT, 34, boul. de Clieby, Paris.
Ficatine	à Villefranche (Rhône).
Figadol Vivien	PRUNET, r. Payras, Toulouse
Fixase	6, rue d'Abbeville, Paris.
Fixine Grémy	PARET, à Marseille.
Fixogène Loudenot	LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
Floréases	106, av. du Roule, Neuilly-s-S.
Fludiose	Pharm. Rationnelle, 4, faub. Poissonnière, Paris.
	Lab. de Médecine Expérimentale, Beauvais.

Flucide	N. COUVE & C ^e 39, rue de Châteaudun, Paris.
Fluène	LANDRIN, 20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Fluid Listérol	LOGEAI, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Fluodyle	Etab. SABATIER, 10, rue Pierre-Ducieux, Paris.
Fluiformel Genio	60, rue Saussure, Paris.
Fluoridia	50, rue de Lille, à Tourecoing.
Fole-Endocrisines	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Fourrier	
Forcival	SALVY & C ^e , 20 rue de Vienne, Paris.
Ferdynel	13, rue Général-Foy, 13, Saint-Etienne.
Formadermine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Fermaçol Bouty	3 ^{me} , rue de Dunkerque, Paris.
Fermine Adrian	9, rue la Perle, Paris.
Fermecarbène	Lab. de Médecine Expérimentale, Beauvais.
Fertossan Ciba	1, place Morand, Lyon.
Fesfexyl Carren	Laborat. CARRON, 40, rue Milton, Paris.
Festrychoel Chantereau	8, rue de Constantinople, Paris.
Françolcine	F. AUCLAIR, à Aigurande (Indre)
Françulose Flach	6, r. de la Cossonnerie, Paris.
Fraxel	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Freinix	Etabl. A. BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Frène Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Freinelutéine	VOGEIN, 19, rue des Deux-Ponts, Paris.
Frialine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Fructaline Logeais	30, rue de Chaillot, Paris.
Fructines Vichy	49, av. Wagram, Paris.
Fucobiline Prothière	55, r. Auguste-Comte, Lyon.
Fucoglycine Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Fucosiné Prothière	55, rue Auguste-Comte, Lyon.
Fucus Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Fumigarettes	Laboratoire FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.
Fumigator Genin	60, rue Saussure, Paris.
Furel	5, rue Chauveau-Lagarde, Paris.
Furenculase	DALET, 94, boul. des Batignolles, Paris.

G

Gadéinol	LAFARGE, 45, bd. Lefebvre, Paris.
Gadiodine Labesse	38, rue des Lices, Angers.
Gadoferrol	93, rue Nollet, Paris.
Gaduase	Lab. SERVIER à Orléans.
Galacalcine Latour	17, place des Vosges, Paris.
Gaïacol phosphaté Pautauberge	165, r. St-Denis, Courbevoie.
Galacophosphal Clin	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Galarsine Ducatte	8, pl. de la Madeleine, Paris.
Gaiarsol Bouty	3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
Gaïasyl	CRESTEY, 164, rue Saint-Honoré, Paris.
Galactogènes Jolivet	140, faub. St-Honoré, Paris.
Galform	LAMBIOTTE Frs., 3, rue d'Edimbourg à Paris.
Galyl Naline	Etab. MOUNEYRAT à Villeneuve-la-Garenne.
Gambéol	J. GAUTIER, 24, rue de Ponthieu, Paris.
Gardenal	Etab. POULENC Frères, 92, r. Vieille-du Temple, Paris.
Gastérine Frémont	à Vichy (Allier).
Gastricine	LEGOUX Fr., 10, rue de Turenne Paris.
Gastrocalcine	Lab. OBERLIN, 17, r. Cadet, Paris.
Gastrocaol	A. BENDERITTER, à Vendôme (L.-et-Ch.).
Gastropeptyl	71, rue Saint-Jacques, Paris.
Gastro-Sodine	25, rue Vaneau, Paris.
Gastrozymase Bouty	3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
Gaurel	PEPIN et LEBOUCCQ, 30, rue Armand-Sylvestre, Courbevoie.
Gayacolchine	A.-J. CHAUCHY, 40, rue de la Bienfaisance, Paris.
Gelée antidiarrhéique Lumière	SESTIER, 9, cours de la Liberté, Lyon.
Gélobarine	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Gélogastrine	LICARDY, 38, boul. Bourdon, à Neuilly-s-Seine.
Gélotanin	Lab. CHOAY, 48, rue Théophile-Gautier, Paris.
Génésérine	Lab. BEAUGONIN, 4, place des Vosges, Paris.
Genêt Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.

Génolaetine	COQUET, 3, bd. de Courcelles Paris.
Géodyl	J. ROBERT, 39, rue de Bourgogne, Paris.
Germoealine	PEILLE, 29 rue de Metz, Toulouse.
Géraseptol	12, rue Vavin, Paris.
Germese	Laborat. MOREAU, 7, rue d'Hauteville, Paris.
Givrinol	H. LEFANÇOIS à Caen, (Calvados).
Globușenol	CHANAL, à Pesches-le-Chatel (Doubs)
Globules Hébert	à Saint-Lô (Manche).
Globules Fumouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Globules Laincar	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
Globules Romon	Labor. MONAL et C ^e , 6, rue Daubigny, Paris.
Globules tœniafuges	LOGEAIS, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Secrétan	
Glema	Etabl. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
Glutinettes d'Aspirine	Lab. BERGER, 14, rue des Pyramides, Paris.
Glycérophosphate Dalloz	15, boulevard de la Chapelle, Paris.
Glycérométhylarsénié	BLOTTIÈRE, 6, rue Dombasle, Paris.
Glycérophosphates effervescents	LE PERDRIEL, 11, rue Milton, Paris.
Glycérophosphates Freyssinge	FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
Glycérophosphates Jacquemaire	à Villefranche (Rhône).
Glycérophosphate Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Glycobl	Lab. BEAUGONIN, 4, place des Vosges, Paris.
Glyceocarpine	Lab. DALIN, 1, rue de la Martinière, Lyon.
Glycogène Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Glyco-lactimase Couturier	18, avenue Hoche, Paris.
Glyco-phénique Dr Délat	G. PRUNIER & C ^e , 6, rue de la Tacherie, Paris.
Glycophosphates granulés Astier	Labor. ASTIER, 45, Paris. Docteur-Blanche, Paris.
Glyco-Phytol	Lab. ALBARRAN, 3, rue Chanex, Paris.

Glycérol	LALEUF, 49, aven. Lamotte-Piequet, Paris.
Glyce-Thymosine	3, Av. Lowendal, Paris
Glykelaïne Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Glyphospher	GIVAUDAN-LAVIROTTE, 5, 6 ch. Combe-Blanche. Lyon.
Glyphospho	52, r. d'Aubuisson, Toulouse
Gmel (Extraits)	27, faub. Montmartre, Paris.
Gobérol	CHARMAISON, 35, aven. de Royal, Clermont-Ferrand.
Goléane Maignon	MILLET, 8, r. Richer, Paris.
Goménol	17, rue Ambroise-Thomas, Paris.
Gouacrine	Etablis. POULENC Fr., 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Goudron Freyssinge	6, rue Abel, Paris.
Gouttes Fluxines	BONTHOUX, rue Nationale, Villefranche (Rhône).
Gouttes amères de Baumé	D. GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.
Gouttes Ilioviennes	TROUETTE-PERRET, 15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
Gouttes Nican	CANTIN, à Palaiseau (S.-et-O.).
Gouttes Pausodun	147, b. Montparnasse, Paris.
Gouttes Paidophiles du Dr Guiraud	Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers, Paris.
Gouttes Scandinaves	D ^r H. PHILIPPE, 14, rue du Palais-Grillet, Lyon.
Gouttes de Séru	M. LETTRY, 42, avenue de Breteuil, Paris.
Grains Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
Grains d'Evian	PERROCHON, 57, r. Origet, Tours (Indre-et-Loire).
Grains laxatifs Mi- raten	à Châtel-Guyon (P.-de-Dôme)
Grains de Plombières	Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers, Paris.
Grains de santé du Dr Franck	TRONCIN et HUMBERT, 96, rue d'Amsterdam, Paris.
Grains de Vals	NOGUÉS, 11, r. Joseph-Bara, Paris.
Granulé Bravais	3, rue Mogador, Paris.
Granulé calma- frenkel	CHEVRETIN & LEMATTE, 5, rue Ballu, Paris.
Granulé Caresmel	5 et 7, r. Henry-Gréville, Angers
Granules Cresnier	NITOT, 6, rue Chanoinesse, Paris.
Granulé du Dr Mous- saud	H. RIVIER, 26, rue Saint- Claude, Paris.
Granulé Girard	48, rue d'Alésia, Paris.

Granules du Dr Papillaud	GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.
Granules Homolle & Quévenne	14, rue des Beaux-Arts, Paris.
Granules Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Granules des Vesôes	21, boul. Haussmann, Paris.
Grillerine	BLANCHON fr. 7, rue Saint-Lazare, Paris.
Grippel	INSTITUT DE MICROBIOLOGIE, Sarrebruck.
Gui Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Guipsine Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Gynalcéol	J. TINARDON, 17, r. Cadet, Paris.
Gynéco-Phytol	Lab. ALBARRAN, 3, rue Chané, Paris.
Gynéose	Lab. BERGER, 14, rue des Pyramides, Paris.
Gynergène	Etab. SANDOZ, 5, rue de Metz, Paris.
Gynopausine	BANSON, 121, avenue Gambetta, Paris.
Gynophiline	DONARD, à Uzel, près l'Oust (Côtes-du-Nord).

H

Hæmabœol	Lab. CHARRON, 34, rue Galilée, Nantes.
Hamamélidine	LOGEAI, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Hamaméline Roy	41, rue de Rome, Paris.
Hamaméliode	Lab. OBERLIN, 17, rue Cadet, Paris.
Hamamélis Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Hamamélis Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Hamamélis Natter	34, boul. Clichy, Paris.
Hamamélis Virginnica	61, rue Saint-Didier, Paris.
Hectarqyre Naline	à Villeneuve-la-Garenne (Seine).
Hectine Naline	Id.
Hélénine du Dr Kerab	11, rue de Navarre, Paris.
Hélitai	L. SIMON, 15, pl. Nationale, Dieppe.
Hémapène Tailleur	SEVENET, 55, r. Pajol, Paris.
Hémapénine du Dr Giraud	PETT, place de l'Eglise, Argenteuil.
Hémarsyl du Dr Roux	CAILLAU, à Argentat (Corrèze).
Hématogénol	HAUTDIDIER, 37, r. Galilée, Paris.

Hémo-Cyto Sérum Corbière	Labor. CORBIÈRE, 27, rue Desrenaudes, Paris.
Hémoeléine Lafay	54, Chausée d'Antin, Paris
Hémodrome	LANCOSME, 71, av. Victor- Emmanuel III, Paris.
Hémoduetyl	LICARDY, 38, boul. Bour- don, Paris-Neuilly.
Hémofixine	BRANCHU, 4, r. Beaurepaire, Paris.
Hémogénase	MARC & Cie, à Courpière (P.-de-D.).
Hémostimuline Ra- vaud	
Hémostyl du Doct. Roussel.	21, rue d'Aumale, Paris.
Hémotonine	Etabl. Albert BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Hémozol	BEYTOUT & CISTERNE, 12, boul. St-Martin, Paris.
Hemypnal	O. ROLLAND 1, pl. Morand, Lyon.
Hépatine Bouty	3 ^{re} , rue de Dunkerque, Paris.
Hépato-Byl	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Hépato-Sérine	22, r. Guillaume-le-Conqué- rant, Caen.
Hépatotanie	GREMY, 14, rue de Clichy, Paris.
Herméphényl	9, cours de la Liberté, Lyon.
Héresine Vicaris	11, boul. Haussmann, Paris.
Hétérellysine	Laborat. OLIVIERO, 87, rue Denfert-Rochereau, Paris.
Hexotal	Laborat. CAMUSET, Ablon (Seine-et-Oise).
Hippe-Carnis	H. MORAND, à Auray (Morb.)
Hippeplasine du Dr Gran	BYLA, 26, av. de l'Obser- vatoire, Paris.
Hipposarcine Roy	GIVAUDAN - LAVIROTTE, 56, Chem. Combe-Blanche, Lyon.
Histogénol Naline	Etabl. MOUNEYRAT, à Ville- neuve-la-Garenne.
Histonol	Dr PLUS, rue Myrrha, Paris.
Holos Deschiens	9, rue Paul-Baudry, Paris.
Hopegan	12, rue Lamartine, Paris.
Hordéomaltine	10, rue Richelieu, Paris.
Hormelaxine	DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.
Hordépine Lauth	9, rue du 4-Septembre, Paris.
Huile au calomel Duret	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
Huilaixine Gillot	59, rue de Châteaudun, Paris.

Huile Boris	14, rue de Birague, Paris.
Huile Crelas	GIVAUDAN - LAVIROTTE, 56, Chemin Combe-Blanche, Lyon.
Huile F. M. Hoëg	2, rue Castiglione, Paris.
Huile grise Duret	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
Huile grise stérilisée	VIGIER, 12, boulev. Bonne- Nouvelle, Paris.
Huile Riche	Labor. du TOPIQUE BER- TRAND, Oullins (Rhône).
Hydralin	CAILLAUD, 25, rue Drouot, Paris.
Hydrariède	AUCHER, à La Ferté-Macé (Orne).
Hydrastis Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Hydrastis Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Hypercitol	MATRAY, à Aubière (Puy- de-Dôme).
Hypergal	GREMY, 14, r. de Clichy, Paris
Hypnose Vergelet	163, rue de Flandre, Paris.
Hypneural Cos	LABELONYE, 99, rue d'Aboukir, Paris.
Hypochlorine	48, rue de Londres, Paris.
Hypodermie "Le Pecq"	39, rue Cambon, Paris.
Hypodermozone	H. ROGIER, 9, r. de la Terrasse, Paris.
Hypophosphites Churchill	SWANN, 12, rue Castiglione, Paris.
Hypophosphites Fellows (Sirep composé aux)	5, rue de la Paix, Paris.
Hypophyse-Endocri- sines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.

I

Ibogaine Nyrdhal	LANDRIN, 20, rue La-Roche- foucauld, Paris.
Immunizols Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Indhaméline	LEJEUNE, 12, rue Emilio- Castelar, Paris.
Injection Clin Stry- chno-Phospharsinée	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Injectious Hg. Rogé Cavaillès	PÉPIN, 9, rue du 4-Septem- bre, Paris.
Inoléine	58, rue Oberkampf, Paris.
Inetyol	D. DEBAT, 35, r. des Petits- Champs, Paris.

Insuline Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Insuline Fernet	INSTITUT DE MICROBIOLOGIE, Sarrebruck.
Insuline Rogier	19, avenue de Villiers, Paris.
Insulyl Roussel	21, rue d'Aumale, Paris.
Internoses "Le Peeq"	39, rue Cambon, Paris.
Intraits Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Iodalbin Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Iodalia	BONETTI, 12, r. Vavin, Paris.
Iodalese Galbrun	8, rue du Petit-Musc, Paris.
Iodamelis Logenis	24, r. de Silly, Boulogne-s/-S.
Iodargel Viel	7, rue St-Yves, Rennes.
Iodarsenic Guiraud	98, r. Saint-Ginès, Bordeaux.
Iodaseptine Cortial	10, rue Béranger, Paris.
Iodéline Montagu	49, boul. Port-Royal, Paris.
Iode Oberlin	J. TINARDON, 17, rue Cadet, Paris.
Iode Organique Beissy	32 bis, boulevard d'Argenson, Neuilly-sur-Seine.
Iodéel Viel	7, rue St-Yves, Rennes.
Iodéyl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Iodex	FANYAU & C ^{ie} , 118, boulevard de la Liberté, Lille.
Iodhéma	LÉGIER, 4, r. Candolle, Paris
Iodhyrine du Dr Deschamps	49, avenue Lamotte-Picquet, Paris.
Iodo-Bismuth Ercé	Lab. ROBERT & CARRIÈRE, 39, r. de Bourgogne, Paris.
Iodo-Bismuthate de Quinine	FRAISSE, 8, r. Jasmin, Paris
Iodoécéréel Dalloz	13, b' de la Chapelle, Paris.
Iodecel Carrion	54, faub. Saint-Honoré, Paris.
Iodogéline	CROZET, à Cannes (A.-M.).
Iodogénéel Pépin	à Courbevoie (Seine).
Iodo-Maisine	4, rue Elzévir, Paris
Iodemétine Hautdier	37, rue Galilée, Paris.
Iodone Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Iodenien	49, rue Montorgueil, Paris.
Iodoplasme	85, rue des Morillons, Paris.
Iodostarine Roche	R. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, place des Voges, Paris.
Iodo-Thyreïdine Catillon	3, boul. St-Martin, Paris.
Iodo-Trypsine	50, rue Rennequin, Paris.
Iodurase	COUTURIEUX, 18, avenue Hoche, Paris.
Iodures Cros	10, rue du Bac, Paris.
Iodures Foucher	142, boul. St-Germain, Paris.

Iedures Laroze	ROHAIS & C ^e , 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.
Iedure Philippe	14, rue Palais-Grillet, Lyon.
Iedures Souffron	Etabl. BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Ielase Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Ionoïdes	13, rue Pavée, Paris.
Ipéca total Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Irol Churchill	12, rue Castiglione, Paris.
Isebromyl	COMAR & C ^e , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Isetonyl	87, rue Lafayette, Paris.

J

Jécol	3, r. Wateau, Courbevoie (S.
Jecemalt	Etab. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
Juëland Gnoet	27, faub. Montmartre, Paris.
Juëlandine Ferrouil- lat	35, rue de Rivoli, Paris.
Juëlane	à Chambéry (Savoie).
Juëlanrégine André	2, rue des Alpes, à Valence.

K

Kalmine	METADIER, à Tours.
Kéfir Carrien	V. BORRIEN & C ^e , 54, faub. Saint-Honoré, Paris.
Kélène	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Képhaldol	RATIÉ, 45, rue de l'Echiquier, Paris.
Képhaline Brunot	HAMEL, 10, place Thiers, Le Mans.
Képhir Salmon	28, rue de Trévise, Paris.
Kerlactine	71, avenue de Saxe Lyon.
Keriol Lerch	à Saint-Etienne.
Kimosine Rogier	10, avenue de Villiers, Paris.
Kinecline	12, rue du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne.
Kibaurine Moncour	49, avenue Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
Kipsol	BERTAÛT-BLANCARD, 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
Kluchel	REMEAUD, 38, Grande Rue, Boulogne-sur-Seine.
Kola-fer Trouette	15, r. Immeubles-Industriels, Paris.

Kela granulée Astier	45, rue du Dr Blanche, Paris.
Kela granulée Rey	81, boul. Suchet, Paris.
Kela Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Kela Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Kela Menavon	VACHERON, 4, av. Vallioud, à Sainte-Foy, près Lyon.
Kela Pichat	5, cours Charlemagne, Lyon.
Kelarsine Pautau- berge	10, rue de Constantinople, Paris.
Kelatinés	Etab. CHALGO, 12, r. Helder, Paris.
Kréazone	TROUETTE, 15, rue des Im- meubles-Industriels, Paris.

L

Lab-Lacto-Ferment	MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
Laccodermes Brisson	111, rue du Mont-Cenis, Paris.
Lactagel Pearson	43, rue Pinel, Saint-Denis.
Lactéol Boucard	30, rue Singer, Paris.
Lactinase Coutu- rieux	18, avenue Hoche, Paris.
Lactebacilline	13, rue Pavée, Paris.
Lactohyl	21, rue Théodore-de-Banville, Paris.
Lactochol	Id.
Lactocitrine	LAGET, pl. Henri IV, Rouen.
Lactolaxine Fydau	4, r. Lamotte-Piquet, Paris.
Lacto-Mannitase	22 bis, r. Cadroin, Bordeaux.
Lactophosphine	8, rue de la Pompe, Paris.
Lactosene	17, rue Cadet, Paris.
Lactozymase B.	Labor. CHEVRETIN & LE- MATTE, 5, rue Balbu, Paris.
Lait de Magnésie Phillips	62, Champs-Élysées, Paris.
Lait écrémé	79, rue de la Chapelle, Paris.
Lait Gloria	19, boul. Malesherbes, Paris.
Lanseyl	ROBERTS & Co, 5, rue de la Paix, Paris.
Lantel Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Laurénol	BÉLIERES, 19, rue Drouot, Paris.
Laxagatine	5, av. des Tilleuls, Paris.
Laxamalt	LICARDY, 38, boul. Bour- don, Paris-Neuilly.
Laxamer Lefèvre	52, rue Decamps, Paris.
Laxatif Châtel- Guyen Gubler	PERRAUDIN, 70, rue Legendre, Paris.
Laxatone Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Laxeil	12, rue Beautreillis, Paris.
Laxel Fraudin	4, av. Desfeux, Boulogne-s-S.

Laxolip-Henry	39, rue de Selessin, Liège.
Laxe-lin	182, av. de Versailles, Paris.
Laxopeptine Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Laxophore Brachin	à Joinville (Hie-Marne).
Lébénol Meurice	68, r. Berkenlael, Bruxelles.
Lebnoi	Labor. THÉVENOT, à Dijon.
Lécithine Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Lécithine Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris
Lécithine Vial	8, rue Vivienne, Paris.
Lécithosine Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Léniforme	26, rue Pétrelle, Paris.
Leptandrine Royer	225, rue Saint-Martin, Paris.
Leucagine	Lab. L.-G. TORAUDE, 22, rue de la Sorbonne, Paris.
Levulose Rogier	19, avenue de Villiers, Paris.
Levurase	CHARMAISON, à Clermont- Ferrand.
Levure Coirre	79, r. du Cherche-Midi, Paris.
Levure Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Levurine extractive	18, avenue Hoche, Paris.
Centurieux	
Lientine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Limol Churchill	12, rue Castiglione, Paris.
Lipiodol Lafay	54, Chaussée d'Antin, Paris.
Lipoehol Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Lipocytol Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Lipoféine	1, pl. Morand, Lyon.
Lipoëyre Ciba	Id.
Lipoïdes Iscovesco	107, rue des Dames, Paris.
Lipofedine Ciba	1, place Morand, Lyon.
Liporhine	JOSSÉ, pl. Wilson, Denain.
Lipol	BATTUT, 31, r. St-Denis, Paris
Lipo-Vaccins	32, rue de Vouillé, Paris.
Liqueur d'Hermès	BEYTOUT & CISTERNE, 12, boul. Saint-Martin, Paris.
Liqueur Laprade	49, rue de Maubeuge, Paris.
Liqueur Laville	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris
Liqueur peptophos- phorique	ADRIAN, 9, rue de la Perle, Paris.
Liseronine	BELLERES, 19, rue Drouot, Paris.
Lithinés Henry	39, rue de Selessin, Liège.
Listose Vicario	17, boulevard Haussmann, Paris.
Litharsyne Ferré	142, boul. St-Germain, Paris.
Lithine efferves- cente	LE PERDRIEL, 11, r. Milton, Paris.
Lodolan	52, r. d'Aubuisson, Toulouse.
Luargol	POULENC Fr., 92, rue Vieille- du-Temple, Paris.

Luatine	SAVÉ, 2, aven. Parmentier, Paris.
Lual	Lab. CHARRON, 34, rue Galilée, Nantes.
Luarsyl	id.
Luatoï	POULENC Fr., 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Ludin	REY, r. J.-B.-Morlot à Dijon.
Lusotorme	CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, Paris.
Lutéovar	FOULON & C ^e , 188, faub. St-Martin, Paris.
Lycétol Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Lysiodo Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
Lysel	31, r. Parmentier, Ivry (Seine)

M

Magnésie Durel	7, boulevard Denain, Paris.
Magnésie Rey	81, boulevard Suchet, Paris.
Magel Churchill	12, rue Castiglione, Paris.
Maltasc Fanta	6, rue Guyot, Paris.
Malt Barley	BRASSERIE FANTA, 6, rue Guyot, Paris.
Malt-Calciac	Labor. BOUTARD, à Luc-sur-Mer (Calvados)
Malt Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Maltéa Moser	12, rue de Bruxelles, Lyon.
Maltine Gerbay	à Roanne (Loire).
Malt Moritz	189, rue de Vauglarde, Paris.
Malt Régina	31, rue Pajol, Paris.
Malt Strauss	DÉMORY, 12, r. Broca, Paris.
Maltine-Phénix	14, rue de Birague, Paris.
Malto-Fer Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Maltesan	Etabl. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
Malt Pailleté	Société PROGIL, 6, boulev. de Strasbourg, Paris.
Mamelle-Endocri-sines Fournier	26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
Mançaine	SCHMIT, 71, rue Ste-Anne, Paris.
Mançanésia	64, rue des Tournelles, Paris.
Mançano-Calciac	CAMUS à Saint-Amand-Montrond (Cher).
Mançanoxyl	Lab. du Dr FIALIP, 23, av. de la Motte-Picquet, Paris.
Marcyï	LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
Marinol (Laborat. dn) à Dieppe (Seine-Inférieure).	
Marren d'Inde Dausse	4, rue Aubriot, Paris.

Marsyle Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jaeques, Paris.
Mas de la Ville	à Arles-sur-Rhône.
Maya Bulgare	322, rue Saint-Honoré, Paris.
Médicoferments	10, r. de la Violette, Hesancçon, (Doubs).
Ménovarine	MONDOLAN, 11, place des Vosges, Paris.
Mentholina	GUIGNIER, à Bois-Colombes.
Mercuriaux Viêler	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Méseforme	Lab. DORANTOWICZ, 17 bis, avenue Parmentier, Paris.
Mésôtherium	157, rue de Sèvres, Paris.
Buisson	
Méroléol Salle	4, rue Elzévir, Paris.
Métacuprol	150, rue de la Pompe, Paris.
Métarsenebenzol	A. MILLET, 19 bis, r. Richer, Paris.
SACA	
Métharfer Bouty	3 ^{ue} , rue de Dunkerque, Paris.
Métharsinate Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jaeques, Paris.
Métharsol Bouty	3 ^{ue} , rue de Dunkerque, Paris.
Méthylarsinate	17, boul. Haussmann, Paris.
Vicario	
Méthylarsinate	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Viêler	
Metritols	LEES, 124, rue du Bae, Paris.
Mialbaine	MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
Miceliode	6, boulevard Arago, Paris.
Micranyl	GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris
Mictasol	Labor. du MICTASOL, 28, rue du Four, Paris.
Migrainol	16, cours Gambetta, Lyon.
Minéraline du D ^r Baud	14, rue de Birague, Paris.
Minéralegène	VIAL, 4, place Croix-Rouge, Lyon.
Minérol	10, rue Richelieu, Paris.
Minérolaxine	6, rue Delaborde, Paris.
Le Tanneur	
Mekalimont	BLANCHON Fr., 7, r. Saint-Lazare, Paris.
Mekavène	Comte de GRAUWE, 16, rue de Roeroy, Paris.
Mendorasme	LANGRAND, 95, rue de Turenne, Paris.
Meride (Produits)	20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Merrhualène Gautier	Lab. DORANTOWICZ, 17 bis, avenue Parmentier, -Paris.

Morrhuéline Jungken	BRACQUEMOND & C ^e , 105, rue de Normandie Cour- bevoie (Seine).
Morrhuline Pay	à Grenoble.
Morrhuel Chapoteaud	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Morrhuxine	VERGELOT, 163, rue de Flandre, Paris.
Mersine	LECONTE, 151, rue de Cha- renton, Paris.
Merubiline	ROUTET, 32, rue Joubert, Paris.
Merucalcium	Lab. du Dr FIALIP, 23, av. de la Motte-Piquet, Paris.
Mouches Albespeyres	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Mucilaxine	E. MILLET, à Rambouillet.
Mucinum	CHANTEREAU, 8, rue de Constantinople, Paris.
Mucebaryline	73, rue de la Paroisse, Ver- sailles.
Mucegène Astier	45, rue du D ^r Blanche, Paris.
Mucosédine	CAILLAUD, 25, rue Drouot, Paris.
Muqueuse Endocri- sines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Musculargyre	R. FEIGNOUX, 29, rue des Jardiniers, Montreuil (seine).
Musculosine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris
Mutandine	GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris
Muthanel	G. FERME, 55, boulev. de Strasbourg, Paris.
Muxel	Lab. SERVIER, à Orléans.
Mycodermine Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Mycolysine Deyen	5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
Mycidel Badel	à Valence-sur-Rhône.
Myodine	MAUCHANT, 14, rue de Birague, Paris.
Myo-Serum	168, boul. St-Germain, Paris.

N

Naledine	LOGEAI, 30, r. de Chaillot, Paris.
Narcotile Benqué	47, rue Blanche, Paris.
Narcyl Grémy	LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
Narkène	MAUCHANT, 14, rue de Birague, Paris.
Narsénel	POULENC Fr., 92, r. Vieille- du-Temple, Paris.
Née-Arsycodile	M. LEPRINCE, 62, rue de la Tour, Paris.

Nécarsite	238, faub. Bannier, Orléans.
Néofilhes Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Néo-Kola Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
Néel Bottu	35, rue Pergolèse, Paris.
Néo-laxatif Chapetot	56, boulevard Ornano, Paris.
Néolides H. B.	35, rue Pergolèse, Paris.
Néolyse	Pharmacie STOULS, 155, av. Victor-Hugo, Paris.
Néo-Pancarpine	150, rue de la Pompe, Paris.
Néoplalysines	MEBMINOD & C ^e , 49, rue de Paradis, Paris.
Néo-Rhempol	LEPRINCE, 62, rue de la Tour, Paris.
Néothyrol U. T. A.	Lab. d'Opothérapie, U. T. A. Liège.
Néo-Tréparsénan	COMAR & C ^e , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Néo-Riedine	ASTIER, 45, r. du D ^r Blanche, Paris.
Néo-Trépol	Lab. L.-G. TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
Néovarine U. T. A.	Lab. d'Opothérapie U. T. A. Liège.
Néphrine Bouty	3 ^{me} , rue de Dunkerque, Paris.
Néphrine Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Nérène Heudebert	r. Saint-Germain, Nanterre.
Nervocitrine Tissot	34, boulev. de Clichy, Paris.
Neurémol	VINSON, 3, rue de Paris, Auxerre.
Neurène	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Neuréal	LAFARGE, 45, bouj. Lefèvre, Paris.
Neurinase	GENEVRIER, 2, rue du Débarcadère, Paris.
Neurobère	E. BOUTEILLE, 23, rue des Moines, Paris.
Neurodese	D ^r FRAYSSE, 130, r. d'Aboukir, Paris.
Neurogalacel Dethan	11, r. Alph.-de-Neuville, Paris.
Neuroledure Dethan	11, r. Alph.-de-Neuville, Paris.
Neurolipase	SOCIÉTÉ ALSACIENNE de LABORATOIRES, 23, rue d'Ouessant, Paris.
Neuroplasma	DELALANDE & C ^e , 13, rue Lacharrière, Paris (13 ^e).
Neuroplasmine	Id.
Neurosine Prunier	6 rue de la Tacherie, Paris.
Neurosthyll	PARIS, 4, r. Lamotte-Piquet, Paris.

Neurotanie	GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris
Neurotrophel Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Neurovoïne	GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris
Neutrel	AMICI, à St-Sylvestre, Nice.
Neutrose Vichy	49, av. de Wagram, Paris.
Néveral	R. FEIGNOUX, 20, rue des Jardiniers, Montreuil (seins) à Moulins (Allier).
Névralgésine	
Débordes	
Névralgol Bressard	1, rue de la Cordouan, La Rochelle.
Névraltéine Rogier	19, avenue de Villiers, Paris.
Nevrosthénine Freys- singé	6, rue Abel, Paris.
Nigérine Vincent	14, av. Mac-Mahon, Paris.
Nisaméline	Etab. TROUETTE, 15, r. Immeubles-Industriels, Paris
Nitium	Etab. A. BUISSON, 157, rue de Sévres, Paris.
Nitrite de soude	10, rue Washington, Paris.
Roussel	
Nitroyl	Lab. LEYSIN, 1 bis, rue Molitor, Paris.
Nopirine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Nosol Aguetant	36, quai Fulchiron, Lyon.
Novargyre Guillaumin	13, rue du Cherche-Midi, Paris.
Novarine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Novarsénobenzol	POULENC Fr., 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Billon	
Noveplasmine	LINDEUX, 18, av. Daumesnil, Paris.
Nucléarène Cœnet	43, rue de Saintonge, Paris.
Nucléarrhol Gabriel	Lab. HENRY, 39, r. Sclessin, Liège.
Nucléarsitel Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Nucléatol Robin	Id.
Nucléo-fer Girard	48, rue d'Alsia, Paris.
Nuclocitbol	28, av. de Grammont, Tours.
Nujol	88, av. Champs-Élysées, Paris
Nurécase	Lab. GRANDVAL, à Reims.
Nutrilactine	MAUCHANT, 14, r. de Birague, Paris.
Nutritine Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Nutremalt	Etabl. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
Nyetal	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Nyrdhal (Produits)	20, rue La Rochefoucauld, Paris.



Océanine Chevreton et Lematte	5, rue Ballu, Paris.
Ocréine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Oenase Couturier	18, avenue Hoche, Paris.
Oenophos	29, place Bossuet, Dijon
Oleo-Bi-Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Oleo-Iode Dubois	35 rue Pergolèse, Paris.
Oléolaxine	DURET & RÉMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Oleo-Mel	DELFOUR à Pouillon (Luss)
Oleo-Mucilaxine	E. MILLET, à Rambouillet.
Oléthyle	122, Laub. St-Honoré, Paris.
Ophthalmine Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Opocalcium	121, av. Gambetta, Paris.
Opochlorine	SOCIÉTÉ ALSACIENNE de LABORATOIRES, 23, rue d'Ouessant, Paris.
Opolaxyl Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Opesynérghes	SOCIÉTÉ FRANÇAISE d'OPOTHÉRAPIE, 58, rue Taitbout, Paris.
Opothérapie Bouty	3 ^{me} , rue de Dunkerque, Paris.
Opothérapie Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Opothérapie Carrion	54, faub. Saint-Honoré, Paris.
Opothérapie Chaix	10, rue de l'Orne, Paris.
Opothérapie Chevreton et Lematte	5, rue Ballu, Paris.
Opothérapie Cheay	48, r. Théophile-Gautier, Paris
Opothérapie Coirré	5, boulev. du Montparnasse, Paris.
Opothérapie Fournier	26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
Opothérapie du Dr Frayssé	130, rue d'Aboukir, Paris.
Opothérapie Fumeuze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Opothérapie Monceur	49, aven. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
Opothérapie "Le Pecq"	39, rue Cambou, Paris.
Opothérapie S. F. O.	58, rue Taitbout, Paris.
Opothérapie Vigier	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Opothérapiques Meurice	68, r. Berkendael, Bruxelles.
Opozones Lumière	9, cours de la Liberté, à Lyon
Opozymases	SOC. FRANÇ. D'OPOTHÉRAPIE, 58, rue Taitbout, Paris.

Opsine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Optarsigol	DRUET & PLET, 37, rue de Marly, Bueil.
Orarçol	Sté Amicros, 5, rue Clauzel, Paris.
Orchiline Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Oriphol	MILLET 8, r. Richer, Paris.
Orthe-Gastrine	LEBLOND, 51, rue Gay-Lussac, Paris.
Osmoléine	EHEMANS, 13, rue des Moines, Paris.
Ostéismol Henry	39, r. de Schessin, Liège.
Ostéo-hépatine	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Ostréine Buisson	157, rue de Sèvres, Paris.
Ouabaine Arnaud	49, boul. Port-Royal, Paris.
Ouabaine Deglaude	6, rue d'Assas, Paris.
Ouataplasme Langlebert	SABATIER, 10, rue Pierre-Ducreux, Paris.
Ouate Thermidor	MAUCHANT, 14, r. de Birague, Paris.
Ovaire-Endocrisines Fournier	26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
Ovarine Dubois	LALEUF, 49, aven. Lamotte-Picquet, Paris.
Ovarose	58, rue St-Placide, Paris.
Ovilgénine Bouty	3 ^{de} , rue de Dunkerque, Paris.
Ovo-lécithine Billon	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Ovomaltine	Etab. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
Ovethyrol	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Ovules Chaumel	78, faub. St-Denis, Paris.
Ovules Derma	ROBIN, 13, r. de Poissy, Paris.
Ovules Roche	P. HOFFMANN-LA ROCHE, & C ^{ie} , 21, place des Vosges, Paris.
Oxycyanure d'hydrargyre	GUILLAUMIN, 168, boulev. Saint-Germain, Paris.
Oxydothyridine Pâris	4, r. Lamotte-Picquet, Paris.
Oxydovarine Pâris	Id.
Oxygènes du Dr Prim	27, rue Fourcroy, Paris.
Oxygèneozone	11, rue Saint-Sabin, Paris.
Oxy-Injecteur du Dr Fialip	Lab. du Dr FIALIP, 23, Av. de la Motte-Picquet, Paris.
Oxymenthol Perraudin	Laborat. SCIENTIA, 21, rue Chaptal, Paris.
Ozol	Labo. de l'Ozol, Avignon, (Vaucluse).

P

Pain essentiel	85, rue de Saint-Germain,
Heudebert	Nanterre (Seine).
Pains spéciaux	id.
Heudebert	
Paludase Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Panblase Antilué-	Labor. CHARRON, 34, rue
tique	Galilée, Nantes.
Panblase Antiphy-	Labor. CHARRON, 34, rue
mique	Galilée, Nantes.
Panbiline	Labor. de la PANBILINE,
	à Annonay (Ardèche).
Panbromine	J. TINARDON, 17, rue Cadet,
	Paris.
Pancréas-Endocri-	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
sines Fournier	
Pancréatine	MACQUAIRE, Les Lilas
Defresne	(Seine).
Pancréatétanle	GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris
Pandigitale Houdas	H. RIVIER, 36, r. St-Claude,
	Paris.
Panfébrine	DORANTOWICZ, 17 bis, av.
	Parmentier, Paris.
Pançaduine	SOUILLARD & C ^e , 2, rue du
	Marché des Blancs-Man-
	teaux, Paris.
Pançestyl Narty	G. TINARD, 134, boulevard,
	Pérelre, Paris.
Pançlandine Coutu-	18, avenue Hoche, Paris.
rieux	
Panhémel	BOUYSSOU & C ^e , 90, avenue
	des Ternes, Paris.
Panlacto-Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Panlutéine	VOGEIN, 19, rue des Deux-
	Ponts, Paris.
Pantopen Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE
	& C ^e , 21, place des Vosges.
	Paris.
Panurel Tissot	34, boul. de Clichy, Paris.
Panvalérine Delattre	10, rue du Bac, Paris.
Papaine Henry	39, r. de Sclessin, Liège.
Papaine Trouette	15, rue Immeubles-Indus-
	triels, Paris.
Papier Albespeyres	FUMOUBE, 78, faub. Saint-
	Denis, Paris.
Papier du Dr Balme	ROGIER, 19, avenue de
	Villiers, Paris.
Papier Barracl	78, faub. Saint-Denis, Paris.

Papier Fayard	DALET, 94, boul. des Batignolles, Paris.
Paracarbochleryl	ALEZARD, 76, rue Réaumur, Paris.
Paraffinéol Hamel	BRUNEAU & C ^e , 17, rue de Berri, Paris.
Paralactine Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Paralaxel	52, r. de Poissy, St-Germain-en-Laye.
Paratétanine	Institut MERIEUX, 17, rue Bourgelat, Lyon.
Parathyroïde-Endocrines Fournier	26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
Paratexine Ducatte	191, rue St-Honoré, Paris.
Paroxyl	THIRIET & C ^e , 26-28, rue des Ponts, Nancy.
Passiflorine	RÉAUBOURG, 1, rue Raynouard, Paris.
Pastilles Brunelet	22, rue Turbigo, Paris.
Pastilles Citen	STAMBACH, à Colmar (Alsace).
Pastilles de Cécaine Midy	9, rue du Colonel-Moll, Paris.
Pastilles Géraudel	36, r. Rivay, Levallois-Perret
Pastilles Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Pastilles de Mackensie	40, rue Bienfaisance, Paris.
Pastilles Méry	Comte de GRAUWE, 16, rue de Roeroy, Paris.
Pastilles laxatives Miraton	à Châtel-Guyon (P.-de-D.).
Pastilles Vichy-Etat	24, boul. des Capucines, Paris.
Pâte Berthé	FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Pâtes lacto-maltées du Dr Jacquet	89, rue de Rivoli, Paris.
Pâte thionique Rambaud	12, rue Beautreillis, Paris.
Patholysine	LEJEUNE, 12, rue Emilio-Castelar, Paris.
Pausodyne	98, rue d'Angoulême, Paris.
Pectine	J. TINARDON, 17, rue Cadet, Paris.
Pectopunch Mousnier	à Sceaux (Seine).
Pélespanines	FOURNIER Frères, 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Penghawar Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Pepiedon Henry	39, rue de Selessin, Liège.
Peptalmine	Lab. SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.

Peptodlase	ZIZINE, 11, rue Capri, Paris
Pepto-fer du Dr Jaillet	DARRASSE 13, rue Pavée Paris.
Peptokola Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Peptonal	DURET et REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Peptonate de fer Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Peptene Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Peptene Catillon	3, boul. Saint-Martin, Paris.
Peptene Chapoteaud	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Peptene Defresne	MACQUAIRE, Les Lilas (Seine).
Peptene Vassal	28, r. Hôpital Militaire, Lille.
Pepto-Sodine	BERTHIER, Grande-rue, Boulogne-sur-Mer.
Pepto-Thymol Gigon	7, rue Coq-Héron. Paris.
Peptovalériane Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Péricols Legros	74, r. Raspail, Bois-Colombes.
Péristaltine Ciba	1, place Morand, Lyon.
Perles Taphosete	LAMBIOTTE Frères, 3, rue d'Edimbourg, Paris.
Peroxydines	135, rue de Rome, Paris.
Persodine Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
Pertussin Salle	4, rue Elzévir, Paris.
Perubore	MAYOLL, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Pétroléine Lancetot	11 ^{me} , rue du Conservatoire, Paris.
Phagocytime Bureau	26, rue Saint-Claude, Paris.
Phagolysine	HUBAC, 82, r. de la Pompe, Paris.
Phénalgéine	PEILLE, 29, rue de Metz, Toulouse.
Phénaseptyl	4, Place Wilson, Limoges.
Pheneucalyptol	MOUSNIER, à Secaux.
Phénol Bobœuf	47, rue de Rome, Paris.
Phénesalyl Tereinet	158, rue Saint-Jacques, Paris.
Phlyetol	37, rue de Bourgogne, Paris.
Phos	FINELLE, 1, r. Tardieu, Paris
Phoscalgène	LESCAROUX, à Châteauroux (Indre).
Phosféryl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Phoseforme	DROUET et PLET, 37, rue de Marly, Rueil.
Phosete Lambiotte Frères	3, rue d'Edimbourg, Paris.
Phospharsol	RICARDOU, 17, rue Rochechouart, Paris.

Phospharsival	H. MORAND à Auray, (Morbihan).
Phospharsyl colloï- dal du Dr Pinard	à Angoulême (Charente).
Phosphate Vital de Jacquemaire	à Villefranche (Rhône).
Phosphate Pinard	à Angoulême (Charente).
Phosphatine Falières	6, rue de la Tâcherie, Paris.
Phospho-Fluer-Beynet	25, Grand'Rue, Bry-s/Seine
Phospho-Galacel Mary	32, rue de l'Ouest, Paris.
Phosphogénase	37, rue Tivoli, Bordeaux.
Phosphogène Favri- chon	à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).
Phospho-Iodine	BERTHIER, Grande Rue à Boulogne-s/Mer.
Phosphopinal Juin	3, quai aux Fleurs, Paris.
Phosphoréol Tissot	34, boul. de Clichy, Paris.
Phosphorescine Leker	13, rue Marbeuf, Paris.
Phospho-Sérum	62, rue Dupont-des-Loges, Rennes.
Phosphergane	BERNAMONT, 87, rue du Commerce, Nevers.
Phosphotal Clin	20, rue des Fossés-Saint- Jacques, Paris.
Phosphure de zinc Clin	20, rue des Fossés-Saint- Jacques, Paris.
Phospirine	DROUET & PLET, 37, rue de Marly, Rueil.
Phostaniol	F. CHANAL à Fesches-le- Châtel (Doubs).
Phostanno-Galacel	93, rue Nollet, Paris.
Phostrychnol	CHANTEREAU, 8, rue de Constantinople, Paris.
Phostyl	Lab. Py.
Phylactone Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Physéline Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Physioscyamine	PUECH, 44, rue Gambetta, Biarritz.
Physiosthénine	DROUET et PLET, 37, rue de Marly, Rueil.
Phytinate de Qui- nine Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.
Phytine Ciba	Id.
Phytel	Lab. ALBARRAN, 3, rue Chané, Paris (16 ^e).
Phytothérapie Coirre	5, boul. Montparnasse, Paris.
Pilules antidia- bétiques Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.

- Pilules du Dr Beaumumé**
Pilules Bengué
Pilules Blancard
Pilules Bland
Pilules Besredon
Pilules de Brides
Pilules Couplier
Pilules Crauch
Pilules du Dr Crenier
Pilules Culiçura
Pilules du Dr Debouzy
Pilules Deumer
Pilules Durieux
Pilules Eparvier
Pilules Gip
Pilules hélénienues Naud
Pilules d'Hermal
Pilules du Docteur Séjournet
Pilules Lartigue
Pilules Lemang
Pilules de Moussette
Pilules Philippe
Pilules Purgatives du Dr Debaut
Pilules de Quassine Frémint
Pilules savonneuses Boissy
Pipérazine Midy
Pipérazol Tissot
Piscidia Gmel
Pituglandol Roche
Pitullébine Byla
Pixel Keckly
Placenta Endocri-sines Fournier
Placentodose
Plasma de Quinton
Plasone Antigono-eocéique
Pluribiase
- CORDIER, Parthenay (Deux-Sèvres).**
 47, rue Blanche, Paris.
 64, rue La Rochefoucauld, Paris.
 24, place des Vosges, Paris.
GIGON, 7, r. Coq-Héron, Paris.
 17, rue Rochechouart, Paris.
 30, r. Louis-le-Grand, Paris.
 34, boul. de Clichy, Paris.
 75, rue de la Boétie, Paris.
 3, avenue Lowendal, Paris.
LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
A. BOMEL, à Annonay (Ardèche).
VIREUX MOLHAIN (Ardenues).
Lab. EPARVIER, 26, Grande rue Saint-Clair, Lyon.
 64, boul. Port-Royal, Paris.
 29, rue Philippe-de-Girard, Paris.
H. RIVIER, 26-28, rue Saint-Claude, Paris.
LEPRINCE, 62, rue de la Tour, Paris.
 78, faub. Saint-Denis, Paris.
 14, rue Palais-Grillet, Lyon.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 14, rue Palais-Grillet, Lyon.
 147, faub. Saint-Denis, Paris.
FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
DELOUCHE, 356, rue Saint-Honoré, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 34, boul. de Clichy, Paris.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 21, place des Vosges, Paris.
 26, avenue de l'Observatoire, Paris.
 7, rue Rodier, Paris.
 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Dr FRAYSSE, 130, rue d'Aboukir, Paris.
 54, faub. St-Honoré, Paris.
Lab. CHARRON, 34, rue Gailléc, Nantes.
TIXIER, 8, av. Parc Mont-souris, Paris.

Plurion Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Pneumobiol	27, rue Cavenne, Lyon.
Pneumo-calcaïne	50, rue Rennequin, Paris.
Pneumoératol	BOURDIER, 147, faub. Saint-Denis, Paris.
Pneumogéine Renard	142, avenue de Clichy, Paris.
Pneumotanie Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Podophylle Coirre	79, r. du Cherche-Midi, Paris.
Poliel Churebill	12, rue Castiglione, Paris.
Polvista	PRIVAT, rue Trencavel, Béziers.
Polybromure Gennen	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Polyformiate Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Polyminéral Fort	DELALANDE & C ^e , 13, rue Lacharrière, Paris (13 ^e).
Pommade adrénostyptique Midy	Laborat. MIDY, 4, rue du Colonel-Moli, Paris.
Pommade Cuticura	3, avenue Lowen 1 ^{re} , Paris.
Pommade Lencir	A. LEJEUNE, 12, rue Emilio Castelar, Paris.
Pommade Loçcaïs	24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Pommades ophtalmologiques du Dr Guiraud	98, r. Saint-Ginès, Bordeaux.
Pommades Royer	225, rue Saint-Martin, Paris.
Pommiede	LOUDENOT, 106, avenue du Roule, Neuilly-s-Seine.
Potion Boissel	4, cours Créé, Bordeaux.
Potion Bonnet	TINARDON, 17, rue Cadet, Paris.
Poudre américaine Leroy	MORIDE, 20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Poudre Escoufflaire	à Baisieux (Nord).
Poudre de viande Rousseau	TROUETTE, 15, rue Immeubles-Industriels, Paris.
Poudre du Dr Cléry	53, boul. St-Martin, Paris.
Poudre Épic	20, rue St-Lazare, Paris.
Poudre Génia	AMOUROUX, 186, rue du Chemin-Vert, Paris.
Poudre Lartigue	78, faub. St-Denis, Paris.
Poudre Laxative de Vichy (du Dr Soulioux)	G. PRUNIER & C ^e , 6, rue de la Tâcherie, Paris.
Poudre Patersep	43, rue de Saintonge, Paris.
Préventyl	40, rue d'Enghien, Paris.
Pré-Zymase	LEBOIME, 21, boul. Rochechouart, Paris.
Produits diététiques	FAVRICHON, à St-Symphorien-de-Lay (Loire).

Produits de Régime "Therma Vichy"	17, pl. du Champ de Foire, Vichy.
Produits Uéma	17, rue des Magasins, Stras- bourg.
Proményl U. T. A.	Lab. d'Opothérapie, Liège.
Propidex	Etab. POULENC, 86-92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Propiden	Etab. POULENC Fr., 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Prosthénase Gal- brun	8, rue du Petit-Muse, Paris.
Protéchiol	Lab. CHARRON, 34, rue Galilée, Nantes.
Protéodyne	29, place Bossuet, Dijon.
Protéol	5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
Prothéine	29, place Bossuet, Dijon.
Protlode Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Protyline Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris.
Proveinase	MIDY Frères, 4, r. Colonel- Moll, Paris.
Prunelline Best	à Villefranche (Rhône).
Psinase Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Pulmine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Pulmobulzs Hyva	LECONTE, 12, rue Grande, Evreux.
Pulmocardine	PERROCHON, 57, rue Orizet, Tours (Indre-et-Loire).
Pulmolysine Rey- mont	Aymar GIN, 69, rue de la Paroisse, Versailles.
Pulmonine Bouty	3 ^{ue} , rue de Dunkerque, Paris.
Pulmosérum Bailly	15, rue de Rome, Paris.
Pulmestéryl	LESCAROUX, à Châteauroux (Indre).
Purganol Daquin	5, rue des Remises, St-Maur, (Seine).
Purgyl Kochly	7, rue Rodier, Paris.
Pyramiden	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Pyratene	FERRÉ, 71, boul. St-Michel, Paris.
Pyrélaïne Collas	GRIGNON, 2, rue Duphot, Paris.
Pyréthane	Labor. CAMUSET, à Ablon (Seine-&-Oise).
Pyroléol Edet	à Alençon (Orne).
Pyrothéine	VINZON, 3, rue de Paris, Auxerre.

Q

- Quassia-Kina Rabot** 49, rue de Bitché, à Courbevoie (Seine).
- Quassine Frémint** 6, rue Abel, Paris.
- Quiétol** POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
- Quiétyl** MAYOLI, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- Quina Baron** P. FOURNIE, 3, pl. Miséricorde, Lyon.
- Quina-fer Mechling** à Mulhouse.
- Quina Laroche** COMAR, 26, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Quinby (Quinio-Bismuth)** CANTIN, à Palaiseau.
- Quinéase** DROUET & PLET, 37, rue de Marly, Rueil.
- Quinéine** 21, rue Chaptal, Paris.
- Quinine Pelletier** VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
- Quinium Roy** 81, boul. Suchet, Paris.
- Quinoforme Lacroix** 31, rue Philippe-de-Girard, Paris.
- Quinoïdine Duriez** 20, place des Vosges, Paris.
- Quinquina Gmet** 27, faub. Montmartre, Paris.
- Quinquina granulé Astier** Labor. ASTIER, 45, rue du Dr Blanche, Paris.
- Quinquina Watelet** BLANCHOT, 15, avenue Montsouris, Paris.
- Quiphos Churchill** 12, rue Castiglione, Paris.

R

- Radiolysine** 41, rue de Rome, Paris.
- Radjunal Chevrier** 21, faub. Montmartre, Paris.
- Rami-gouttes** FOUGERAT, 44, rue Chaptal, Levallois-Perret.
- Recalcifiants Henry** 39, r. de Selessin, Liège.
- Reconstituant Mary** LAVADOUX, 32, r. de l'Ouest, Paris.
- Rectoline** CRESTEY, 164, rue Saint-Honoré, Paris.
- Rectopaniline** Labor. de la PANBILINE, à Annonay (Ardèche).
- Rectesol** CRESTEY, 164, rue Saint-Honoré, Paris.
- Régénérateur pulmonaire du Dr Bouyer** BARTHELEMY, 5, rue Dugommier, à Nantes.
- Régyl** Lab. FIEVET, 53, r. Réaumur, Paris.

Rein-Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Renétanie Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Repas Barylé Meurice	68, r. Berkendael, Bruxelles.
Résyl	Lab. CIBA, 1, place Morand, Lyon.
Remède d'Abysainie Exibard	BLOTTIÈRE, 6, rue Dom- basle, Paris.
Rénétel	DUVAL à Falaize (Calvados).
Réthragine	Lab. L.-G. TORAUDE, 22, rue de la Sorbonne, Paris.
Retrepitine Carrien	54, faub. Saint-Honoré, Paris.
Révulsif Boudin	6, rue du Moulin, Vincennes (Seine).
Révulsior	PAULIN & BARRE, à Tours.
Rhagadine Braque- mond	71, avenue de Villiers, Paris.
Rhamnine Henry	39, rue de Selessin, Liège.
Rhéantine Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
Rhéolthymine	Ch. GAUTHIER, 4, rue Fays, Saint-Mandé (Seine).
Rhésal-Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Rhinargyne	DEBCEUF, 10, r. Washington, Paris.
Rhinolin	ANDRÉ, 81, avenue Malakoff, Paris.
Rhino-Menthol	Lab. BERGER, 14, rue des Pyramides, Paris.
Rhizetanin	AUBRIOT, 56, boul. Ornano, Paris.
Rhodarsan	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Rhodazyl	id.
Rhedocaine Couta- rieux	18, avenue Hoche, Paris.
Rhoféine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Rhomnal Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Ricéyl Dygeon	125, rue de Turenne, Paris.
Ricinopalmine	5, boul. des Brotteaux, Lyon.
Riodine Astier	45, rue du Dr Blanche, Paris.
Reburène Debay	Rue Saint-Géry, Arras.
Rosanol	L. HINGLAIS, à Epernay (M.)
Royérine Dupuy	225, rue Saint-Martin, Paris.
Ruténal	Etab. POULENC 86, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Rythmos	Labor. LEYSIN, 1 bis, rue Molitor, Paris.

S

Salasenyi	SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE LABORATOIRES, 23, rue d'Ouessant, Paris.
Salas-Embrocation	SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE LABORATOIRES, 23, rue d'Ouessant, Paris.
Salbine du Dr Fayès	3, rue du 4-Septembre, Paris.
Salénal Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
Salène Ciba	id.
Salicaïne	168, boul. St-Germain, Paris.
Salicaire Henry	39, r. de Selessin, Liège.
Salicarine Viel	7, rue Saint-Yves, Rennes.
Salicel Dussault	6, rue Abel, Paris.
Salvia Chatel-Guyon	à Châtel-Guyon (P.-de-D.), Miraton
Salubrine Phénix	14, rue de Brague, Paris.
Salvone	37, rue Frédéric-Fuys, Lyon- Villeurbanne.
Salsanès	ROBERTS & C ^e , 5, rue de la Paix, Paris.
Salyptel Narty	G. TINARD, 134, boulevard Pérecire, Paris.
Salysérum	DROUET et PLET, 37, rue de Marly, Rueil, à Evreux (Eure).
Sambul Gendard	80, faub. Saint-Denis, Paris.
Sanguine Dabat	MAYOLI, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Sanefermine	3, rue Maublauc, Paris.
Saneçyl	id.
Sanoram	à Narbonne (Aude).
Santal Blanc	6, rue Saint-Claude, Paris.
Santal Bretonneau	20, rue des Fossés-Saint- Jacques, Paris.
Santal Clin	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Santal Midy	6, rue Daubigny, Paris.
Santal Monal	49, boul. Port-Royal, Paris.
Santalel Montagu	12, boul. Saint-Martin, Paris.
Santal P. Petit	31, rue Philippe-de-Girard, Paris.
Santal salolé Lacroix	49, boul. Port-Royal, Paris.
Santéline Montagu	4, rue du Roi de Sicile, Paris.
Santhéose	9, rue des Pyramides, Paris.
Santogérol Caubin	CAVAILLÈS 34, r. de Turin, Paris (8 ^e).
Sapelan	BENSIMON, 46, r. Lamartine, Paris.
Sapoçynol	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Saturoi	27, faub. Montmartre, Paris.
Sauge Gmet	

Saveline Savé	2, av. Parmentier, Paris.
Savon Cuticura	3, avenue Lowendal, Paris.
Savons Mollard	2, rue du Marché des Blancs-Manteaux, Paris.
Savon Perusol	VENDEL, 61, r. de Vaugirard, Paris.
Savons Vassy	12, r. Beantreillis, Paris.
Savon Vigier	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Scillarène	SANDOZ, 5, r. de Metz, Paris.
Scorogènes	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Seurénaline	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Scurocaine	Id.
Scuroferme	Id.
Sécacérone Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris.
Sédacrine Crestey	164, rue Saint-Honoré, Paris.
Sédatif Légeais	37, avenue Mareau, Paris.
Sédatine Christlaens	2, rue du Champ-de-Mars, Reims.
Sédatoxe Gléou	7, rue Coq-Héron, Paris (1 ^{re}).
Sedlitz Ch. Chanteaud	54, rue Franes-Bourgeois, Paris.
Sédobrol Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris.
Sédogastrine	ZIZINE, 11, r. Capri, Paris.
Sédegène Sallé	Labor. BERGER, 14, rue des Pyramides, Paris.
Sédel Buisson	157, rue de Sèvres, Paris.
Sédoncurel	DEHAUSSY, 44, rue Inkermann, Lille.
Sédosine	Lab. LICARDY, 38, boulev. Bourdon, Neuilly-s-S.
Sektal Grémy	LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
Sel digestif B. M. C.	WATELET, & C ^e , 21, rue Violet Paris.
Sels Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Sel de Hunt	16, rue Boulainvilliers, Paris.
Sel Jolivet	140, faub. St-Honoré, Paris.
Sel de Pennès	3, rue de Latran, Paris.
Sel Vichy-Etat	24, boul. des Capucines, Paris.
Sélénitel Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Selvan Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Sénophile Foucher	BRUNEAU, 64, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Serpinol U. T. A.	Lab. d'Opothérapie U. T. A., Liège.
Seetral	Lab. LEYSIN, 1 bis, rue Molitor, Paris.

Septicemine Cortial	10, rue Béranger, Paris.
Séquardine Bouty	3 ^{me} , rue de Dunkerque, Paris.
Sérénel	50, rue Rennequin, Paris.
Séro-Comprimés	Lab. GAVIGNET, 4, rue Alph. Fochier, à Lyon.
Séroferrine	LEMATTE, 6, r. Ballu, Paris.
Séropase	Sté Fse d'OPOTHÉRAPIE (S. F. O.), 58, rue Taitbout, Paris.
Sérosthényl Bouty	3 ^{me} , rue de Dunkerque, Paris.
Sérostyl Ravaud	à Paris.
Sérum antiasthmaticque de Hechel	CORBIERE, 27, rue Desrenaudes, Paris.
Sérum antiphymique Vadam	Voir : Antiphymique.
Sérum antityphéidique de Rodet	Lab. AGUETTANT, 36, quai Fulchiron, Lyon.
Sérum Collyre	BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
Sérum Neurephile Thievenot	21, rue des Roses, Dijon.
Sérums Fraisse	8, rue Jasmin, Paris.
Sérums de l'Institut Mérieux	17, rue Bourgelat, Lyon.
Sérum Oliviero	87, rue Denfert-Rochereau, Paris.
Siémoidine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Siéol	à Saint-Fons (Rhône).
Silicyl	Lab. CAMUSET, à Ablon (Seine-et-Oise).
Silisode	MICHEL, 22, rue des Bernardins, Paris.
Sinahin	CARTERET, 15, r. d'Argenteuil, Paris.
Sinapisme Rigollet	13, rue Pavée, Paris.
Sinaplasme du Dr Faure	4, rue Brunel, Paris.
Sinrénaline	DEHAUSSY, 44, rue Inkermann, Lille.
Siredion	228, rue de Paris à Montreuil-s/-Bois.
Sirop d'Aconit Ecalle	157, rue de Sèvres, Paris.
Sirop antiasthmaticque Favret	BLOTTIERE, 6, rue Dombasle, Paris.
Sirop d'Aubergier	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Sirop Auzes	BLANC & C ^{ie} , Agen.
Sirop Berthé	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Sirop de Blaneard	64, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Sirop Blottière	6, rue Dombasle, Paris.

Sirop Briant	DEGIOS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
Sirop de Breméine	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Sirop Bucl	COMAR, 20, rue des Fossés Saint-Jacques, Paris.
Sirop Clérambourg	4, rue Tarbè, Paris.
Sirop Crésnier	6, rue Chanoinesse, Paris.
Sirop Delabarre	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Sirop Derbecq	74, bd Beaumarchais, Paris.
Sirop de Digitale	LABELONYE, 99, r. d'Aboukir, Paris.
Sirop du Dr Dubreuil	37, rue Galilée, Paris.
Sirop de Dusart	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Sirop Famel	26, rue de la Réunion, Paris.
Sirop ferrug. Laroze	2, rue des Lions, Paris.
Sirop Gelineau	MOUSNIER, à Secaux.
Sirop de Gibert	à Maisons-Laffitte (S.-&-O.).
Sirop Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Sirop Grimault	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Sirop Guillaumond	131, rue de Vaugirard, Paris.
Sirop du Dr Hecquet	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Sirop d'Hémoglobine Byla	26, avenue de l'Observatoire Paris.
Sirop d'Hémoglobine méthylarsiné	HENRY, 39, rue de Sclessin, Liège.
Sirop Henry Mure	71, rue Saint-Jacques, Paris.
Sirop Ferré	6, rue Dombasle, Paris.
Sirop du Dr Gelineau	J. MOUSNIER, à Secaux (S.).
Sirop Gribell	BELLERES, 19, rue Drouot.
Sirop d'Iodéine	MONTAGU, 49, bd. Port-Royal, Paris.
Sirop Jane	E. LANG & C ^{ie} , 2, r. du Marché des Blancs-Manteaux, Paris.
Sirop Jélivet	140, fb. Saint-Honoré, Paris.
Sirop de Kola composé	Lab. HENRY, 39, rue de Sclessin, Liège.
Sirop de Lamoureux	73, rue Sainte-Anne, Paris.
Sirop Lanchat	F. CHANAL, à Peches-le-Châtel (Doubs).
Sirop du Dr Manceau	à Château-du-Loir (Sarthe).
Sirop de la Maternité	LAURIN, 86, boulev. Port-Royal, Paris.
Sirop Nourry	COMAR, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Sirop Patrice	DEBCEUF, 10, r. Washington, Paris.
Sirop phénique Vial	Lab. du Dr CHAPELLE, 8, rue Vivienne, Paris.
Sirop polyiodure Gennon	14, rue Victor-Hugo, Lyon.

Sirop Prega	44, rue Inkermann, Lille.
Sirop Rabuteau	COMAR, 20 rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Sirop Rami	r. Chaptal, Levallois-Perret,
Sirop du Dr Rein-villier	131, rue Vaugirard, Paris.
Sirop Roche au thiocol	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, places des Vosges, Paris.
Sirop de Teyssèdre	34 fb. d'Angoulême, Limoges
Sirop tribromuré Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Sirop Vacheron	av. Valliond, Ste-Foy, Lyon
Sirop Vauthier Marcq	98, r. du Chemin-Vert, Paris.
Sirop des Vosges	68 bis, av. de Châtillon, Paris.
Sistemensine Ciba	1, place Morand, Lyon.
Soderseine	DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune, Paris.
Sedothiocl	Lab. de Médecine Expéri- mentale, Beauvais.
Solubaine Nativelle	49, boul. Port-Royal, Paris.
Soluin	Pharmacie Centrale de Bel- gique, Bruxelles.
Soluprotine Roche	HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris
Solurel	COMAR, 20, r. des Fossés- Saint-Jacques, Paris.
Solution Bardet	76, rue de Sèvres, Paris.
Solution Fumouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Solution Henry	39, rue de Selessin, Liège.
Solution Henry Mure	Pharm. BOREL, à Annonay (Ardèche).
Solution Lareyenne	DUREL, 7, boulev. Denain, Paris.
Solution Pautauberge	10, rue de Constantinople, Paris.
Solution Scheum	6, rue Corvetto, Paris.
Solvurie	MAUCHANT, 14, rue de Bir- ague, Paris.
Sempifène Roche	HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris
Senveryl	POULENC Fr., 92, r. Vieille- du-Temple, Paris.
Sergal Thévenot	21, rue des Roses, Dijon.
Sernyal	Lab. L. G. TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
Sous-azotate de Bis- muth Thulane	BAUDRY, 68, boulevard Malesherbes, Paris.
Sorol Churchill	12, rue Castiglione, Paris.
Sparadraps Le Per- driel	11, rue Milton, Paris.

Spartéine Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Spasma Conturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Spasmalgine Roche	21, place des Vosges, Paris.
Spasmine Jolly	27, rue Mazarine, Paris.
Spectrel	71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
Sphérulines " Mon- cœur "	46, avenue Victor - Hugo, Boulogne-Paris.
Spiralgine	Lab. SERVIER, Orléans.
Spirillan	PALLOU, 23, rue de Berne, Paris
Splénodose	D ^r FRAYSSE, 130, r. d'Aboukir, Paris.
Splenotanic	GRÉMY, 14, r. de Cliehy, Paris
Stanien Conturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Stannebardane Henry	39, rue Selessin, Liège.
Stannolip Henry	id.
Stannoxyl	37, rue de Bourgogne, Paris.
Stannylase Théve- nel	21, rue des Roses, Dijon.
Staphylase du D ^r Deyen	LEBEAULT, 5, rue Bourg- l'Abbé, Paris.
Staphylocide Audras	89, boul. Victor-Hugo, Calais
Staphylo-coccine Fraquet	Laborat. SCIENTIA, 21, rue Chaptal, Paris.
Staphylo-vaccin U. T. A.	Lab. d'Opothérapie, Liège.
Stéarel	M. BONNET, Saint-Etienne.
Sténergine	BEAUGONIN, 4, place des Vosges, Paris.
Sténofer Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
Sthénophyl Vigan	103, rue Saint-Lazare, Paris.
Stéramine	Lab. des Antiseptiques Chlo- rés, 40, r. Thiers, Le Havre.
Stibial	POULENC Fr., 92, r. Vieille- du-Temple, Paris.
Stomacel Boulet	36, avenue Duquesne, Paris.
Stomophile	Lab. DORANTOWICZ, 17 bis, avenue Parmentier, Paris.
Stovalne Billen	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Stroccône	37, rue Frédéric-Faÿs, Lyon- Villurbanne.
Stroval Monnier	19, r. Chartres, Neuilly-s-S.
Strophantus Catillen	3, boul. Saint-Martin, Paris.
Strychnal Longuet	34, rue Sedaine, Paris.
Strychnarsitol Robin	13, rue de Polssy, Paris.
Styrum Chalen	à Bagé-le-Châtel (Ain).
Succharure Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Suc-Durham	14, rue de Birague, Paris.
Succomusculine Chaix	10, rue de l'Orne, Paris.

Sucre Eduleor Ferré	142, boul. St-Germain, Paris.
Sue Wiandyl	27, r. des Petits-Hôtels, Paris.
Sulfarène	(Laborat. du), à Agen.
Sulfarsenol Pluchon	36, rue Claude-Lorrain, Paris.
Sulfarsinol Lefèvre	52, rue Décamps, Paris (16 ^e).
Sulphydral Ch. Chanteaud	54, rue Frances-Bourgeois, Paris.
Sulfo-Benzol	239, faub. St-Honoré, Paris.
Sulfo-bore Roy	81, boul. Suchet, Paris.
Sulfosodol Robin	13, rue de Polissy, Paris.
Sulfoléine Rozet	BENDERITTER, à Vendôme.
Sulfo-mel du Dr Fayès	3, r. du 4-Septembre, Paris.
Sulfo-rbinol Fayès	id.
Sulfurine du Dr Lap- glebert	ADRIAN, 9, rue de la Perle, Paris.
Sulfurien Ceuturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Sulfuryl Monal	6, rue Daubigny, Paris.
Sulphaqua Pépin	9, rue du 4-Septembre, Paris.
Sulphénine Trouette	15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
Superox	33, rue Vaugirard, Paris.
Suppargyre du Dr Faucher	Labor. TISSOT, 34, boul. de Clichy, Paris.
Suppe-Cuivrel	MATRÁY à Aubière (p.-de-a.).
Suppe-Gynal	LEES, 124, rue du Bac, Paris.
Suppositoires Chau- mel	PUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Suppositoires Cor- bière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Suppositoires Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Suppositoires Lœzeals	24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Suppositoires Pépet	18, avenue de Villiers, Paris.
Suppositoires Royer	225, rue Saint-Martin, Paris.
Surrénale-Endocri- sines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Surrénaline Bouty	3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
Surrénolanie Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Synase	FALVY & REVEL, 40, rue des Acacias, Paris.
Syneaine Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Synergyl Vadam	Lab. L. G. TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
Synthel	Lab. de Biologie et de Physiologie d'Orléans, 286, Fl. Bannier, Les Aydes, Orléans.
Sylver	4, Quai Pasteur, 4, Cette (Hérault).
Syphilithérapie Duret	DÉLATTRE, 10, rue du Bac, Paris.

T

Tablettes du Dr Bousquet	140, faubourg Saint-Honoré, Paris.
Tablettes de Brides	17, rue Rochechouart, Paris.
Tablettes oxymenthol Perraudin	Lab. SCIENTIA, 21, rue Chaptal, Paris.
Tablettes Perroud	7, rue des Archers, Lyon.
Tablettes Renard	GIBAN à Sens (Yonne).
Tablettes de Phospharsol	17, rue Rochechouart, Paris.
Tablettes de thyroïde	CATILLON, 3, boulev. Saint-Martin, Paris.
Tablettes Zeva	60, Cours Emile-Zola, Lyon.
Taburel Menal	6, rue Daubigny, Paris.
Tænifuge Bardet	76, rue de Sévres, Paris.
Tænifuge Kirn	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Tænifuges Limousin	10, rue du Bac, Paris.
Tamar Indien Grillon	13, rue Pavée, Paris.
Tampol Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
Tampovules Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Tannurgyl	8, rue de Parme, Paris.
Tarbisol	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Tartrate Borico-potassique du Dr Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Tartro-Bi Roche	21, place des Vosges, Paris.
Taxol	Lab. de Bio-Chimie appliquée, 21, rue Théodore-de-Banville, Paris.
Teinture de Cocheux	36, quai Fulchiron, Lyon.
Tercipol	158, rue Saint-Jacques, Paris.
Tereolène	MAUCHANT, 14, r. de Birague, Paris.
Tereyn Chéron	168 bis, Avenue de Paris, Vincennes.
Terkal Menal	6, rue Daubigny, Paris.
Terpese Treuette	15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
Terpine Gannon	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Terpine Vigier	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Terpinol Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Tetranitrol Roussel	10, rue Washington, Paris.
Testicule-Endocrines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Tétralgine Routhier	à Vierzon (Cher)

Thalassetonine Vadam	Lab. L.-G. TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
Thaelaxine	DURET & REMY, 5, avenue des Tillents, Paris.
Thapsia Le Perdriel	12, rue Milton, Paris.
Thébaïl	USINE DES AUBRAIS, 286, faub. Bannier, Orléans.
Théinel Bailly	15, rue de Rome, Paris.
Théobromine Dubat (Théïsine)	80, faub. Saint-Denis, Paris.
Théobromine Guillaumin	13, r. du Cherche-Midi, Paris.
Théobromine Heudé	9, rue Dieu, Paris.
Théobromine Reussau	à Ermont (S.-et-O.).
Théobromine Vicarie	17, boul. Haussmann, Paris.
Théobromose	DUMESNIL, 10, r. du Plâtre, Paris.
Théobryl	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris.
Théosalvose	GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi, Paris.
Théosol Rousseau	à Ermont (S.-et-O.).
Théoxanthine	Labor. DEGLAUDE, 6, rue d'Assas, Paris.
Thiégénol Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^e , 21, pl. des Vosges, Paris.
Thiosol Roche	Id.
Thienhydrol Grémy	11, rue de Clichy, Paris.
Thiepeptone du Dr L. Bru	F. MOULIN, 2, rue Léon-Cogniet, Paris.
Thymus-Endocrins Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Thymine	DELARBRE, 11, chaussée de la Muette, Paris.
Thymusine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Thyratexine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Thyrépine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Thyrocréine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Thyredese	D ^r FRAYSSE, 130, r. d'Aboukir, Paris.
Thyroïde-Endocrins Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Thyreïdine Bouty	3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
Thyreïdine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Tiodine Cegnet	43, rue de Saintonge, Paris.
Tisane St-Luc	Comte de GRAUWE, 16, rue de Roceroi, Paris.
Tissus Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Tochlerine	Etabl. POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.

Tonikéine Chevreton	5, rue Ballu, Paris.
Tonilécithine Rogier	19, avenue de Villiers, Paris.
Tonique nerveux Koenig	37, avenue Narceau, Paris.
Toni-sérum Freys- singé	6, rue Abel, Paris.
Tenudel	LICARDY, 38, boul. Bour- don, Paris-Neuilly.
Tenyol "P"	VARGAS, 6, rue Chauveau- Lagarde, Paris.
Topique Bertrand	Labor. du TOPIQUE BER- TRAND, à Oullins (Rhône).
Topiques Chaumel	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Tot'Hamelis	CHANTEREAU, 8, rue Cons- tantinople, Paris.
Tréparsol	LECOQ & FERRAND, 6 bis, r. de la Bouvray, Neuilly- sur-Seine.
Tréparsépaus	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Trépol	Lab. L.-G. TORAUDE, 22, rue de la Sorbonne, Paris.
Trépoquinol	Lab. L.-G. TORAUDE, 22, rue de la Sorbonne, Paris.
Tribromure Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Tricalcine	Labor. SCIENTIA, 21, rue Chaptal, Paris.
Tridigestine Dalloz	13, boulev. de la Chapelle, Paris.
Triféryl	HAUTDIDIER, 37, r. Galilée, Paris.
Trilactine	MAUCHANT, 14, rue de Bi- rague, Paris.
Triolitrine Caféinée Dubois	Lab. LALEUF, 49, avenue Lamotte-Picquet, Paris.
Trinitrine Roussel	10, r. Washington, Paris.
Trinitrine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Trisodyl Rozet	BENDERITTER à Vendôme
Tritonine	64, rue des Tournelles, Paris.
Trixyl Fraudin	4, av. Desseux, Boulogne- sur-Seine (Seine)
Tubérol	23, rue des Moines, Paris.
Tubes Bayard	BEYTOUT & CISTERNE, 12, boul. Saint-Martin, Paris
Tubes Dulcis	D ^r FERRY, à Bourg (Ain).
Tubes Levasseur	23, rue de la Monnaie, Paris.
Tuberculine C. L.	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Tubes Sals	Labor. du TOPIQUE BER- TRAND, Oullins (Rhône).
Tulle gras Lumière	Cours de la Liberté, Lyon.

U

Ulcéoplaque	Lab. SÉVIGNÉ, 11, rue de Jarente, Paris.
Ulmairé Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Ulmairène Gigen	7, rue Coq-Héron, Paris.
Ulmairé Gigen	7, rue Coq-Héron, Paris.
Ultrarçen Leclerc	10, rue Vignon, Paris.
Uracétose	26, rue de Sévigné, Paris.
Uralysol	159, av. de Wagram, Paris.
Uraséol	Lab. OBERLIN, 17, r. Cadet, Paris.
Uraseptine Rogier	19, avenue de Villiers, Paris.
Urazine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Urénile injectable	MEURICE, 62, r. Berkendael, Bruxelles.
Uréol Ch. Chanteaud	54, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
Urifluine	BEAUGONIN, 4, place des Vosges, Paris.
Urilesyne	Lab. CIBA, 1, place Morand, Lyon.
Urisal du Dr Deschamps	49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
Urisapine	28, rue Milton, Paris.
Urocédrol	GALLO, à Aurillac.
Urocléan	ADLER, 36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
Uredol Clérambourg	4, rue Turbè, Paris.
Urefermine Gebey	BEYTOU & CISTERNE, 12, boul. Saint-Martin, Paris.
Urofedine	R. VENIEZ, 45, boulevard Lafayette, Calais.
Urométine Lambiotte Frères	3, r. d'Edimbourg, Paris.
Urophile Bailly	15, rue de Rome, Paris.
Urosan	DUFAYARD, 12, rue des Saints-Pères, Paris.
Urôtrypsine Demasles	à Vienne (Isère).

V

Vaccins	BEAUGONIN, 4, place des Vosges, Paris.
Vaccin antigencoccique	OLIVIERO, 87, rue Denfert-Rochereau, Paris.
Vaccin antituberculeux Bessan	Lab. des Industries Biologiques, 25, rue Royale, Paris.
Vaccins antipollin	BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.

- Vaccins atoxiques stabilisés**
Vaccins atoxiques Cépède
Vaccins Bactériens I. O. D.
Vaccins microbiens curatifs.
Vadérol
Valbérnine Rogier
Valéral Puy
Valéramyl
Valérianate Gabail
Valérianate Grignon
Valérianate Laboureur
Valérianate Pachaut
Valérianate Pierlot
Valériane Byla
Valériane Dausse
Valériane Ginet
Valérianose Gigen
Valérobremine Legendrand
Valéromenthol
Valéronal
Valyl Midy
Vanadarsine Guillaumin
Vanadine Chevrier
Vanucléol
Varicine Béraud
Varicure Marek
Varilaxine
Vasogènes
Vasolaxine
Végétol Fournier
Veinarégrye
Veinosine
Vérianne
Véroginol
- POULENC Frères**, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Institut de Biologie appliquée, 30 av. Reille, Paris.
Lab. Médical de Biochimie, 16, rue Dragon, Marseille.
GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
DURAND, à Joigny (Yonne).
 19, avenue de Villiers, Paris.
 à Grenoble (Isère).
 188, faub. Saint-Martin, Paris.
 3, r. de l'Estrapade, Paris.
 2, rue Dufhot, Paris.
 245, rue de Vaugirard, Paris.
 130, boul. Haussmann, Paris.
 26, rue Saint-Claude, Paris.
 26, avenue de l'Observatoire, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 7, rue Coq-Héron, Paris.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.
 108, faub. St-Honoré, Paris.
Lab. BERGER, 14, rue des Pyramides, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 13, r. du Cherche-Midi, Paris.
 21, faub. Montmartre, Paris.
LACROIX, 29, rue Philippe-de-Girard, Paris.
 12, rue Cadet, Paris.
G. MONNIER, 19, rue de Chartres, Neuilly-s.-Seine.
CRESTÉY, 104, rue Saint-Honoré, Paris.
 43, rue Pinel, à Saint-Denis.
FOURNIER Frères, 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
GASTÉROIS, 8, r. des Quatre-Fils, Paris.
R. FEIGNOUX, 20, rue des Jardiniers, Montreuil (seine)
LEBEAULT & Co, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
BURIAT, 30, rue Pergolèse Paris.
 101, avenue Mozart, Paris.

Véronidia Buisson	157, rue de Sèvres, Paris.
Verrulyse	MIGUET, Villefranche (Aisne).
Vertieurine	GRIAS, 3, rue de Suresnes, Garches (S.-et-O.).
Vésicatoires d'Albepeyres.	FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Viburnum Gmel	27, faub. Montmartre, Paris.
Vinaigre de Pennès	3, rue de Latran, Paris.
Vin d'Anduran	MOUSNIER, à Secaux (Seine).
Vin Areud	6, rue Dombasle, Paris.
Vin de Baudon	VAUDIN & GUILLAUMIN, 12, rue Charles-V, Paris.
Vin Bravais	3, rue Mogador, Paris.
Vin Brisse	6, r. d'Abbeville, Paris.
Vin de Bugéaud	5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
Vin de Chassaigné	6, rue de la Tacherie, Paris.
Vin de Coca-Kola	CHEVRIER, 21, faub. Montmartre, Paris.
Vin Désiles	Levallois-Perret (Seine).
Vin Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Vin de Kola Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Vin de Lavelx	5, avenue Victoria, Paris.
Vin Mariani	41, boul. Haussmann, Paris.
Vin de Moride	LANDRIN, 20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Vin Nourry	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Vin de Séguin	105, rue Saint-Honoré, Paris.
Vin Urané Pesqui	au Bouscat-Bordeaux.
Vin de Vial	36, place Bellecour, Lyon.
Vin Vequet	5, r. Eugène-Delacroix, Paris.
Vieferme Ciba	ROLLAND, 1, place Morand, Lyon.
Viridol	Dr LECORNEUR, 65, rue Monge, Paris.
Vitamina	Lab. du Dr CHAPELLE, 8, rue Vivienne, Paris.
Vitamine Rogier	19, av. de Villiers, Paris.
Vitamyl	BEAUGONIN, 4, place des Vosges, Paris.
Vitase	Soc. de Recherches et Applications Scientifiques, 10, boul. Poissonnière, Paris.
Vitosines Cardol	DECORNEZ, à Ornans (Doubs).
Vitricine	CARVES, à Chambéry (Hte Savoie).
Vivassol	FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Veltargel Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Vulnérine Bergen	DUCOC, à Langeais (Indre-et-Loire).

X

Xémaderm

GILLOT, 59, r. Châteaudun,
Paris.

Y

Yacurtine

MOUNIER, 16, r. Saint-Gilles,
Paris.

Yoghourt Karles

Lab. Biologique, à Lécuse
(Nord).

Yoghourt Lactella

SOC. LACTELLA, 59, boul.
Gambetta, Tourcoing.

Yoghourt Lagnel

7, rue de la Pépinière, Paris.

Yoghourth Carrien

54, faub. Saint-Honoré, Paris.

Yobimbine Gilbert

2, rue du Marché des Blancs-
Manteaux, Paris.

Ysc

62, rue Louis-Blanc, Paris.

Ystaline

2, pl. du Th.-Français, Paris.

Z

Zaryl

23-25, r. J.-J.-Rousseau, Paris.

Zédène

37, rue de Bourgogne, Paris.

Zimbyl

23-25, r. J.-J.-Rousseau, Paris.

Zingal

DELARBRE, 11, chaussée de
la Muette, Paris.

Zodiac

Moulins de Puteaux (Seine).

Zohel

Labor. de Bio-Chimie appli-
quée, 21, rue Théodore-de-
Banville, Paris.

Zemel

VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.

Zomo-musculusinc

26, avenue de l'Observatoire,
Paris.

Byla

Zominc

Sté d'Alimentation Carnée,
4, boul. Malesherbes, Paris.

Zymatine Lescène

à Livarot (Calvados).





